



FONGICIDE systémique utilisable sur arbres fruitiers à pépins pour contrôler plusieurs maladies: tavelure, oïdium, feu bactérien, chancre et stemphyliose.*

*Cf. tableau des usages.

Luna[®]
CARE

Conditionnement(s)

Sac 12 kg

Fiche d'identité

Composition :

Autres composants dangereux CLP

- Fluopyram
- Fosétyl Aluminium

Classification RAC : 7-P 07

Formulation : granulés dispersibles dans l'eau

Numéro AMM : 2180337

Détenteur d'homologation : Bayer SAS 74 rue Gorge de Loup 69009 LYON

Substance active : fluopyram
Teneur : 50g/kg, soit 5% (m/m)
Famille chimique : pyridinyl-éthyl-benzamide
Mode d'action : Inhibition de la succinate-déshydrogénase.

Substance active : fosétyl-Al
Teneur : 666g/kg, soit 66.6% (m/m)
Famille chimique : monoéthyl phosphites métalliques
Mode d'action : Systémie ascendante et descendante ; activité directe sur la maladie et indirecte en Stimulant les Défenses Naturelles de la plante.

Description

Luna Care est un fongicide à base de fluopyram (mode d'action des SDHI, groupe des bezamides, famille des pyramides), et de fosétyl-Al (groupe des phosphonates). Les 2 substances actives fonctionnent par systémie ascendante (flux xylémique) mais également descendante pour le fosétyl-Al (flux phloémique). Elles sont actives sur ascomycètes et oomycètes et sont complémentaires. Le fluopyram est efficace sur tavelure, oïdium, stemphylioses, et chancre commun. Le fosétyl-Al est efficace sur tavelure, stemphylioses, chancre européen et bactéries. Luna care se présente sous forme de granulés dispersibles.

Préparation

Préparation de la bouillie

Verser Luna Care dans la cuve du pulvérisateur remplie au moins au tiers, agitateur en marche. Compléter avec le volume d'eau nécessaire et maintenir l'agitation pendant l'application

Mélanges et compatibilité

Ne pas mélanger Luna Care avec des engrais foliaires azotés, des produits huileux et cupriques.

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur. Pour connaître le détail pratique de cette mise en oeuvre, il est nécessaire de contacter au préalable le 0 800 25 35 45

Traitement

Voir en fin de fiche, après le Tableau des usages

Précautions à prendre

Pour le stockage

Ne pas stocker le produit dans un local où la température peut dépasser 40 °C.
- Conserver le produit uniquement dans son emballage d'origine, dans un local phytopharmaceutique conforme à la réglementation en vigueur, à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Conserver hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.

Mesures de protections des individus

Se laver les mains après toute manipulation/utilisation/intervention dans une parcelle préalablement traitée.
Ne pas manger, boire, téléphoner ou fumer lors de l'utilisation du produit.

Données réglementaires		Réglementation		Réglementation	
Substance active	Formulation	Produit	Formulation	Produit	Formulation
Fluopyram	Granulés dispersibles	Fluopyram	Granulés dispersibles	Fluopyram	Granulés dispersibles
Fosétyl-Al	Granulés dispersibles	Fosétyl-Al	Granulés dispersibles	Fosétyl-Al	Granulés dispersibles

Pour une meilleure visualisation du tableau, veuillez consulter la dernière page.

Rapporter les équipements de protection individuelle (EPI) usagés dans un sac translucide à votre distributeur partenaire ECO EPI ou faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination de produits dangereux.

En cas de déversement accidentel

Se protéger (EPI) et sécuriser la zone. Prévenir les pompiers (18 ou 112) en cas de danger immédiat pour l'environnement que vous ne pouvez gérer avec vos propres moyens. Collecter tout ce qui a pu être en contact avec le produit, terre souillée incluse. Nettoyer le site et le matériel utilisé, en prenant soin de confiner les effluents générés par l'opération de nettoyage. Les éliminer selon la réglementation en vigueur.

Pour l'emploi

- Traiter en l'absence de vent
- Éliminer les fonds de cuve conformément à la réglementation en vigueur.

Pour l'élimination du produit et de l'emballage

- Pour l'élimination des produits non utilisables, faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux.
- Ne pas réutiliser les emballages vides et les éliminer via une collecte organisée par les distributeurs partenaires de la filière Adivalor ou un autre service de collecte spécifique.

Prévention et gestion de la résistance :

L'utilisation répétée, sur une même parcelle, de préparations à base de substances actives de la même famille Chimique ou ayant le même mode d'action, peut conduire à l'apparition d'organismes résistants. Pour réduire ce risque, l'utilisateur doit raisonner en premier lieu les pratiques agronomiques et respecter les conditions d'emploi du produit. Il est conseillé d'alterner ou d'associer, sur une même parcelle, des préparations à base de substances actives de familles chimiques différentes ou à modes d'action différents, tant au cours d'une saison culturale que dans la rotation. En dépit du

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.



respect de ces règles, on ne peut pas exclure une altération de l'efficacité de cette préparation liée à ces phénomènes de résistance. De ce fait, Bayer SAS décline toute responsabilité quant à d'éventuelles conséquences qui pourraient être dues à de telles résistances.

Nettoyage du pulvérisateur et gestion des fonds de cuve

A la fin de la période d'application du produit, l'intégralité de l'appareil (cuve, rampe, circuit, buses...) doit être rincée à l'eau claire. Le rinçage du pulvérisateur, l'épandage ou la vidange du fond de cuve et l'élimination des effluents doivent être réalisés conformément à la réglementation en vigueur.

LES BONS GESTES POUR TRAITER EN TOUTE SÉCURITÉ

N'utilisez les produits phytopharmaceutiques que si nécessaire.

Protégez votre santé et celle de votre entourage.

Surveillez les conditions météorologiques.

Protégez les points d'eau.

Protégez les pollinisateurs.

Préservez la faune sauvage.

D'INFOS SUR WWW.MON-PHYTO-PRACTIQUE.FR - FLASHÉZ-MOI

AVERTISSEMENT
Toute reproduction totale ou partielle de cette étiquette est interdite. Respecter les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage. Ils ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Conduire sur ces bases la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole en tenant compte, sous la responsabilité de l'utilisateur, de tous les facteurs particuliers concernant votre exploitation, tels que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales, la résistance des espèces... Le fabricant garantit la qualité du produit vendu dans son emballage d'origine et stocké selon les conditions préconisées, ainsi que sa conformité à l'Autorisation de Mise sur le Marché délivrée par les autorités compétentes françaises. Pour les denrées issues de cultures protégées avec cette spécialité et destinées à l'exportation, il est de la responsabilité de l'exportateur de s'assurer de la conformité avec la réglementation en vigueur dans le pays importateur

Classes de danger

Danger principal	Danger secondaire	Danger tertiaire
- - non concerné par un classement	-	-

Tableau des usages et doses autorisées

Culture	Cibles / Usages	Doses	Spécifications d'usage / Stade d'application	DAR en jours ou BBCH max ou NC (Non Concerné)	Précautions* Réglementaires (voir légendes)
Pommier	Tavelure du pommier	3.0 kg/ha	3 trait./an intervalle minimal entre applications : 7 jours	28	1a, 6a

Toxicologie

Classement du mélange CLP

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH401 - Respecter les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
Attention



P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P391 - Recueillir le produit répandu.
P501 - Eliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale
SPe3 - Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 5 mètres en bordure des points d'eau.
SPA1 - Pour éviter le développement de résistances à la substance active fluopyram, il conviendra de limiter le nombre d'applications du produit à 3 applications maximum par cycle cultural sur pommier et de tout autre produit à base de substance active ayant le même mode d'action.

Délai de rentrée
24 heures après traitement.
Mesures de protection des individus : se reporter impérativement au paragraphe de l'étiquette intitulé Précautions à prendre.
Mentions obligatoires
SP1 - Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface.
SP1 - Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.
SP1 - Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

Information santé

Premiers soins

Conseils généraux:
S'éloigner de la zone dangereuse. Maintenir et transporter la victime en position latérale de

sécurité. Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à l'écart.
Inhalation :
Amener la victime à l'air libre. Garder la victime au repos et la maintenir au chaud. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.
Contact avec la peau :
Nettoyer avec une grande quantité d'eau et du savon, si disponible, avec du polyéthylèneglycol 400, puis rincer avec de l'eau. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

Contact avec les yeux :
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'oeil. Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin.
Ingestion :
Rincer la bouche. ne PAS faire vomir. appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 25 35 45 ou être consultée sur les sites internet : <https://agro.bayer.fr/> et www.quickfds.com .
En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison le plus proche puis signalez vos symptômes au réseau "Phyt'attitude" n° vert 0 800 887 887 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Transport et Stockage

Point gélif : -20°C
Température maximum : 40°C
N°ONU : - -



Culture	Cibles / Usages	Doses	Spécifications d'usage / Stade d'application	DAR en jours ou BBCH max ou NC (Non Concerné)	Précautions* Réglementaires (voir légendes)
Pommier	Chancre européen	3.0 kg/ha	stade BBCH 71 à BBCH 81 3 trait./an intervalle minimal entre applications : 7 jours	28	1a, 6a
Pommier	Feu bactérien	3.0 kg/ha	stade BBCH 71 à BBCH 81 3 trait./an intervalle minimal entre applications : 7 jours	28	1a, 6a
Pommier	Oïdiums	3.0 kg/ha	stade BBCH 71 à BBCH 81 3 trait./an intervalle minimal entre applications : 7 jours	28	1a, 6a
Poirier - Cognassier - Nashi	Bactérioses à pseudomonas	3.0 kg/ha	stade BBCH 51 à BBCH 81 3 trait./an intervalle minimal entre applications : 7 jours	28	1a
Poirier - Cognassier - Nashi	Chancre européen	3.0 kg/ha	stade BBCH 51 à BBCH 81 3 trait./an intervalle minimal entre applications : 7 jours	28	1a
Poirier - Cognassier - Nashi	Feu bactérien du poirier (Erwinia amylovora)	3.0 kg/ha	stade BBCH 51 à BBCH 81 3 trait./an intervalle minimal entre applications : 7 jours	28	1a
Poirier - Cognassier - Nashi	Oïdiums	3.0 kg/ha	stade BBCH 51 à BBCH 81 3 trait./an intervalle minimal entre applications : 7 jours	28	1a
Poirier - Cognassier - Nashi	Taches noires (Stemphylium)	3.0 kg/ha	3 trait./an intervalle minimal entre applications : 7 jours	28	1a



Culture	Cibles / Usages	Doses	Spécifications d'usage / Stade d'application	DAR en jours ou BBCH max ou NC (Non Concerné)	Précautions* Réglementaires (voir légendes)
Poirier - Cognassier - Nashi	Tavelure du poirier	3.0 kg/ha	stade BBCH 51 à BBCH 81 3 trait./an intervalle minimal entre applications : 7 jours stade BBCH 51 à BBCH 81	28	1a

Sur pommier :1- pour éviter le développement de résistances à la substance active fluopyram, il conviendra de limiter le nombre d'applications du produit à 3 applications maximum par cycle cultural et de tout autre produit à base de substance active ayant le même mode d'action.2- LUNA CARE n'est pas autorisé sur les variétés suivantes : Golden, Golden delicious, Honey crunch et variétés assimilées (Smoother, Lysgolden, Golden Reynders, Golden Parsi/Da Rosa, Leratess/Pink Gold, Klon B, Honey crisp, Morren's, Jonareve), en raison d'un risque de phytotoxicité.

***En l'absence de mention spécifique dans la colonne « Précautions réglementaires » concernant les abeilles et autres pollinisateurs ou la distance de sécurité pour la protection des personnes présentes et des résidents, respecter la réglementation en vigueur.**
 Limites maximales en résidus de substances actives : se reporter aux LMR en vigueur au niveau de l'Union Européenne et consultables à l'adresse :<https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls>
Bayer SAS décline toute responsabilité concernant l'utilisation de ce produit sur des cultures et cibles permises par extrapolation telle que prévue par l'arrêté du 26 mars 2014 et ses arrêtés modificatifs. Pour toute utilisation liée à ces arrêtés, veuillez contacter Bayer Service Infos au préalable au 0 800 25 35 45

- 1. Organismes aquatiques**
 1a. . Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 5 mètres en bordure des points d'eau.
- 6. Divers**
 6a. . Spa 1 - Pour éviter le développement de résistances à la substance active fluopyram, il conviendra de limiter le nombre d'applications du produit à 3 applications maximum par cycle cultural sur pommier et de tout autre produit à base de substance active ayant le même mode d'action.

Traitement

Dose(s) préconisée(s)

La dose préconisée correspond à la dose homologuée, soit 3kg/ha quels que soient les usages.

Conditions de traitement (époque, stade, seuil d'intervention)

Sur fruits à pépins (pommier, poirier, cognassier, nashi), Luna Care est homologué avec 3 applications maximum par an.
 Dans le cadre de la gestion responsable du mode d'action SDHI, nous recommandons d'utiliser au maximum:
 - 2 applications de Luna Care par campagne
 - 3 SDHI au total par campagne, toutes maladies confondues.
 - 2 SDHI consécutivement.

CONDITIONS D'UTILISATION SUR POMMIER:

Important: afin de prévenir tout risque de phytotoxicité, **ne pas utiliser Luna Care sur les variétés suivantes: Golden, Golden delicious, Honey crunch et variétés assimilées** (Smoother, Lysgolden, Golden Reynders, Golden Parsi/Da Rosa, Leratess/Pink Gold, Klon B, Honey crisp, Morren's, Jonareve). En cas de doute, notamment sur de nouvelles obtentions variétales, nous vous préconisons de contacter votre conseiller et/ou de réaliser un test sur quelques arbres au préalable.

Sur pommier, Luna Care s'utilise uniquement en post floraison, à partir du stade BBCH 71 (nouaison, fruit 10 mm) et jusqu'au stade BBCH 81 (début maturation), en respectant un délai avant récolte de 28 jours.
 Luna Care est efficace sur un large spectre de maladies: tavelure, oïdium, feu bactérien et chancre européen. Par conséquent, selon son positionnement, Luna Care pourra être efficace sur plusieurs maladies concomitantes (cf.bulletins techniques locaux et BSV).

Tavelure / pommier :

Luna Care se positionne en préventif d'une pluie contaminatrice (cf.bulletins techniques locaux et BSV), uniquement en post-floraison à partir du stade BBCH 71 (nouaison). La durée de protection sera de maximum 10 jours. Elle sera renouvelée si le cumul des pluies est supérieur à 50 mm ou si le nombre de nouvelles feuilles sorties est supérieur à 3.

En cas d'applications consécutives de Luna Care, respecter un intervalle minimum de 7 jours. Dans la pratique, l'alternance des modes d'action sera à privilégier.
Oïdium / pommier :
 Luna Care utilisé selon les préconisations tavelure, uniquement à partir du stade BBCH 71 (nouaison), assurera en parallèle une protection oïdium. Il n'est donc pas nécessaire de le compléter avec un anti-oïdium spécifique.
 Son utilisation sera à privilégier en préventif (cf.bulletins techniques locaux et BSV) et en veillant à alterner les modes d'actions.

Chancre européen / pommier :

Luna Care utilisé selon les préconisations tavelure, uniquement à partir du stade BBCH 71 (nouaison), assurera en parallèle une protection complémentaire contre le chancre européen (*Nectria galligena*).
 Cette maladie présente une période de contamination très large, allant du printemps au début de l'hiver. Par conséquent, Luna Care sera un outil complémentaire à



utiliser préventivement dans une stratégie globale incluant :

- la prophylaxie (du type gestion de la fertilisation, suppression des organes attaqués,...)
- des traitements cupriques aux stades sensibles et aux périodes de contamination (du type chute des feuilles à l'automne, floraison, après récolte, grêle...) à positionner selon les avertissements techniques locaux et BSV.

Feu bactérien / pommier :

Luna Care utilisé selon les préconisations tavelure, uniquement à partir du stade BBCH 71 (nouaison), assurera en parallèle une protection complémentaire contre le feu bactérien (*Erwinia amylovora*).

Cette maladie présente une période de contamination principale au cours de la floraison. Durant cette première phase, il sera important de protéger les fleurs selon le risque maladie (cf. bulletins techniques locaux et BSV) ou en cas d'accidents climatiques (ex: grêle), en employant des solutions bactéricides.

En post-floraison, le risque feu bactérien pourra se poursuivre en fonction de différents paramètres (météo, sensibilité variétale, historique de la parcelle). Durant cette seconde phase, Luna Care sera un outil complémentaire à positionner préventivement et en alternance avec d'autres modes d'actions. Son utilisation devra s'inscrire dans une stratégie globale basée avant tout sur la prophylaxie indispensable pour gérer cette maladie (du type suppression des organes attaqués, désinfection des outils de taille...).

CONDITIONS D'UTILISATION SUR POIRIER, COGNASSIER, NASHI :

Sur poirier, Luna Care s'utilise à partir du stade BBCH 51 (gonflement des bourgeons) et jusqu'au stade BBCH 81 (début maturation), en respectant un délai avant récolte de 28 jours. Afin de bénéficier au mieux de la double sytémie du fosétyl-Al, les applications en présence de feuillage (à partir de BBCH 56 - bouton vert) seront plus efficaces. Nous recommandons d'utiliser au maximum 2 applications de Luna Care par campagne.

Luna Care est efficace sur un large spectre de maladies: tavelure, feu bactérien, bactérioses à pseudomonas, stemphylium et oïdium. Par conséquent, selon son positionnement, Luna Care pourra être efficace sur plusieurs maladies concomitantes (cf.bulletins techniques locaux et BSV).

Tavelure / poirier, cognassier, nashi :

Luna Care se positionne en préventif d'une pluie contaminatrice (cf.bulletins techniques locaux et BSV). La durée de protection sera de 7 à 10 jours, à ajuster en fonction du risque maladie. La protection sera renouvelée si le cumul des pluies est supérieur à 50 mm.

En cas d'applications consécutives de Luna Care, respecter un intervalle minimum de 7 jours. Dans la pratique, l'alternance des modes d'action sera à privilégier.

Oïdium / poirier, cognassier, nashi:

Luna Care utilisé selon les préconisations tavelure assurera en parallèle une protection oïdium. Il n'est donc pas nécessaire de le compléter avec un anti-oïdium spécifique.

Son utilisation sera à privilégier en préventif (cf.bulletins techniques locaux et BSV) et en veillant à alterner les modes d'actions.

Feu bactérien et bactérioses (*Pseudomonas syringae*) / poirier, cognassier, nashi :

Luna Care s'utilise en préventif, durant la période de floraison principale, en anticipant les contaminations (cf. bulletins techniques locaux et BSV) et en alternance avec des produits à modes d'action différents. La durée de protection sera de 7 jours maximum au cours de la floraison, à ajuster en fonction du risque maladie. La protection sera renouvelée si le cumul des pluies est supérieur à 50 mm.

Luna Care pourra également être utilisé après la floraison principale si le risque persiste, notamment pour les variétés de poirier à floraison secondaire. Durant cette seconde phase, la durée de protection sera de 7 à 10 jours en fonction du risque maladie (cf.bulletins techniques locaux et BSV).

Stemphyliose / poirier :

Luna Care se positionne en préventif, durant la période à risque stemphyliose (cf. bulletins techniques locaux et BSV), notamment de la chute des pétales jusqu'à la récolte en respectant un DAR de 28 jours. Son utilisation se fera dans le cadre d'un programme en veillant à alterner avec des produits à modes d'action différents.

La durée de protection sera de 7 à 10 jours, à ajuster en fonction du risque maladie. La protection sera renouvelée si le cumul des pluies est supérieur à 50 mm.

Chancre européen / poirier, cognassier, nashi :

Luna Care utilisé selon les préconisations tavelure, feu bactérien ou stemphyliose, assurera en parallèle une protection complémentaire contre le chancre européen (*Nectria galligena*).

Cette maladie présente une période de contamination très large, allant du printemps au début de l'hiver. Par conséquent, Luna Care sera un outil complémentaire à utiliser préventivement dans une stratégie globale incluant :

- la prophylaxie (du type gestion de la fertilisation, suppression des organes attaqués,...)
- des traitements cupriques aux stades sensibles et aux périodes de contamination (du type chute des feuilles à l'automne, floraison, après récolte, grêle...) à positionner selon les avertissements techniques locaux et BSV.

Attention : en cas de recours à des techniques culturales nouvellement mises en oeuvre par l'utilisateur ou présentant une quelconque spécificité, l'utilisateur doit en informer son fournisseur avant toute utilisation du produit, afin que ce dernier puisse en vérifier la faisabilité avec le fabricant du produit.

Programme de traitement

Luna Care devra être intégré en programme et en alternance avec d'autres fongicides présentant des modes d'actions différents. Afin de prévenir toute dérive de sensibilité, il ne faut pas utiliser plus de 3 SDHI par cycle cultural et nous ne recommandons pas plus de 2 SDHI consécutivement.

Classification FRAC

7 - Inhibition de la succinate-déshydrogénase.

P 07 - Systémie ascendante et descendante ; activité directe sur la maladie et indirecte en Stimulant les Défenses Naturelles de la plante.

Application (matériel, pression)

La pulvérisation devra permettre une répartition homogène sur la végétation. Nous recommandons un volume de bouillie minimum de 250L/Ha. Dans le cadre d'un mélange avec un autre produit et afin d'assurer une bonne compatibilité, un volume de bouillie supérieur pourra s'avérer nécessaire. Pour toute question concernant la compatibilité, veuillez contacter Bayer Service Infos au 0800 25 35 45.

Mesures de protections des individus



Caractéristiques des EPI ▼		PROTECTION DE L'OPÉRATEUR PENDANT LES PHASES DE :					PROTECTION DU TRAVAILLEUR
		PRÉPARATION/ MÉLANGE/ CHARGEMENT	APPLICATION AVEC :		NETTOYAGE		
			PULVÉRISATEUR PORTÉ OU TRAINÉ À RAMPE, PNEUMATIQUE OU ATOMSEUR ; PULVÉRISATION VERS LE HAUT				
			TRACTEUR AVEC CABINE FERMÉE	TRACTEUR SANS CABINE			
GANTS en NITRILE NF EN ISO 374-1/A1 réutilisables NF EN 16523-1+A1 (type A) ou à usage unique NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C)		Réutilisables	À usage unique*	À usage unique	Réutilisables	Réutilisables**	
EPI VESTIMENTAIRE conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1		EPI vestimentaire ET EPI partiel			EPI vestimentaire ET EPI partiel		
EPI PARTIEL blouse ou tablier à manches longues catégorie III type PB(3)							
COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE catégorie III type 3 ou 4				Type 4 avec capuche			
LUNETTES ou ECRAN FACIAL certifiés EN 166 (CE, sigle 3)							
PROTECTION RESPIRATOIRE Demi-masque certifié (EN 140) équipé d'un filtre A2P3 (EN 14387) ⁽¹⁾							

*En cas d'intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine.

**En cas de contact avec la culture traitée.

⁽¹⁾ Association d'un filtre contre les gaz et vapeurs organiques (A2, de couleur marron) et d'un filtre anti-poussière (P3). Veiller à toujours respecter les instructions du fabricant concernant le port et l'entretien des appareils respiratoires.



Luna® Care ▫ 50 g/kg fluopyram 666 g/kg fosétyl-Al ▫ AMM n°2180337 ▫ Détenteur d'homologation : Bayer SAS ▫ ® Marque déposée Bayer

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 ▫ Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 3



▫ ▫ ▫ Attention ▫ ▫ ▫ H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. ▫ H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. ▫ EUH401 - Respecter les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit ou à la fiche produit sur <https://agro-bayer.fr> - Bayer Service infos au N° Vert 0 800 25 35 45.

Juillet 2026 - annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer avant toute application auprès de Bayer Service Infos au N° Vert 0 800 25 35 45 qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Version actualisée des fiches produits toujours disponible également sur : <https://agro-bayer.fr>

N° agrément Bayer SAS : RH02118 (distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels)