



Ο.Ψ.Υ. = Όγκος ψεκ. υγρού **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.** = Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες

Αλιέτ 80 WG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Το foseetyl-Al, ανάκτη στις φυσιολογικές εντάσεις και δρα περιπολιζώντας τη βλάστηση των σποριών ή την ανάπτυξη του μυκηλίου και το σχηματισμό των σποριών. Χάρη στη διασυστηματική δράση του (κινείται ανοδικά και καθοδικά), το Alientte 80 WG επιτυγχάνει τη διέγερση των φυσικών αμυνών του φυτού και δρα αποτελεσματικά κατά Ωομυκήτων (Περωνόσπορος, Φυτόφθορα), καθώς και κατά ασθενειών που προκαλούνται από βακτήρια, όπως το Βακτηριακό κάμψο (*Erwinia amylovora*) και προσβολές από *Pseudomonas syringae*.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασιμό φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε αναδεύοντας στο ψεκαστικό την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, και συμπληρώστε με νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αξιοβάσει τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:--
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:
Πορτοκιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ φρούτ: Φυτόφθορα (*Phytophthora sp.*)
Α. Ένας ψεκασιμό το μήνα αρχίζοντας από το φύλλωμα των σφολώνων και μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89). **Δόση:** 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (200-600 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100-200 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-2/30
Β. Εφαρμογή στο φυλλώματός. **Δόση:** 400 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (500 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 125 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-2/60
Γ. Εφαρμογή με επάλειψη. **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (2,5 γρ. σκευάσματος/λίτρο). **Ο.Ψ.Υ.:** - **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1.
Μηλιά, Αχλαδιά: Φουζυκλάδο (*Venturia inaequalis*). Προληπτικοί ψεκασιμό αρχίζοντας πριν από την έναρξη της άνθησης και μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν περίπου το 70% του τελικού τους μεγέθους (Μηλιά: BBCH 61-75, Κυδωνιά: BBCH 53-75). **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (250-375 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100-150 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-2/7.
Αχλαδιά: Στεφύλιο (*Stemphylium sp.*), Βακτηριακό κάμψο (*Erwinia amylovora*), Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae*).
Α. Προληπτικοί ψεκασιμό φυλλώματος από την έναρξη της καρποδέσης μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 61-83). **Δόση:** 50 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-75 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100-150 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/7.
Β. Προληπτικοί ψεκασιμό φυλλώματος από την έναρξη της καρποδέσης μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 61-83). **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (250-375 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100-150 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-2/30.
Ακτινιδιά (επιτραπέζιο & οиноποίησημο): Περονόσπορος (*Pisomora viticola*). Προληπτικοί ψεκασιμό από το στάδιο των 5 φύλλων έως το «κλεισμό» του τσαμπιού (BBCH 15-79). **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (250 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-4/7-12.
Φρούδια (Υ+Θ): Σήφεις λαϊμού και ριζών (*Phytophthora sp., Phytophthora cactorum, Phytophthora fragariae*).
Α. Προληπτικοί ψεκασιμό έως την άνθηση (BBCH 12-59). **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (250 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/8-10.
Β. Εμβόπιση ριζώματος πριν τη φύτευση. **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Ο.Ψ.Υ.:** 10 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1 / -.
Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ): Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*). Προληπτικοί ψεκασιμό φυλλώματος (BBCH 14-89). **Δόση:** 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (200-300 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/8-10.
Λιγούρι (Υ+Θ), Κολοκύθι/Κολοκυθάκι (Υ+Θ): Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*). Προληπτικοί ψεκασιμό φυλλώματος (BBCH 14-89). **Δόση:** 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (160-300 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 80-100 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/8-10.
Πεπόνι (Υ+Θ), Καρπούζι (Υ+Θ), Κολοκύθα (Υ+Θ): Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*). Προληπτικοί ψεκασιμό φυλλώματος (BBCH 14-89). **Δόση:** 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (160-300 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 80-100 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-2/8-10.
Μαρούλι (Υ+Θ): Περονόσπορος (*Bremia lactucae*). Προληπτικοί ψεκασιμό φυλλώματος (BBCH 14-45). **Δόση:** 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (100-300 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/10-14.
Αγκινάρα: Περονόσπορος (*Bremia lactucae*). Προληπτικοί ψεκασιμό φυλλώματος (BBCH 14-48). **Δόση:** 200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (200 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-2/10-14.
Φυτώρια Δένδρων (εκτός εσπεριδοειδών): Φυτόφθορα (*Phytophthora sp.*) Προληπτικοί ψεκασιμό φυλλώματος. **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (250-300 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/30.
Καλιμιστικά (Υ&Θ): Φυτόφθορα (*Phytophthora sp.*)
Α. Προληπτικοί ψεκασιμό φυλλώματος. **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (250-300 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100-120 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/30.
Β. Ριζοτόπιση. **Δόση:** 5-10 γρ./Τετρ. μέτρο. **Ο.Ψ.Υ.:** 100 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-2/30.
Σπανακιό: Περονόσπορος (*Bremia lactucae*). Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της ασθένειας (BBCH 14-45). **Δόση:** 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (100-300 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/10.
Ακρόδρυα: Αμυγδαλιά², Φιστικιά², Φουντουκιά², Καρυδιά², Καστανιά² (Χρήσιμα Ήσσονος Σημσίας): Φυτόφθορα (*Phytophthora sp.*), Βακτηρίωση καρδιάς (*Xanthomonas campestris* pv. *Juglandis*), Μελάνωση Καστανιάς (*Phytophthora cambivora*). Ψεκασιμό φυλλώματος. Προληπτικές εφαρμογές μέχρι πριν το σχηματισμό



του εδωδιμου καρπού (BBCH 65). **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (250-375 γρ./στρ.) **Ο.Ψ.Υ.:** 100-150 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-2/30.
Αβοκάντο² (Χρήση Ήσσονος Σημσίας): Φυτόφθορα (*Phytophthora cinnamomi*). Ψεκασιμό φυλλώματος. Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης μέχρι το στάδιο όπου σχεδόν όλα οι καρποί έχουν φτάσει στο τελικό τους μέγεθος. (BBCH 51-79). **Δόση:** 250-300 γρ./στρ. **Ο.Ψ.Υ.:** 100-150 λίτρα/στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/14.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.
1- Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά και Αβοκάντο από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φωτοτοxicότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΜΕΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Τομάτο, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθι/Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα: 3 ημέρες.
Φρούδια (ψεκασιμό φυλλώματος), Αβοκάντο: 14 ημέρες.
Φρούδια (εμβόπιση ριζώματος):
- Εσπεριδοειδή (Πορτοκιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ), Μαρούλι, Σπανακιό: 15 ημέρες.
Αγκινάρα: 21 ημέρες.
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αμπέλι (επιτραπέζιο & οινόποιησημο): 28 ημέρες.
Ακτινιδιά, Φυτώρια Δένδρων (εκτός εσπεριδοειδών): 40 ημέρες.
Καλιμιστικά:
Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά): Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ - ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:
Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και ρυθμίσεις εφαρμογής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκόψιο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ανατίθενται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε ψυκαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε θερμοκρασία, έτηρο και καλά αεριζόμενο μέρος.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: 8/έπιε συσκευασία.



1Kg e **ΠΡΟΣΟΧΗ**
Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά
YAAT: 60858/22.05.2019

Βρέξιμο κόκκοι (WG)
Εγγυημένη σύνθεση: foseetyl - Al 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 16,67% β/β

GROUP P₀₇ FUNGICIDE

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ABEE, Αιγυλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000, www.cropscience.bayer.gr



Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί επίσημη/πρωτότυπη ετικέτα και παρατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Σε περίπτωση επανεπίσόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασιμό να φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. • Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινήστε στον καθαρό αέρα. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι, και εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400 και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα καλά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε αμέσως γιατρό. Θεραπεία του ματιού από οφθαλμιάτρο. • Σε περίπτωση επαφής με το στόμα, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. • Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό. • Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ειδοποιήστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό και σε ηρεμία. **Πληροφορίες για το Γιατρό:** Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόλυση. Παρόλα αυτά, εάν έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα (περισσότερη από μία γουλιά) χρησιγήστε ενεργό άνθρακα και θειικό Νάτριο. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.



GR84503983D