



Aliette®

Flash

Contém **12 kg**

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 746 g/kg ou 74,6% (p/p) de fosetil (na forma de sal de alumínio)

Fungicida

Fungicida sistémico para o combate de

Míldio e gomose dos citrinos
Podridão-do-colo-e-das-raízes e fogo-bacteriano da macieira e pereira
Míldio de meloeiro (ar livre)
Podridão-do-colo-e-das-raízes do morangueiro (ar livre e estufa)
Míldio do lúpulo
Podridão-das-raízes do sobreiro e azinheira
Doença-da-tinta do castanheiro

GRUPO P07 FUNGICIDA

Autorização de venda nº 0506 concedida pela DGAV
Lote N.º e Data Produção: impressos na embalagem
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Titular da
Autorização de Venda:
BAYER Cropscience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda
Avenida Vítor Figueiredo, nº 4, 4º Piso
2790-255 Carnaxide
Telef.: 214 172 121
<https://cropscience.bayer.pt>

Aliette Flash é um fungicida sistémico (mobilidade ascendente e descendente), com atividade preventiva e curativa. Ativa as defesas das plantas, interferindo no metabolismo fosfatado.

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CITRINOS (laranja, limoeiro, mandarina, tangerineira (inclui clementina e híbridos) e toranjeira)

Aplicar a concentração de 250 g/hL, o que corresponde a uma dose máxima de 2,5 kg/ha de **Aliette Flash** (volume de calda de 1000 L/ha), em pulverização foliar, contra:
Gomose (*Phytophthora citrophthora*, *P. nicotianae* var. *parasitica*) – Aplicar após o aparecimento dos primeiros sintomas durante a fase de crescimento ativo da árvore. Máximo de 3 aplicações. O produto tem uma persistência biológica de 90 dias.
Míldio (*Phytophthora citrophthora*, *P. hibernalis*, *P. citricola*, *P. syringae*, *P. nicotianae* var. *parasitica*) - Aplicar de Novembro até Fevereiro, quando o tempo decorrer frio e chuvoso. Se necessário repetir com intervalos de 1 mês, até um máximo de 3 aplicações. O produto tem uma persistência biológica de 30 dias.

MACIEIRA E PEREIRA

Podridão-do-colo-e-das-raízes (*Phytophthora cactorum*) - Aplicar a concentração de 250 g/hL, o que corresponde a uma dose máxima de 2,5 kg/ha de **Aliette Flash** (volume de calda de 300-1000 L/ha). Efetuar pulverizações desde que a folhagem seja abundante até um máximo de 3 aplicações. O produto tem uma persistência biológica de 30 dias.

Fogo-bacteriano (*Erwinia amylovora*) - Aplicar a concentração de 375 g/hL, o que corresponde a uma dose máxima de 3,75 kg/ha de **Aliette Flash** (volume de calda de 1000 L/ha). Tratar durante a floração principal, o primeiro tratamento no início da floração (BBCH >60) até um máximo de 3 aplicações. O produto tem uma persistência biológica de 3 a 4 dias.

MELOEIRO (ar livre)

Míldio (*Pseudoperonospora cubensis*) – Aplicar a dose de 3,75 kg/ha de **Aliette Flash** preventivamente e a partir da floração (BBCH 51) até um máximo de 2 aplicações. Volume de calda recomendado: 200 a 400 L/ha. O produto tem uma persistência biológica de 10 dias.

MORANGUEIRO (ar livre e estufa)

Podridão-do-colo-e-das-raízes (*Phytophthora cactorum*.) - Antes da plantação, tratar por imersão as raízes da planta numa calda de **Aliette Flash** antes da plantação de 250 g/hL. Dois meses após a transplantação realizar uma pulverização foliar com a concentração de 250 g/hL, o que corresponde a uma dose máxima de 2,5 kg/ha de **Aliette Flash** (volume de calda de 1000 L/ha).

LÚPULO

Míldio (*Pseudoperonospora humuli*) - Aplicar a concentração de 250 g/hL, o que corresponde a uma dose máxima de 4,0 kg/ha de **Aliette Flash** (volume de calda de 600-1600 L/ha) ao aparecimento dos sintomas. Repetir com um intervalo de 14 dias e até um máximo de 2 aplicações.

CASTANHEIRO

Doença-da-tinta (*Phytophthora cinnamomi*) - 250 g/hL
Em viveiros – Iniciar os tratamentos entre Maio e Junho, antes do aparecimento dos sintomas, quando as plantas tiverem com 4 a 6 folhas, até um máximo de 4 tratamentos. O produto tem uma persistência biológica de 15 dias.

SOBREIRO E AZINHEIRA

Podridão-das-raízes (*Phytophthora* sp.) – Tratar na primavera (Abril/Maio). Aplicar a concentração de 250 g/hL, o que corresponde a uma dose de 2,5 kg/ha (volume de calda de 1000 L/ha). Repetir com intervalos de 30-40 dias e até um máximo de 2 aplicações.

Intervalo de Segurança: 3 dias em meloeiro; 14 dias em morangueiro e lúpulo; 15 dias em citrinos; 28 dias em macieira e pereira.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES

Não pode ser excedido o número máximo de aplicações indicado por cultura, no conjunto dos inimigos, com este e outro produto fitofarmacêutico, que contenha fosetil-AI, fosfonatos de potássio ou fosfonato de dissódio utilizados.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Consultar a indústria antes de usar o produto em fruta destinada a transformação industrial.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas. Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de modo a respeitar a dose.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
[UFI: H3R0-A0EU-1004-SQTR]
Provoca irritação ocular grave.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção ocular / proteção facial.
Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
Ficha de segurança fornecida a pedido.
Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef.: 800 250 250.
Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.
Ed. 20825

ATENÇÃO

Armazenamento: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado.



Bayer

PT81014574I