

voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN HET GROND- EN OPPERVLAKTEWATER

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erfen of wegen kan worden verontreinigd.
- Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.
- Driftreductie: vermijd spuitdrift naar naburige vegetatie, gronden en waterlopen door een aangepaste spuitapparatuur, waterhoeveelheid en rijsnelheid. Spuit bij windstil weer met aangepaste druk naargelang de specifieke aanbevelingen voor drift reducerende doppen.
- Frosiegevoelige percelen: Het is ten zeerste aanbevolen om erosie beperkende maatregelen te nemen op percelen die erosiegevoelig zijn om afspoeling naar oppervlaktewater tegen te gaan.
- Niet doelwitorganismen: SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen. Voor instructies bij een specifieke teelt: zie rubriek 'Gebruik en gebruiksdossissen'.

VOORZORGSMAATREGELEN

Geefte van normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldig zijn. Drag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd. SP0: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

AAWUZINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Eerste hulp maatregelen Bij het innemen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.	
NA INSLIKKEN:	De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
NA INADEMING:	De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BU CONTACT MET DE HUID:	Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BU CONTACT MET DE OGEN:	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Voor bijkomende informatie, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245.	

WAARBORG: Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd, ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het nuchter onmogelijk is om de door de koper geïnde toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, plant of werktuigen behalve indien duidelijk bevesten is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper aanleed draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beschikt.

USAGE ET DOSES D'EMPLOI

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation du produit.

- 1. Betteraves sucrières et fourragères (plein air)**
Appliquer en post-émergence (stade cotylédons (BBCH 10) - 8 feuilles (BBCH 18)) en mélange avec un herbicide autorisé.
 - a) Dans un système de désherbage à doses fractionnées, la dose de Actirob B® par traitement sera limitée à 0,3 - 1 l/ha en fonction du stade de la culture, des conditions climatiques et de la taille des adventices.
 - b) On peut adapter la dose de 0,5 à 2 l/ha en fonction des conditions climatiques et de la taille des adventices sur betteraves suffisamment développées (2 feuilles - BBCH 12).

Conditions d'application: Délai avant récolte: en fonction du produit auquel Actirob B® est ajouté, mais toujours au moins 7 jours. Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 m avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.

- 2. Maïs (sauf maïs doux) (plein air)**
Appliquer en post-émergence en mélange avec un herbicide autorisé jusqu'à 2 l/ha en fonction des conditions climatiques et de la taille des adventices.

Conditions d'application: Délai avant récolte: en fonction du produit auquel Actirob B® est ajouté, mais toujours au moins 7 jours. Le nombre d'applications dépend du produit phytosanitaire avec lequel l'adjuvant est mélangé. Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 m avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.

- 3. Froment de printemps et d'hiver, orge de printemps et d'hiver, seigle de printemps et d'hiver, triticale de printemps et d'hiver, épeautre de printemps et d'hiver (plein air)**
Appliquer à la dose de 1 l/ha en mélange avec des herbicides anti-graminées de post-émergence autorisés, tels que les produits à base de mésofuralon-méthyl / iodofuralon + méfenpyr-diéthyl, fenoxaprop-P-éthyl + cloquintocet-mexyl ou de pyroxulam + cloquintocet-mexyl.

Conditions d'application: Maximum 2 applications/culture. Délai avant récolte: en fonction du produit auquel Actirob B® est ajouté, mais toujours au moins 7 jours. Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 m avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.

- 4. Pommes de terres et culture de plants de pommes de terre (plein air)**
a) Appliquer à la dose de 1 l/ha en mélange avec un défendant autorisé sur les fanes de pommes de terre. Maximum 2 applications.
b) Appliquer à la dose de 1 l/ha en mélange avec un herbicide autorisé en pré-émergence et émergence précoce (BBCH 00-09) sur les mauvaises herbes. Maximum 1 application.

Conditions d'application: Délai avant récolte: en fonction du produit auquel Actirob B® est ajouté, mais toujours au moins 7 jours. Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 m avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.

5. Terres agricoles en interculture
Appliquer à la dose de 2 l/ha en fonction des conditions climatiques et de la taille des adventices en mélange avec un herbicide autorisé.
Conditions d'application: Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 m avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.

6. Miscanthus (herbe à éléphant) (plein air)
Appliquer à la dose de 1 l/ha en mélange avec un herbicide autorisé du stade émergence au stade 50 cm de hauteur.
Conditions d'application: Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 m avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.

7. Arbres et arbustes ornementaux (non destinés à la consommation) (plein air)
Appliquer à la dose de 1 l/ha en mélange avec un herbicide autorisé.
Conditions d'application: Maximum 2 applications. Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 m avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.

8. Fièrele des prés/timothee (production des semences) (plein air)
Appliquer à la dose de 1 l/ha en mélange avec un herbicide (post-lévé) ou un régulateur de croissance.
Conditions d'application: Maximum 1 application. Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 m avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.

9. Carottes, ail, oignons de printemps, échalote, oignons (récolté sec) (plein air)
Appliquer à la dose de 1 l/ha en mélange avec un insecticide autorisé.
Conditions d'application: Maximum 5 applications / culture. Le nombre d'applications est fonction du produit phyto-pharmaceutique avec lequel l'adjuvant est mélangé. Délai avant récolte: en fonction du produit auquel Actirob B® est ajouté. Toujours au moins 7 jours. Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 m avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.

10. Carottes, ail, oignons de printemps, échalote, oignons (récolté sec) (plein air)
Appliquer à la dose de 1 l/ha en mélange avec un insecticide autorisé.
Conditions d'application: Maximum 5 applications / culture. Le nombre d'applications est fonction du produit phyto-pharmaceutique avec lequel l'adjuvant est mélangé. Délai avant récolte: en fonction du produit auquel Actirob B® est ajouté. Toujours au moins 7 jours. Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 m avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.

11. Poireau (champ de production), chou brocoli, chou-fleur (blanc et vert), chou de Bruxelles, choux pommés (blanc, rouge, chou cabus et chou de savoie), chou Chinois, pakchoi, pakchoi en rosette et komatsuna, chou frisé (chou palmier), chou-rave (plein air)
Appliquer à la dose de 2 l/ha en mélange avec un insecticide autorisé.
Conditions d'application: Maximum 5 applications / culture. Le nombre d'applications est fonction du produit phyto-pharmaceutique avec lequel l'adjuvant est mélangé. Délai avant récolte: en fonction du produit auquel Actirob B® est ajouté. Toujours au moins 7 jours. Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 m avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.

12. Sauf (pas pour la consommation) (open lucht)
Appliquer à la dose de 1 l/ha en mélange avec un défendant autorisé.
Conditions d'application: Maximum 2 applications, avec intervalle minimal entre deux applications de 7 jours. Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 m avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface. Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

13. Plantes ornementales (sous protection)
Appliquer à la dose de 1 l/ha en mélange avec un insecticide ou fongicide autorisé.
Conditions d'application: Maximum 5 applications / 12 mois. Le nombre d'applications est fonction du produit phyto-pharmaceutique avec lequel l'adjuvant est mélangé.

14. Arbres et arbustes ornementaux, plantes ornementales non ligneuses (plein air)
Appliquer à la dose de 1 l/ha en mélange avec un insecticide autorisé.
Conditions d'application: Maximum 5 applications / 12 mois. Le nombre d'applications est fonction du produit phyto-pharmaceutique avec lequel l'adjuvant est mélangé. Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 3 m pour les arbres et arbustes ornementaux, 1 m pour les plantes ornementales non ligneuses, avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.

15. Plantes ornementales à bulbes, tubercules ou rhizomes (plein air)
Appliquer à la dose de 1 l/ha en mélange avec un herbicide autorisé.
Conditions d'application: Maximum 5 applications / 12 mois. Le nombre d'applications est fonction du produit phyto-pharmaceutique avec lequel l'adjuvant est mélangé. Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 1 m avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface. Application entre les lignes de plantes sans toucher la culture.

USAGES CONFORMES A L'ARTICLE 51 DU REGLEMENT 1107/2009
L'utilisation du produit Actirob B® dans les cultures mentionnées dans le tableau ci-dessous a été évaluée conformément à l'article 51 du Règlement européen 1107/2009. Peu ou pas d'étude d'efficacité et/ou de phytotoxicité n'a été effectuée pour cet usage. Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ. L'utilisation de ce produit dans ces cultures tombe donc sous la responsabilité de l'utilisateur.

Remarque générale concernant la méthode d'application: pulvérisation sans indication contraire pour une culture spécifique.

Remarque générale concernant la dose
La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'affecte pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai(s) d'attente.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

- Produit destiné à un usage professionnel
- Pour les mélanges possibles, veuillez vous informer auprès de votre distributeur au sujet des produits autorisés utilisables.
- Agiter constamment la bouillie de pulvérisation lors de l'application.
- Ne traiter uniquement que sur des surfaces saines exemptes de tout dégât mécanique et n'ayant subi aucun dommage suite à des traitements préalables, ou des attaques d'insectes.
- Lors de longues journées ensoleillées et chaudes, traiter impérativement le soir.
- Ne pas traiter par températures supérieures à 23°C.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE, TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

Remplir la cuve à 1/2 d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter le volume de la cuve. L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet. Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

MESURES POUR ÉVITER LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE

- SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme et des routes.
- En plus des zones tampons mentionnées sur l'étiquette, des zones tampons régionaux sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.
- Réduction de la dérive: éviter la dérive sur la végétation, les plans et les cours d'eau par l'utilisation d'un équipement de pulvérisation approprié et en ajustant la quantité d'eau et la vitesse. Pulvériser en l'absence de vent et avec une pression adaptée conformément aux recommandations spécifiques pour les buses antidérive.
- Parcelles sensibles à l'érosion: il est recommandé de mettre en place des mesures adaptées sur les parcelles sensibles à l'érosion afin d'empêcher le ruissellement vers les eaux de surface.
- Organismes non-cibles: SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface. Voir les instructions spécifiques à la culture sous la rubrique 'Usage et doses d'emploi'.

MESURES DE PRÉCAUTION

Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Porter toujours un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques. Conserver le produit sous le capot fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement protégé à cet effet et à l'abri du gel. Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

INDICATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS

Premiers soins En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.		
EN CAS D'INGESTION:	Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.	
EN CAS D'INHALATION:	Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.	
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:	Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.	
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:	Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.	
Pour des informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons +32 (0)70/245.245. Pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500.		

GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur: nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insatisfaisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

	Signaawoord	Mention d'avertissement	Signalwort
	Niet ingedeeld	Non classé	Nicht klassifiziert
	Gevarenaanduidingen	Mentions de danger	Gefahrenhinweise
	Niet ingedeeld	Non classé	Nicht klassifiziert
	Veiligheidsaanbevelingen	Conseils de prudence	Sicherheitshinweise
	Niet ingedeeld	Non classé	Nicht klassifiziert
	Aanvullende informatie	Information supplémentaire	Ergänzende Informationen
EUH401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van 842 g/l veresterde koolzaadolie. / Concentré émulsionnable (EC) à base de 842 g/l d'huile de colza estérifiée.

Toelatingsnummer / Numéro d'autorisation: 8665P/B

Actirob B: gedeponeerd handelsmerk van / Actirob B: déposée de: Oleon NV
© Copyright Bayer CropScience

Lotnummer / numéro de lot: zie op de verpakking / voir sur l'emballage

Toelatingshouder / Détenteur de l'autorisation:
Oleon NV - Assenedestraat 2 - 9940 Ertvelde (Evergem) - Tel. 09/341 10 11

Verdeiler / Distributeur: Bayer CropScience SA-NV
Kouterveldstraat 7A 301, 1831 Diegem (Machelen)

Tel. 02/535 63 11 www.cropscience.bayer.be Label version: 06/2025



Adjuvant

Actirob® B

Adjuvant/uitvloeier bedoeld om de doeltreffendheid van herbiciden en insecticiden in na-opkomst te verbeteren.

Adjuvant/mouillant destiné à améliorer l'efficacité des herbicides et insecticides de post-émergence.



10L

GEBRUIK EN GEBRUIKSDOSSISSEN

Lees aandachtig het etiket voor gebruik.

1. Suiker- en voederbieten (open lucht)

Toepassen na de opkomst (stadium kiembladeren (BBCH 10) - 8 bladeren (BBCH 18)) in menging met een toegelaten herbicide.
a) In een onkruidbestrijdingssysteem met gefractioneerde toepassingen zal per behandeling de dosis van Actirob B® maximaal 0,3 - 1 l/ha bedragen, dit in functie van het gewas, de klimatologische omstandigheden en de ontwikkeling van de onkruiden.

b) De dosis kan aangepast worden van 0,5 tot 2 l/ha, dit in functie van de weersomstandigheden en van de grootte van de onkruiden op voldoende ontwikkelde bieten (2 bladeren - BBCH 12).

Toepassingsvoorwaarden: Maximum 4 toepassingen/teelt. Veiligheidstermijn vóór de oogst: in functie van het product waarmee Actirob B® gemengd wordt, maar altijd minstens 7 dagen. Het aantal toepassingen hangt af van het gewasbeschermingsmiddel waarmee de toevoegingsstof wordt gemengd. Riscobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

2. Maïs (behalve suikermais) (open lucht)

Toepassen na de opkomst in menging met toegelaten herbiciden aan een dosis tot 2 l/ha in functie van de weersomstandigheden en van de grootte van de onkruiden.

Toepassingsvoorwaarden: Veiligheidstermijn vóór de oogst: in functie van het product waarmee Actirob B® gemengd wordt, maar altijd minstens 7 dagen. Het aantal toepassingen hangt af van het gewasbeschermingsmiddel waarmee de toevoegingsstof wordt gemengd. Riscobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

3. Zomer- en wintertarwe, zomer- en wintergerst, zomer- en winterrogge, zomer- en wintertriticale, zomer- en winterspet (inclusief zaadproductie) (open lucht)

Toepassen aan een dosis van 1 l/ha in menging met een toegelaten na-opkomst herbicide tegen graasachtige onkruiden zoals mesosulfuron-methyl / iodofluron + mefenpyr-diethyl, fenoxaprop-P-ethyl + cloquintocet-mexyl of pyroxulam + cloquintocet-mexyl.

Toepassingsvoorwaarden: Maximum 2 toepassingen/teelt. Veiligheidstermijn vóór de oogst: in functie van het product waarmee Actirob B® gemengd wordt, maar altijd minstens 7 dagen. Riscobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

4. Aardappelen en aardappelpootgoedteelt (open lucht)

a) Toepassen aan een dosis van 1 l/ha in menging met een toegelaten loofdoingsmiddel op het aardappelpoel. Maximum 2 toepassingen.

b) Toepassen aan een dosis van 1 l/ha op onkruiden, in menging met een toegelaten herbicide in voor-opkomst of vroeger na-opkomst (BBCH 00-09). Maximum 1 toepassing.

Toepassingsvoorwaarden: Veiligheidstermijn vóór de oogst: in functie van het product waarmee Actirob B® gemengd wordt, maar altijd minstens 7 dagen. Riscobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

5. Tijdelijk onbebouwd landbouwgronden

Toepassen na de opkomst van 2 l/ha in functie van de weersomstandigheden en van de ontwikkeling van de onkruiden in menging met een toegelaten herbicide. Toepassingsvoorwaarden: Riscobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

6. Miscanthus (plantengras) (open lucht)

Toepassen aan een dosis van 1 l/ha in menging met een toegelaten herbicide. Toepassingsvoorwaarden: Maximum 5 toepassingen / 12 maanden. Het aantal toepassingen hangt af van het gewasbeschermingsmiddel waarmee de toevoegingsstof wordt gemengd. Riscobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

7. Sierbomen en heesters (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)

Toepassen na de opkomst van 1 l/ha in menging met een toegelaten herbicide. Toepassingsvoorwaarden: Maximum 2 toepassingen. Riscobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. Het gebruik in sierplanten wordt toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: *Prunus laurocerasus* et *Thuja plicata*.

8. Timotheegras (graszaadteelt, zaadproductie) (open lucht)

Toepassen na opkomst aan een dosis van 1 l/ha in menging met een toegelaten herbicide (na-opkomst) of groeiregulator. Toepassingsvoorwaarden: Maximum 1 toepassing. Riscobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

9. Klaver (zaadproductie) (open lucht)

Toepassen na de voedersnede, 10-20% van de gewashoogte bereikt (BBCH 31-32) aan een dosis van 1 l/ha in menging met een toegelaten groeiregulator. Toepassingsvoorwaarden: Maximum 2 toepassingen. Het behandelde gewas mag niet vervoerd worden. Riscobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

GEBRUIKEN CONFORM ARTIKEL 51 EG 1107/2009

Het gebruik van Actirob B® in de teelten vermeld in onderstaande tabel is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen weinig of geen werkzaamheids- en/of fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aanbevolen teelt te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voorstene in verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Wortelen, knoflook, bosuien (ritse-uit), sjalot, uien (drooggevoelte) (open lucht)
Toepassen aan een dosis van 1 l/ha in menging met een toegelaten insecticide. Toepassingsvoorwaarden: Maximum 5 toepassingen/teelt. Het aantal toepassingen hangt af van het gewasbeschermingsmiddel waarmee de toevoegingsstof wordt gemengd. Veiligheidstermijn vóór de oogst: in functie van het product waarmee Actirob B® gemengd wordt. Altijs minstens 7 dagen. Riscobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

11. Prei (productieveld), Broccoli, bloemkool (witte en groene), spruitkool, sluitkool (kabuskool, witte, rode, savoi- en spitskool), Chinese kool, paksoi, tatosi en komatsuna, boerenkool (krulool, palmboerenkool), koolrabi (kool-raap-boven-de-grond) (open lucht)
Toepassen aan een dosis van 2 l/ha in menging met een toegelaten insecticide. Toepassingsvoorwaarden: Maximum 5 toepassingen/teelt. Het aantal toepassingen hangt af van het gewasbeschermingsmiddel waarmee de toevoegingsstof wordt gemengd. Veiligheidstermijn vóór de oogst: in functie van het product waarmee Actirob B® gemengd wordt. Altijs minstens 7 dagen. Riscobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.

12. Goudsbloem (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)
Toepassen aan een dosis van 1 l/ha in menging met een loofdoingsmiddel. Toepassingsvoorwaarden: Maximum 2 toepassingen, met een minimum interval tussen de toepassingen van 7 dagen. Riscobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aanbevolen teelt te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

13. Sierplanten (onder bescherming)
Toepassen aan een dosis van 1 l/ha in menging met een toegelaten insecticide of fungicide. Toepassingsvoorwaarden: Maximum 5 toepassingen / 12 maanden. Het aantal toepassingen hangt af van het gewasbeschermingsmiddel waarmee de toevoegingsstof wordt gemengd. Riscobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aanbevolen teelt te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

14. Sierbomen en heesters, sierplanten (niet houtachtig) (open lucht)
Toepassen aan een dosis van 1 l/ha in menging met een toegelaten insecticide. Toepassingsvoorwaarden: Maximum 5 toepassingen / 12 maanden. Het aantal toepassingen hangt af van het gewasbeschermingsmiddel waarmee de toevoegingsstof wordt gemengd. Riscobeperkende maatregelen: een minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. Toepassing tussen de plantrijen zonder de teelt te raken.

Algemene opmerking betreffende de toepassingstechniek: bespuiting tenzij het anders gespecificeerd wordt bij een specifieke teelt.
Algemene opmerking betreffende de dosis
De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt geïllustreerd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd te verkorten.
BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor beroepsgebruik.
- Geefte voor de mogelijke mengingen u te informeren bij uw verdeler, die u het bruikbaar toegelaten product kan aanbevelen.
- De spuitoplossing continu roeren tijdens de toepassing
- Etiket behandelen op gezonde gewassen, die niet geleden hebben van een voorgaande behandeling, mechanische beschadiging of aantasting door insecten.
- Bij zonnig en warm weer is het sterk aanbevolen 's avonds te behandelen.
- Niet behandelen bij temperaturen hoger dan 23°C.

BEREIDING VAN DE SPUIJTLOSSING, BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN
Het product in de voor 1/2 gevulde spuitkan gieten. Mengem en verdere met water aanvullen. De zorgvuldig geleidelijk verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (die open-volgende malen schudden), ofwel met behulp van een reinigingsstelsel met water onder druk dat op het sproeihoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebru