

Kapalný rostlinný biostimulant živočišného původu, který je zdrojem fulvokyselin a je doplněn o stopové živiny - bór, mangan, zinek v minerální formě.

Obsažené živiny

Celkový dusík (N) 8,3 %
Organický dusík (N_{org}) 7,5 %
Vodorozpuštěný bór (B) 0,04 %
Vodorozpuštěný mangan (Mn) 0,4 %
Vodorozpuštěný zinek (Zn) 1,2 %
Organický uhlík (C_{org}) 23 %
Hydrolyzovaný protein

Balení a hmotnost

HDPE kanystr 5 l

Působení přípravku

Ambition® Aktivator je biostimulant určený pro podporu růstu, vitality a výnosu široké škály rostlin - od zeleniny, přes ovocné stromy až po polní plodiny či okrasné rostliny. Jeho účinky vycházejí z kombinace volných aminokyselin, fulvokyselin a mikroprvků. Aminokyseliny podporují vznik nových výhonů, květů a plodů, stimulují fotosyntézu a celkový metabolismus rostlin. Fulvokyseliny usnadňují vstřebávání živin a zlepšují transport vody a živin v rostlině, čímž rostlinám pomáhají lépe využívat základní výživu i přidaná hnojiva. Díky tomu rostliny lépe odolávají různým stresům - například suchu, horku, přesazu nebo jiným nepříznivým podmínkám - a navíc zůstávají vitálnější.

Používá se v klíčových fázích vegetace (např. po vysadbě/přesazu, při rašení, před květem, v době kvetení a při tvorbě plodů), kdy může podpořit silnější kořenový systém, lepší kvetení, efektivnější nasazení plodů a vyšší výnos. Výsledkem může být rychlejší zotavení rostlin z náročných podmínek, lepší příjem živin, vyrovnanější růst a často i kvalitnější a bohatší sklizeň

Doporučení pro aplikaci

Ambition Aktivator se používá s registrovanými přípravky na ochranu rostlin v souladu s registrací. Výrobek je možné aplikovat samostatně nebo ve směsi s většinou přípravků na ochranu rostlin. Nepoužívejte produkt ve směsi s minerálními oleji a sloučeninami mědi. V případě pochybností proveďte před aplikací zkoušky místelnosti.

Možné kombinace dávkování s vybranými produkty

Pšenice ozimá, žito ozimé a tritikale ozimé

2 l/ha Ambition® Aktivator + 1 l/ha Cayunis®

Ječmen ozimý a ječmen jarní

2 l/ha Ambition® Aktivator + 1 l/ha Cayunis®

V případě sníženého tlaku chorob

2 l/ha Ambition® Aktivator + 0,8 l/ha Cayunis®

Návod k použití

Plodina	Dávka produktu (l/ha)	Termín aplikace	Venkovní použití nebo skleník
Réva vinná	1–3	BBCH 00–89, kritické fáze fenologického vývoje	Venkovní
Jádroviny, peckoviny	1–3	BBCH 00–87, kritické fáze vývoje	Venkovní
Kiwi	1–3	kritické fenologické fáze	Venkovní
Plodová zelenina, luskoviny	1–3	od setí/přesazení do růstu plodů	Venkovní / skleník
Listová zelenina, košťálová zelenina, kořenová, cibulová	1–3	od setí/přesazení do růstu	Venkovní / skleník
Brambory	1–3	BBCH 15–79 kritické fáze	Venkovní
Bobulové a drobné ovoce	1–3	kritické fáze květu a růstu plodů	Venkovní / skleník
Obilniny	1–2	BBCH 11–89 kritické fáze	Venkovní
Řepka, slunečnice	1–2	BBCH 11–89 kritické fáze	Venkovní
Cukrovka	1–2	BBCH 15–49 fáze růstu	Venkovní
Sója	1–2	BBCH 11–87 fáze vývoje	Venkovní
Kukuřice, čirok	1–3	BBCH 11–89 kritické fáze	Venkovní
Mandloň, lískový ořech, kaštanovník, ořešák	1–3	BBCH 00–87 fenologické fáze	Venkovní
Ien	1–3	BBCH 15-69 kritické fáze	Venkovní

OL - ochranná lhůta; AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní