

04. 09. 2025

Ambition® Aktivator**Rastlinný biostimulant**

Kvapalný rastlinný biostimulant živočíšneho pôvodu, ktorý je zdrojom fulvokyselín, doplnený o mikroživiny – bór, mangán, zinok v minerálnej forme

Výrobca: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Germany

Distribútor: BAYER, spol s r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

Číslo vzájomného uznania: 2720

Obsah živín:

Celkový dusík (N)	8,3%
Organický dusík (N)	7,5%
Vodorozpustný bór (B)	0,04 %
Vodorozpustný mangán (Mn)	0,4 %
Vodorozpustný zinok (Zn)	1,2 %
Organický uhlík (C)	23 %

Zložky: hydrolyzovaný proteín*, boritan sodný, mangánová soľ, zinočnatá soľ.

* neaplikujte na jedlé časti pestovaných plodín.

Obsah rizikových prvkov a látok neprekračuje limity platné v Slovenskej republike.

Biostimulant AMBITION® AKTIVATOR obsahuje vysokokvalitné hydrolyzované bielkoviny prírodného pôvodu, ktoré sú zdrojom fulvokyselín a sú doplnené o esenciálne mikroživiny (zinok, bór a mangán).

- podporuje vývoj plodín
- vedie k silnejšiemu rastu a podporuje tvorbu generatívnych orgánov
- zlepšuje nasadzovanie kvetov a podporuje rast plodov.

Rozsah a spôsob použitia:

AMBITION® AKTIVATOR je vhodný na použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a amatérskom záhradníctve.

AMBITION® AKTIVATOR sa prednostne používa aplikáciou na list*, je však možné použitie aj vo forme zálievky.

Termíny aplikácie a dávkovanie sú upresnené v tabuľke na konci etikety.

* neaplikujte na jedlé časti pestovaných plodín.

Príprava zmesi:

Pred použitím výrobok pretrepte. Naplňte nádobu aspoň polovicou požadovaného množstva vody, pridajte výrobok za intenzívneho pretrepávania a doplňte chýbajúce množstvo vody.

Ďalšie upresnenia pri používaní:

Pri používaní biostimulantu AMBITION® AKTIVATOR dodržiavajte rovnaké opatrenia, aké sú všeobecne určené na zaobchádzanie s prípravkami na ochranu rastlín. AMBITION® AKTIVATOR vykazuje veľmi nízku fytotoxickosť na ošetrovaných plodinách. Veľmi nízke teploty môžu viesť k zvýšeniu viskozity výrobku.

Ošetrované plodiny môžu byť spásané hospodárskymi zvieratami alebo použité ako krmivo najmenej 21 dní po ošetrení plodín.

04. 09. 2025

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky v Bratislave
833 16 Bratislava, Malúškova 21
4-2

Miešateľnosť:

AMBITION® AKTIVATOR je úplne rozpustný vo vode. Môže sa aplikovať samostatne alebo v zmesi s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín. Nepoužívajte výrobok v zmesi s minerálnymi olejmi a zlúčeninami medi.

V prípade pochybností vykonajte pred aplikáciou skúšky miešateľnosti.

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, varovné označenia:

H411 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.



Dbajte o to, aby sa výrobok nedostal do kanalizácie a zabráňte kontaminácii povrchových a podzemných vôd.

Podmienky skladovania:

Vďaka špeciálnemu zloženiu a výrobnej technológii biostimulant AMBITION® AKTIVATOR neobsahuje ani nevyžaduje konzervačné látky a je stabilný minimálne 5 rokov, pri skladovaní v pôvodnom neporušenom obale.

Skladujte pri teplote od +4 do +30°C na dobre vetranom mieste mimo dosahu priameho slnečného svetla. Pri nízkych teplotách sa viskozita výrobku zvyšuje a jeho tekutosť sa môže znížiť bez toho, aby bola ohrozená kvalita výrobku.

Skladujte v pôvodnom uzavretom obale na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Výrobok skladujte mimo dosahu zdrojov vznietenia.

Veľkosť balenia: 1 L, 2 L, 3 L, 5 L, 10 L, 15 L

Čistá hmotnosť: 1,27 kg, 2,54 kg, 3,82 kg, 6,35 kg, 12,7 kg, 19,1 kg

Doba použiteľnosti: 5 rokov

Zabráňte kontaktu s uniknutým výrobkom alebo kontaminovanými povrchmi. Používajte osobné ochranné prostriedky. V prípade rozliatia posypte pilinami a/alebo pieskom.

Číslo šarže: XXX

Dátum výroby: XX/XX/XXXX

Upozornenie:

Zloženie výrobku, jeho formulácia a obsah živín sú zaručené spoločnosťou Bayer.

Výrobok používajte výhradne v súlade s návodom na použitie.

Na použitie ale môže mať vplyv rad faktorov, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti Bayer (príprava zmesí, aplikácia, priebeh počasia a pod.).

Spoločnosť Bayer nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím či nesprávnym skladovaním výrobku.

SCNÚH'EHE' 3.gr.

04.09.2025

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky v Bratislave
833 16 Bratislava, Matúškova 21
4-2

S=04-7

Plodiny	Dávka výrobu (L/ha)		Počet aplikácií		Interval medzi aplikáciami	Dávka vody		Termín aplikácie	Typ aplikácie (na list / zálievka)	Pole (P) alebo skleník (S)
	Min	Max	Min	Max		Min	Max			
Vinič (stolové a muštové odrody)	1	3	1	6	7-10 dní	100	1500	BBCH 00 - BBCH 89 v najkritickejších fenologických fázach (od dormancie po dozrievanie)	na list	P
	1	6							zálievka	
Jadrové a kôstkové ovocie, citrusové ovocie a olivovníky	1	3	1	6	14 dní	500	1500	BBCH 00 - BBCH 87 v najkritickejších fenologických fázach (od dormancie po kvitnutie, nasadzovanie plodov a ich vývoj)	na list	P
	2	6							zálievka	
Kiwi	1	3	1	6	7-10 dní	100	1500	BBCH15 - BBCH 81 v najkritickejších fenologických fázach (od pučania po začiatok dozrievania)	na list	P
	1	6							zálievka	
Plodová zelenina, strukoviny	1	3	2	6	7-14 dní	200	1500	Od výsevu/presádzania po rast plodov	na list zálievka	P, S
Listová zelenina, kapustová zelenina, koreňová, cibuľová a stonková zelenina	1	3	2	6	7-14 dní	100	1000	Od výsevu/presádzania po rast plodov	na list zálievka	P, S
Zemiaky	1	3	1	4	14 dní	200	1000	BBCH15 - BBCH 79 v najkritickejších fázach (pučanie-klíčenie, kvitnutie, vývoj hlúz)	na list zálievka	P
Bobuľové a drobné ovocie (jahody, čučoriedky...)	1	3	1	6	14 dní	200	1000	BBCH15 - BBCH 89 V najkritickejších fázach (pučanie-klíčenie, kvitnutie, vývoj plodov)	na list	P, S
Obilniny	1	2	1	4	14 dní	100	400	BBCH11 - BBCH 69 v najkritickejších fenologických fázach (odnožovanie, metanie, tvorba klasov)	na list	P
Repka a sľečnica	1	2	1	3	14 dní	200	400	BBCH11 - BBCH 69 V najkritickejších fenologických fázach (od skorej fáz do konca kvitnutia)	na list	P
Repa cukrová	1	2	1	3	14 dní	200	400	BBCH15 - BBCH 49 V najkritickejších fenologických	na list	P

Plodiny	Dávka výrobu (L/ha)		Počet aplikácií		Interval medzi aplikáciami	Dávka vody		Termín aplikácie	Typ aplikácie (na list / zálievka)	Pole (P) alebo skleník (S)
	Min	Max	Min	Max		Min	Max			
								fázach (od počiatočných fáz po rast koreňa)		
Sója	1	2	1	3	14 dní	100	300	BBCH11 - BBCH 69 V najkritickejších fenologických fázach (od počiatočných fáz po koniec kvitnutia)	na list	P
Tabak	1	2	1	3	7-10 dní	200	1000	BBCH15 - BBCH 69 V najkritickejších fenologických fázach (od počiatočných fáz po koniec kvitnutia)	na list	P
Kukurica a cirok	1	3	1	3	14 dní	100	300	BBCH 11 - BBCH 69 V najkritickejších fenologických fázach (od vytvoreného prvého listu po koniec kvitnutia)	na list	P
Mandľa, lieska, gaštan jedlý, orech vlašský	1	3	1	6	7 - 14 dní	100	1500	BBCH 15 -BBCH 87 (od pučania po dozrievanie)	na list	P
	2	6				500	1500	BBCH 00- BBCH 87 (od dormancie po dozrievanie)	zálievka	P
L'an	1	3	1	3	14 dní	100	300	BBCH15 - BBCH 69 V najkritickejších fenologických fázach (od počiatočných fáz po koniec kvitnutia)	na list	P