

Ambition® Aktivator

Rostlinný biostimulant

Kapalný rostlinný biostimulant živočišného původu, který je zdrojem fulvokyselin a je doplněn o stopové živiny – bór, mangan, zinek v minerální formě.

Výrobce: SICIT Group S.p.A., Via Arzignano 80, 360 72 Chiampo (Vicenza), Itálie

Dodavatel: BAYERs.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3

Evidenční číslo vzájemného uznání: V1112

UFI: S5C2-D0U8-K00N-ERJC

Obsah živin:

Celkový dusík (N)	8,3 %
Organický dusík (N _{org})	7,5 %
Vodorozpustný bór (B)	0,04 %
Vodorozpustný mangan (Mn)	0,4 %
Vodorozpustný zinek (Zn)	1,2 %
Organický uhlík (C _{org})	23 %

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v ČR.

Složky: hydrolyzovaný protein*, boritan sodný, manganová sůl, zinečnatá sůl

*Neaplikujte na jedlé části pěstovaných plodin.

Biostimulant, který obsahuje vysoce kvalitní hydrolyzované bílkoviny přírodního původu, jež jsou zdrojem fulvokyselin a jsou doplněné o esenciální mikroživiny (zinek, bór a mangan).

- podporuje vývoj plodin,
- vede k silnějšímu růstu rostlin a podporuje tvorbu generativních orgánů,
- zlepšuje násadu plodů po odkvětu a podporuje růst plodů.

Návod k použití:

AMBITION® AKTIVATOR je vhodný k použití v zemědělské a zahradnické produkci.

AMBITION® AKTIVATOR se především používá k aplikaci na list*, lze jej použít i ve formě závlivky. Termíny aplikace a dávkování jsou upřesněny v tabulce na konci etikety.

*Neaplikujte na jedlé části pěstovaných plodin.

Příprava směsi:

Produkt před použitím protřepejte. Nádobu naplňte nejméně polovinou požadovaného množství vody, přidejte produkt a silně protřepejte a poté doplňte zbývajícím množstvím vody.

Další upřesnění použití:

Při použití produktu uplatňujte stejná opatření, která obecně platí pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Produkt se vyznačuje velmi nízkou fytotoxicitou pro ošetřované plodiny. Velmi nízké teploty mohou vést ke zvýšení viskozity produktu.

Nejméně 21 dnů po ošetření zamezte spásání ošetřených plodin zvířaty a nepoužívejte je jako krmivo.

Mísitelnost:

Produkt je plně rozpustný ve vodě. Výrobek je možné aplikovat samostatně nebo ve směsi s většinou přípravků na ochranu rostlin. Nepoužívejte produkt ve směsi s minerálními oleji a sloučeninami mědi. V případě pochybností proveďte před aplikací zkoušky mísitelnosti.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Označení

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.



Skladování:

Díky speciální formulaci a výrobní technologii produkt neobsahuje ani nevyžaduje konzervanty a je stabilní nejméně po dobu 5 let při skladování v originálním neporušeném obalu.

Uchovávejte v originálním uzavřeném obalu, na chladném, suchém a dobře větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření. Při nízkých teplotách stoupá viskozita produktu a může se stávat méně tekutým, aniž by došlo k narušení jeho kvality.

Uchovávejte produkt mimo dosah zdrojů vznícení.

Doba použitelnosti: 5 let (teplota skladování +4 až +30 °C)

Vyhnete se kontaktu s rozlitym produktem a znečištěnými povrchy. Používejte osobní ochranné prostředky. V případě rozlití nechte produkt vsáknout do pilin a/nebo písku.

Zamezte úniku produktu do kanalizace a zamezte kontaminaci podzemních a povrchových vod.

Číslo šarže: XXX

Datum výroby: XX/XX/XXXX

Balení: ___ l

Čistá hmotnost: ___ kg

Dodatková informace společnosti Bayer:

Složení produktu, formulace a obsah živin jsou zaručeny společností Bayer.

Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití.

Na použití ale může mít vliv řada faktorů, které jsou mimo naši kontrolu (příprava směsí, aplikace, průběh počasí apod.).

Společnost Bayer nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či nesprávným skladováním přípravku.

Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s evropskými předpisy.

Plodina	Dávka produktu (l/ha)		Počet aplikací		Interval mezi aplikacemi	Dávka vody (l/ha)		Termín aplikace	Typ aplikace (na list / zálivka)	Venkovní použití nebo skleníků
	Min.	Max.	Min.	Max.		Min.	Max.			
réva vinná (stolní a moštové odrůdy)	1	3	1	6	7-10 dnů	100	1500	BBCH 00-89 v nejvíce kritických fázích fenologického vývoje (od dormance po zralost)	na list	venkovní použití
	1	6							zálivka	
jádroviny, peckoviny	1	3	1	6	14 dnů	500	1500	BBCH 00-87 v nejvíce kritických fázích fenologického vývoje (od dormance po kvetení, násadu plodů a jejich vývoj)	na list	venkovní použití
	2	6							zálivka	
kiwi	1	3	1	6	7-10 dnů	100	1500	BBCH 15-81 v nejvíce kritických fázích fenologického vývoje (od pučení po počátek zrání)	na list	venkovní použití
	1	6						BBCH 00-81 v nejvíce kritických fázích fenologického vývoje (od dormance po počátek zrání)	zálivka	venkovní použití
plodová zelenina, luskoviny	1	3	2	6	7-14 dnů	200	1500	od setí/přesazení do růstu plodů	na list, zálivka	venkovní použití, skleníků
listová zelenina, košťálová zelenina, kořenová, cibulová a řapíkatá a stonková zelenina	1	3	2	6	7-14 dnů	100	1000	od setí/přesazení do růstu plodů	na list, zálivka	venkovní použití, skleníků
brambory	1	3	1	4	14 dnů	200	1000	BBCH 15-79 v nejvíce kritických fázích (klíčení, kvetení, vývoj hlíz)	na list, zálivka	venkovní použití
bobulové a drobné ovoce (jahody, borůvky, ...)	1	3	1	6	14 dnů	200	1000	BBCH 15-89 v nejvíce kritických fázích (pučení, kvetení, vývoj plodů)	na list	venkovní použití, skleníků
obilniny	1	2	1	4	14 dnů	100	400	BBCH 11-69 V nejvíce kritických fázích (odnožování, metání, tvorba klasů)	na list	venkovní použití

Plodina	Dávka produktu (l/ha)		Počet aplikací		Interval mezi aplikacemi	Dávka vody (l/ha)		Termín aplikace	Typ aplikace (na list / zálivka)	Venkovní použití nebo skleníků
	Min.	Max.	Min.	Max.		Min.	Max.			
řepka olejka, slunečnice	1	2	1	3	14 dnů	200	400	BBCH 11-69 V nejvíce kritických fázích (od časných fází po konečné kvetení)	na list	venkovní použití
cukrovka	1	2	1	3	14 dnů	200	400	BBCH 15-49 V nejvíce kritických fázích (od časných fází po růst bulvy)	na list	venkovní použití
sója	1	2	1	3	14 dnů	100	300	BBCH 11-69 V nejvíce kritických fázích (od časných fází po konečné kvetení)	na list	venkovní použití
kukuřice, čirok	1	3	1	3	14 dnů	100	300	BBCH 11-69 V nejvíce kritických fázích fenologického vývoje (od vytvořeného prvního listu po konečné kvetení)	na list	venkovní použití
mandloň, líska obecná, kaštanovník, ořešák vlašský	1	3	1	6	7-14 dnů	100	1500	BBCH 15-87 (od pučení po zrání)	na list	venkovní použití
	2	6				500	1500	BBCH 00-87 (od dormance po zrání)	zálivka	venkovní použití
len	1	3	1	3	14 dnů	100	300	BBCH 15-69 v nejvíce kritických fázích (od časných fází po konečné kvetení)	na list	venkovní použití