

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BRODAL

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentráту pre riedenie vodou (SC), určený na reguláciu výskytu jednoročných burín v obilninách.

ÚČINNÁ LÁTKA

Diflufenican 500 g/l
(42,0 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

diflufenican, CAS No.: 83164-33-4

ethoxylated polyarylphenol, CAS No.: 99734-09-5

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, CAS No.: 2634-33-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU



GHS09

Pozor

- | | |
|---------------|---|
| H410 | Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| P102 | Uchovávať mimo dosahu detí. |
| P264 | Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár vlažnou vodou a mydlom. |
| P270 | Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. |
| P273 | Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. |
| P280 | Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. |
| P391 | Zozbierajte uniknutý produkt. |
| P501 | Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov, v súlade s platným zákonom o odpadoch. |
| EUH208 | Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Môže vyvolávať alergickú reakciu. |
| EUH401 | Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie. |
| SP 1 | Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek). |
| SPe3 | Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 15 m pri 50%, 10 m pri 75% a 5 m pri 90% redukcii úletu. |

- Z4** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.
- Vt5** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
- Vo2** Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.
- V3** Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.
- Vč3** Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie. Prípravok je pre populácie užitočných článkonožcov s prijateľným rizikom.

Zákaz použitia prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd (podzemných a povrchových)!

V ochrannom pásme povrchových vôd 2. stupňa sa použitie prípravku obmedzuje nasledovne:

1. Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je držaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

2. Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov do verejnej kanalizácie!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte neošetrovanú vegetačnú ochrannú zónu!

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami, ktoré dráždi!

Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie: BAYER, spol. s r. o.
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP: **25-02073-AU**

Dátum výroby: uvedené na obale
Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale

Balenie: 0.5 L, 1 L, 3 L, 5 L, 10 L, 15 L HDPE fľaša / kanister
0.5 L, 1 L, 3 L, 5 L, 10 L, 15 L coex HDPE/PA fľaša / kanister
0.5 L a 1 L coex HDPE/EVOH fľaša / kanister

BRODAL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti BAYER AG.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok BRODAL je selektívny herbicíd určený do ozimných obilnín na preemergentnú alebo skorú postemergentnú aplikáciu. Má kontaktný a reziduálny pôdny účinok, účinkuje na klíčiace, vzchádzajúce a aj už vzídené buriny v skorých rastových fázach. Rastliny ho prijímajú koreňovým systémom, hypokotylom, klíčiacími výhonkami a rastovými vrcholmi.

Prípravok BRODAL pri preemergentnej alebo skorej postemergentnej aplikácii veľmi dobre účinkuje najmä na citlivé ozimné jednoročné buriny. Herbicídny účinok na buriny možno pozorovať po 2-10 dňoch a prejavuje sa zastavením rastu, blednutím a nekrotizáciou. Buriny môžu štandardne vziať, následne však zblednú a hynú.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

PRE

Dávka 0,2 l/ha:

Citlivé buriny: kapsička pastierska, nevädza poľná, hluchavka purpurová, hviezdica prostredná, veronika perzská, veronika poľná, fialky, mak vlčí, rumančeky, lipkavec obyčajný, lipnica ročná, metlička obyčajná;

Stredne citlivé buriny: psiarka roľná, výmrv repky;

Dávka 0,14 l/ha:

Citlivé buriny: fialka roľná, veronika perzská, hviezdica prostredná, mak vlčí, rumančeky, hluchavka purpurová, pakosty, lipkavec obyčajný, bocianik rozpukovitý, nevädza poľná, lipnica ročná;

Stredne citlivé buriny: metlička obyčajná;

Odolné buriny: psiarka roľná, výmrv repky;

Dávka 0,1 l/ha:

Citlivé buriny: veronika perzská, hluchavka purpurová, fialka roľná, hviezdica prostredná, lipkavec obyčajný, nevädza poľná;

Stredne citlivé buriny: rumančeky, mak vlčí, lipnica ročná;

Odolné buriny: psiarka roľná, výmrv repky, metlička obyčajná;

POST

Dávka 0,2 l/ha:

Citlivé buriny: veronika perzská, hluchavka purpurová, fialka roľná, hviezdica prostredná, rumanček, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, lipnica ročná, metlička obyčajná;

Odolné buriny: psiarka roľná, výmrv repky;

Dávka 0,14 l/ha:

Citlivé buriny: fialka roľná, hviezdica prostredná, rumanček, hluchavka purpurová, pakosty, lipkavec obyčajný, bocianik rozpukovitý, kapsička pastierska, lipnica ročná;

Stredne citlivé buriny: veronika perzská, mak vlčí, metlička obyčajná;

Odolné buriny: nevädza poľná, výmrv repky, psiarka roľná;

Dávka 0,1 l/ha:

Citlivé buriny: fialka roľná, veronika perzská, hviezdica prostredná, hluchavka purpurová, lipkavec obyčajný, lipnica ročná;

Stredne citlivé buriny: rumanček, kapsička pastierska, metlička obyčajná;

Odolné buriny: mak vlčí, výmrv repky, psiarka roľná.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/ ha	Ochranná doba	Poznámka
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale ozimné, pšenica špaldová, pšenica tvrdá ozimná	metlička, lipnica, jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,2 l/ha	AT	PRE na jeseň
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale ozimné, pšenica špaldová, pšenica tvrdá ozimná	lipnica, jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,14 l/ha	AT	PRE na jeseň
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale ozimné, pšenica špaldová, pšenica tvrdá ozimná	jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,1 l/ha	AT	PRE na jeseň
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale ozimné, pšenica špaldová, pšenica tvrdá ozimná	metlička, lipnica, jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,2 l/ha	AT	POST na jeseň
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale ozimné, pšenica špaldová, pšenica tvrdá ozimná	lipnica, jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,14 l/ha	AT	POST na jeseň
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale ozimné, pšenica špaldová, pšenica tvrdá ozimná	jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,1 l/ha	AT	POST na jeseň

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale ozimné, pšenica špaldová, pšenica tvrdá ozimná

Dávka vody: 200-400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie plodiny: 1×.

Termín aplikácie: preemergentne na jeseň vo fáze napučievania (BBCH 00-09), postemergentne na jeseň vo fáze od vývoja listu do fázy objavenia sa 9. alebo ďalších odnoží (BBCH 10-29).

Predpokladom účinnosti prípravku je dostatočná pôdna vlhkosť. Na pôdach s vyššou sorpčnou schopnosťou a na pôdach s vysokou náchylnosťou na vysychanie povrchových vrstiev nemožno vylúčiť zníženie účinnosti.

Herbicídny film, ktorý vznikne po správnej aplikácii prípravku, nesmie byť porušený spracovaním pôdy alebo prudkými zrážkami bezprostredne po aplikácii. Ak po aplikácii prípravku nasledujú výdatnejšie zrážky, nemožno vylúčiť (najmä na ľahkých pôdach) splavenie prípravku do koreňovej zóny rastlín a následné poškodenie ošetrovaného porastu.

Na piesočnatých pôdach, hlavne s obsahom humusu pod 1% nemožno vylúčiť poškodenie ošetrovaného porastu.

Menej významné použitie**NÁVOD NA POUŽITIE**

Plodina	Účel použitia	Dávka/ ha	Ochranná doba	Poznámka
ovos ozimný	metlička, lipnica, jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,2 l/ha	AT	PRE na jeseň
ovos ozimný	lipnica, jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,14 l/ha	AT	PRE na jeseň
ovos ozimný	jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,1 l/ha	AT	PRE na jeseň
ovos ozimný	metlička, lipnica, jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,2 l/ha	AT	POST na jeseň
mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, kostrava lúčna	metlička, lipnica, jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,2 l/ha	-	POST na jeseň
ovos ozimný	lipnica, jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,14 l/ha	AT	POST na jeseň
mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, kostrava lúčna	lipnica, jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,14 l/ha	-	POST na jeseň
ovos ozimný	jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,1 l/ha	AT	POST na jeseň
mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, kostrava lúčna	jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,1 l/ha	-	POST na jeseň

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNYPRE APLIKÁCIU

Ovos ozimný, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, kostrava lúčna

Dávka vody: 200-400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie plodiny: 1×.

Termín aplikácie: preemergentne na jeseň vo fáze napučievania (BBCH 00-09), postemergentne na jeseň vo fáze od vývoja listu do fázy objavenia sa 9. alebo ďalších odnoží (BBCH 10-29).

Mätonoh a kostrava ošetrené prípravkom na ochranu rastlín BRODAL nesmú byť použité na konzumné ani kŕmne účely!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Po aplikácii môže dôjsť k zosvetleniu ošetrovaných plodín, najmä ak tesne po aplikácii nasledujú silné zrážky, nočné mrazy alebo je porušená pôdna vrstva. Tieto prejavy sú prechodné a nemajú negatívny vplyv na úrodu. Odrodovú citlivosť konzultujte s držiteľom autorizácie.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

SKUPINA	12 (F1)*	HERBICÍD
----------------	-----------------	-----------------

* v zátvorke kurzívou pôvodné HRAC kódovanie

Prípravok BRODAL obsahuje účinnú látku Diflufenican, ktorý je v rámci klasifikácie HRAC zaradený do skupiny 12 (F1) – fenylétery. Mechanizmus jeho účinku spočíva v inhibícii fytoén desaturázy.

V rámci antirezistentnej stratégie odporúčame dodržiavať nasledovné zásady:

Aplikujte herbicíd len keď je to potrebné. Herbicíd aplikujte v schválených dávkach a v odporúčaných termínoch aplikácie. V ochrane proti burinám používajte herbicídy s rozličným mechanizmom účinku. Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov. Dodržujte preventívne opatrenia proti vzniku rezistencie t.j. správne striedanie plodín. V priebehu vegetácie nepoužívajte prípravky s rovnakým mechanizmom účinku niekoľkokrát za sebou.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní pokynov uvedených v etikete, nemá aplikácia prípravku negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ak po aplikácii prípravku v ozimných obilninách, keď nasleduje extrémne sucho (menej než 150 mm zrážok), môže dôjsť k poškodeniu následne pestovanej horčice a cukrovej repy. Riziko poškodenia možno minimalizovať orbou alebo hlbokým spracovaním pôdy.

Pri predčasnom ukončení pestovania ozimných obilnín je možné po orbe alebo hlbokom spracovaní pôdy na jar pestovať mätonoh mnohokvetý, kukuricu, hrach, bôb alebo slnečnicu po použití dávky 0,2 l/ha a repku jarnú po použití 0,1 l/ha.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry ani pozemky určené na osev!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Negatívny vplyv na užitočné a necieľové organizmy nebol v pokusoch pozorovaný. Údaje o možnom negatívnom vplyve na užitočné a necieľové organizmy, pri použití v súlade s etiketou nie sú známe.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred prípravou postrekovej kvapaliny dôkladne premiešajte obsah balenia aby vznikla homogénna zmes. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Postrekovač musí byť vyčistený čo najskôr po ukončení aplikácie, inak hrozí nebezpečenstvo zaschnutia zvyškov postrekovej kvapaliny a jej zložitú odstraňovanie a tiež poškodenia iných kultúr ošetrovaných týmto postrekovačom.

POSTUP:

1. Vystriekajte všetku postrekovú kvapalinu na ošetrovanom pozemku.
2. Rozoberte sacie a výtláčné vedenie a tryskové filtre a dobre ich prepláchnite vo vode po dobu aspoň 10 minút.
3. Naplňte nádrž čistou vodou a za stáleho miešania pridajte čistiaci prostriedok učený na dekontamináciu. Týmto roztokom vypláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania a potom vypustite.
4. Opakujte postup podľa bodu 3 ešte raz.
5. Vodu po oplachu zlikvidujte na vyhradenom mieste tak, aby nedošlo ku kontaminácii zdrojov podzemných vôd ani recipientov povrchových vôd.
6. Skontrolujte filtre, či neobsahujú viditeľné usadeniny.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie (etiketu prípravku)!

Príprava postrekovej kvapaliny:

Pri príprave postrekovej kvapaliny je nutné používať ochranný pracovný odev odolný voči chemikáliám, gumovú/PVC zásteru, rukavice odolné voči chemikáliám, ochranný štít na tvár resp. ochranné okuliare, respirátor na ochranu dýchacích orgánov a gumovú pracovnú obuv. Pri príprave postrekovej kvapaliny sa neodporúča používať kontaktné šošovky.

Aplikácia:

Pri aplikácii postreku je potrebné používať ochranný celotelový pracovný odev, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár resp. ochranné okuliare, respirátor na ochranu dýchacích orgánov a gumovú pracovnú obuv.

Prípravok je nutné aplikovať iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Pri manipulácii s prípravkom sa treba vyhnúť postriekaniu kože a vniknutiu prípravku do očí. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom, je zakázané jesť, piť a fajčiť.

Ak nebol použitý jednorazový ochranný pracovný odev, je potrebné pracovný odev a ďalšie osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) po ukončení práce vyprať resp. očistiť. Je zakázané vynášať kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Poškodené OOPP je potrebné urýchlene vymeniť. Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku v smere vetra, aby nebola zasiahnutá obsluha a ďalšie osoby. Pri aplikácii sa neodporúča používať kontaktné šošovky. Práca s prípravkom je zakázaná tehotným a dojčiacim ženám, mladistvým a je nevhodná pre osoby trpiace alergickým ochorením.

Pracovníci vstupujúci do ošetrovaných porastov:

Musia mať primerané ochranné pracovné oblečenie pokrývajúce celé telo, pevnú uzavretú obuv, ochranné rukavice a môžu vstupovať do ošetrovaných miest až po zaschnutí postreku na rastlinách, najskôr po 24 hodinách.

Obmedzenia s cieľom chrániť zdravie miestnych obyvateľov a náhodne sa vyskytujúcich okolostojacich osôb:

Vzdialenosť medzi hranicou ošetrenej plochy od hranice oblasti využívanej zraniteľnými skupinami obyvateľstva nesmie byť menšia ako 5 metrov.

Pod oblasťami využívanými zraniteľnými skupinami obyvateľov sa v tomto kontexte považujú: verejné parky a záhrady, cintoríny, športoviská a rekreačné strediská, školské areály a detské ihriská, areály zdravotníckych zariadení, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia poskytujúce liečebnú starostlivosť alebo kultúrne zariadenia, ale taktiež okolia obytných domov, záhrady, pozemky vrátane prístupových ciest a pod.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Použite pri zásahu proti požiaru izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

- Všeobecné pokyny:** V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr. nevoľnosť, pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.) alebo v prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára.
- Po nadýchaní:** Prerušte prácu. Opustite ošetrovanú oblasť, alebo preneste postihnutého mimo ošetrovanú oblasť.
- Pri zasiahnutí pokožky:** Odložte kontaminovaný / nasiaknutý odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte teplou vodou a mydlom. Pokožku potom dobre opláchnite. Pri väčšej kontaminácii pokožky sa osprchujte.
- Pri zasiahnutí očí:** Vypláchnite oči po dobu aspoň 10-tich minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, zlikvidujte ich.
- Pri náhodnom požití:** Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrovania informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite mu informáciu z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (príp. následnú liečbu) je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. +421 (0)2 5477 4166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 °C do +30 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby. Chráňte pred mrazom, vlhkosťou a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužitý zvyšok prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriadení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmie však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužitý zvyšok postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.