

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Заступник Міністра захисту довкілля
та природних ресурсів України**



Олена КРАМАРЕНКО

2024 р.

ТАРНА ЕТИКЕТКА

Конфідор® 200 SL, РК
(імідаклоприд, 200 г/л (g/L))
інсектицид

1. Заявник: Байер АГ (Bayer AG), Німеччина, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373, Leverkusen, <https://www.bayer.com/>, телефон: +49 214 301. Штаб-квартира підрозділу Bayer Crop Science: Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, <https://www.cropscience.bayer.com/>; телефон: +49 2173 380; електронна пошта: info@bayer.com.

Представник в Україні: ТОВ «БАЙЄР», м. Київ, 04071, вул. Верхній Вал, 4-Б, телефон: +38 044 220 33 00, <http://www.bayer.ua>

2. Виробник препаративної форми:

Байер АГ, м. Дормаген, Німеччина;

Байер КропСаєнс, С.Л., м. Куарт де Поблет (Валенсія), Іспанія;

Байер САС, Підрозділ КропСаєнс, м. Марль, Франція;

Ширм ГмбХ, м. Шонебек (Ельба), Німеччина;

Індустріаз Кіміказ дел Валлес С.А.Ю., м. Куарт де Поблет, м. Честе, (Валенсія), Іспанія;

Байер КропСаєнс ЛП, м. Канзас Сіті, США;

Байер Тюрк Кім'я Сан. Лтд. Сті., Байер КропСаєнс, м. Гебзе, Туреччина;

Байер (Пту) Лтд., м. Найджел, Південна Африка;

Байер САС, Підрозділ КропСаєнс, м. Вільфранш, Франція.

Діючої речовини: Байер АГ, Німеччина.

3. Призначення: системний інсектицид контактної і кишкової дії. Механізм дії: діючі речовини препарату впливають на нервову систему шкідників, порушуючи утворення та проходження нервових імпульсів у комах, викликаючи судоми та загибель останніх.

4. Класифікація і токсичність: відповідно до Гігієнічної класифікації пестицидів за ступенем небезпечності (ДСанПіН 8.8.1.002-98) препарат за лімітуючими критеріями шкідливості відноситься до пестицидів 3 класу небезпечності, високостійкий у воді.

Маркування відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 (CLP):

- **Імідаклоприд**



Увага

H410: Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками

Для захисту бджіл та інших комах-запилювачів, не застосовувати під час цвітіння! Не використовувати під час активного льоту бджіл. Перемістити на значну відстань пасіку або закрити льотні отвори вуликів на час застосування. Не застосовувати препарат при наявності квітучих бур'янів. Видалити бур'яни до цвітіння.

5. Реєстраційний номер, серія: 11849, серія А 07078.

Дата закінчення терміну реєстрації: 31.12.2028.

6. **Форми пакування:** полімерні ємності (пляшки, каністри, бочки, контейнери) об'ємом від 0,5 л (L) до 1000 л (L).

7. **Дата виготовлення:** вказано на упаковці.

8. **Гарантійний термін зберігання:** 4 роки з дати виготовлення, за дотримання умов зберігання.

9. **Сумісність з іншими препаратами:** продукт сумісний з іншими препаратами. Але, в будь-якому випадку, перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність. При змішуванні з іншими продуктами (будь-які пестициди, ад'юванти чи добрива) звернутися до представника компанії для отримання додаткової інформації. Бакові партнери до суміші повинні додаватися у такому порядку: спочатку порошки, що змочуються, далі гранули, що диспергуються у воді, наступні розчинні концентрати, концентрати суспензій та концентрати, що емульгуються і масляні дисперсії. Наприкінці додаються ад'юванти та добрива. Перед додаванням чергового компоненту звернути увагу на те, щоб кожна складова бакової суміші рівномірно розподілилася у воді.

10. **Порядок приготування робочого розчину:** для обприскування: додати 1/2 необхідної кількості води в резервуар для змішування. Запустивши мішалку, додати препарат. Продовжуючи перемішування, додати залишок води. Застосування розчину починати тільки після того як продукт повністю і рівномірно розподілений у воді. Продовжувати перемішування, доки не буде застосована вся суміш. Підтримувати максимально можливу швидкість перемішування протягом обприскування. Не залишати робочий розчин в обприскувачі на тривалий час без перемішування. З метою забезпечення високої якості покриття рослин робочим розчином, необхідно використовувати відповідне обладнання. Завжди калібруйте обладнання перед обробкою. Витрати робочої рідини для обприскування повинні становити 300 л/га (L/ha) для картоплі та томатів відкритого ґрунту, 400 – 600 л/га (L/ha) для томатів та огірків закритого ґрунту, 1000 л/га (L/ha) для яблуні та сливи.

Приготування робочого розчину для застосування методом крапельного зрошування: спочатку використати близько 70 – 80% передбаченої для зрошування кількості води. Потім у підключеній до системи зрошування ємності 100 – 200 л (L) приготувати маточний розчин препарату і почати внесення. Завершити внесення обов'язковим промиванням системи такою кількістю чистої води, яка дорівнює об'єму системи в цілому. Виконання цієї умови забезпечує внесення повної норми препарату і запобігає виникненню його невикористаних залишків в системі зрошування.

Увага! За досягнення порогових значень концентрацій маточного розчину за певних умов жорсткості води препарат може утворювати нерозчинний осад. Порогова концентрація може бути різною залежно від сольового складу води. Під час приготування маточного розчину для обробки методом крапельного зрошування рекомендується визначити індивідуальну порогову концентрацію, додаючи препарат до 1 л (L) води з допомогою шприца або мірної піпетки. Концентрація маточного розчину не повинна перевищувати порогову (рекомендується вдвічі нижча за останню). Норму витрати препарату розраховувати відповідно до таблиці.

11. **Регламент застосування:** у сільському господарстві на культурах та з нормами витрати відповідно до таблиці.

Перед початком робіт потрібно зробити розрахунки необхідної кількості препарату, користуючись при цьому наведеною нижче таблицею:

Норма витрати препарату, л/га (L/ha)	Культура, (об'єкт), що підлягає обробці (застосуванню)	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробки, обмеження і заборони	Строк останньої обробки (в днях до збирання врожаю)
0,15 – 0,2	Картопля, томати	Колорадський жук, попелиці, трипси	Обприскування в період	20

			вегетації	
0,25	Томати та огірки закритого ґрунту	Білокрилка теплична, попелиці, трипси	Обприскування в період вегетації	3
0,2 – 0,3	Яблуня, слива	Сисні шкідники, яблунева та сливова попелиці, довгоносики	Обприскування в період вегетації	30
1,0	Томати, (крапельне зрошення)	Комплекс шкідників	Застосування методом крапельного зрошення	15
1,0	Цибуля (крапельне зрошення)	комплекс шкідників	Застосування методом крапельного зрошення	20

Не застосовуйте пізніше зазначеного у таблиці строку останньої обробки до збирання врожаю.

Спосіб, час обробок, обмеження: обприскування у період вегетації, обробку рекомендується проводити у вечірні або ранішні часи.

Максимальна кратність обробок: 1.

Строки виходу людей для проведення ручних/механізованих робіт (днів): картопля – 1/1, томати відкритого ґрунту – 3/1, огірки та томати закритого ґрунту – 1/не регламентується, яблуня, слива, томати та цибуля методом крапельного зрошення – 3/1.

Відсутність фітотоксичної дії за умови відповідного до тарної етикетки використання.

Продукт слід застосовувати з рекомендованими нормами витрати, зазначеними на етикетці, і достатнім об'ємом робочого розчину, для досягнення рівномірного покриття, необхідного для оптимального контролю шкідників.

Не обробляти сільськогосподарські культури, що страждають від посухи, заморозків або будь-яких інших фізичних чи хімічних стресів.

Не застосовувати, якщо є висока ймовірність випадання дощу після обробки.

Безпечність для нецільових об'єктів: за умови дотримання рекомендованих регламентів та норм застосування препарат безпечний для нецільових об'єктів. Відповідно до даних еко-токсикологічної частини реєстраційного досяє для препарату: клас небезпечності для бджіл - надзвичайно небезпечний. Клас небезпечності для риб - мало небезпечний. Клас небезпечності для дафній - мало небезпечний. Клас небезпечності для водоростей - помірно небезпечний. Клас небезпечності для птахів - мало небезпечний. Клас токсичності для ґрунтових черв'яків - середньотоксичний. За умови використання препарату у рекомендованих нормах витрати негативна дія на ґрунтові мікроорганізми не передбачається.

12. Умови та заходи безпеки під час роботи, транспортування і зберігання:

Роботу з препаратом (змішування, завантаження, застосування, тощо) проводити з використанням засобів індивідуального захисту: респіратори, захисний одяг (довгі рукава, довгі штани, міцне взуття), хімічно стійкі рукавички, захисні окуляри.

Мінімізувати ймовірність зносу на сусідні культури, на людей, що задіяні в обприскуванні, та сторонніх спостерігачів.

Після роботи з препаратом вимити з милом руки та обличчя.

Не палити, не пити та не вживати їжу під час роботи з препаратом.

Не допускати дітей до місця зберігання препарату.

Слід уникати потрапляння препарату в легені, на шкіру та в очі працівників.

Не готувати робочу рідину поблизу джерел питної води.

Не перевищуйте норму витрати, вказану на етикетці та уникайте зносу препарату на сусідні ділянки.



Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства.

Запобігання виникненню резистентності: будь-яка популяція шкідників може мати особини, які мають природню стійкість до цього інсектициду. Якщо цей продукт використовувати багато разів підряд на одному і тому ж полі, кількість резистентних особин може значно збільшитися. Щоб затримати розвиток резистентності дотримуватися наступних рекомендацій:

- уникати повторного використання цього інсектициду або інсектицидів з цієї самої хімічної групи (неонікотиніди, група 4A IRAC);
- використовувати бакові суміші або чергувати обробки інсектицидами з інших хімічних груп;
- дотримуватися рекомендованих норм витрати;
- інтегрувати нехімічні методи (агротехнічні, біологічні) в програми боротьби з шкідниками. Де це можливо, слід використовувати декілька стратегій контролю шкідників.

Для отримання додаткової інформації про запобігання виникненню резистентності звернутися до місцевого представника компанії Байер, що вказаний на етикетці.

Group	4A	Insecticide
-------	----	-------------

13. Вимоги щодо зберігання, перевезення: всі роботи, пов'язані зі зберіганням і перевезенням препарату Конфідор® 200 SL, РК організовують і проводять у суворій відповідності з Державними санітарними правилами «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98, а також слід керуватися вимогами розробленої Державним підприємством «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя» «Інструкції з безпечного застосування інсектициду Конфідор® 200 SL, РК».

Не транспортувати та не зберігати препарат разом із продуктами харчування, ліками та миючими засобами.

Забороняється зберігати спецодяг та засоби індивідуального захисту, які були використані під час проведення робіт з препаратом, у житлових та призначених для відпочинку приміщеннях.

Зберігати в закритій заводській упаковці у сухому, темному, прохолодному складському приміщенні, що призначене для зберігання пестицидів та обладнане вентиляцією. Допустима температура зберігання – від 0 °C до +30 °C.

14. Заходи з надання домедичної допомоги у разі отруєння: загальні рекомендації: вивести постраждалого із зони забруднення. Негайно зняти забруднений одяг та безпечно його знешкодити.

У випадку вдихання: перемістити постраждалого на свіже повітря. Тримати його у теплі і в спокої. Негайно звернутись до лікаря.

У випадку потрапляння на шкіру: промити великою кількістю води з милом, якщо є в наявності, поліетиленгліколем 400, а потім водою.

У випадку потрапляння в очі: ретельно промити очі великою кількістю води, також під повіками, принаймні протягом 15 хвилин. Зняти контактні лінзи, за їх наявності, після перших 5 хвилин промивання, потім продовжувати промивати очі. Якщо симптоми подразнення зберігаються, звернутися до лікаря.

Надходження в шлунок (ковтання): промити ротову порожнину, тримати у спокої, НЕ викликати блювоту. Негайно звернутись до лікаря.

Лікування: лікувати симптоматично. У випадку надходження в шлунок значної кількості препарату, промивання шлунку доцільне тільки протягом перших 2 годин. Проте

застосування активованого вугілля та сульфату натрію завжди є доцільним. Немає специфічного антидоту.

Якщо потрібна медична консультація, необхідно взяти з собою упаковку або етикетку.

15. Способи і засоби знешкодження невикористаних пестицидів і агрохімікатів, а також знищення тари: при роботі з препаратом та тарою з-під нього дотримуватись вимог Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», ДСП 8.8.1.2.001-98.

Забороняється повторне використання тари.

Забороняється зливати залишки препарату в каналізацію.

Після застосування тара з-під пестициду повинна бути приведена в непридатність. Використані контейнери з-під пестициду повинні бути тричі промиті водою з внутрішньої та зовнішньої сторони, зруйновані (пробиті) і передані для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передбачено право такого суб'єкта господарювання на утилізацію використаної тари з-під пестицидів.

Для знезараження тари, обладнання і спецодягу забороняється використовувати лужні матеріали, відкрите полум'я, високі температури у зв'язку з тим, що вони можуть призвести до утворення небезпечних сполук.

16. Заходи щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків при застосуванні пестициду:

Не допускати потрапляння у водойми залишків препарату, робочого розчину або тари.

У разі розливу препарату зібрати його адсорбентом (пісок, тирса), забруднені шари ґрунту видалити, запакувати в упаковку, яка не допускає його висипання, та передати для подальшого знешкодження суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

У разі інциденту звернутись на Глобальну гарячу лінію за номером телефону (цілодобово): +1 (760) 476-3964 (Компанія 3Е для Bayer AG, підрозділ Crop Science).

У разі пожежі та/або вибуху не вдихайте пари. У разі пожежі одягнути автономний дихальний апарат. Використовувати наступні засоби пожежогасіння: розпилення води, CO₂, піну, пісок.

17. До відома споживача: для уникнення ризиків для людини та довкілля належить дотримуватись інструкції щодо використання.

Виробник та постачальник препарату не несе відповідальності за збитки, отримані внаслідок невідповідного до тарної етикетки використання та зберігання препарату.

З питань, пов'язаних зі зберіганням чи використанням препарату, звертатись до заявника чи представника в Україні за адресами, зазначеними на етикетці.

® – Зареєстрований знак компанії Байер АГ

Смуга чорного кольору (інсектицид)