



**decis**  
trap

**Μύγα Μεσογείου**  
*Ceratitis capitata*

**20 Παγίδες**

Αρ. Άδειας Διάθεσης  
στην αγορά Υ.Α.Α.Τ.:  
14478/16-04-2014

**ΝΤΕΣΙΣ ΤΡΑΠ**

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Ετοιμόχρηστη παγίδα προσελκυσής & θανάτωσης (attract & kill) για την καταπολέμηση της Μύγας της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*) σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπελι και τροπικά φρούτα με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης. Η παγίδα στηρίζεται στην έλξη στο περιβάλλον θλυκτικών τροφής και στόχος είναι το έντομο να έρθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια της παγίδας, η οποία είναι εμποτισμένη με πυρεθροειδές εντομοκτόνο (deltamethrin).  
**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Η παγίδα αναρτάται απευθείας στο δένδρο.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΤΥΠΟΣ- ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Δ.Ο.- ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΓΙΔΩΝ/ ΣΤΡΕΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

• **Εστεραιοειδή** (Πορτοκάλι, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρουτ, Μοσχολέιμο (Λάιμ)), **Μηλοειδή** (Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδί τύπου "Nashi", Κυδωνιά, Μουσουλιά), **Πυρηνόκαρπα** (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά, Βερκοκιά): Μύγα Μεσογείου (*Ceratitis capitata*, *Ceratitis spp.*).  
**Τύπος:** Ετοιμόχρηστη παγίδα. **Περιεκτικότητα σε δ.ο:** 0,015 γρ. deltamethrin/παγίδα + 8,33 γρ. προσελκυστικών/παγίδα. **Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής:** Εφαρμογή των παγίδων από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών μέχρι τη συγκομιδή. Τοποθετείτε τις παγίδες όταν 1 ενήλικο/παγίδα/ημέρα εμφανιστεί στις παγίδες παρακολούθησης ή 30-40 ημέρες πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH: 81) ή 50 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Διάρκεια προστασίας: 120 ημέρες. **Αριθμός παγίδων/στρέμμα:** 5-8.

• **Αμπελι** (επιτραπέζιο, οπωσιποίηση): Μύγα Μεσογείου (*Ceratitis capitata*, *Ceratitis spp.*). **Τύπος:** Ετοιμόχρηστη παγίδα. **Περιεκτικότητα σε δ.ο:** 0,015 γρ. deltamethrin/παγίδα + 8,33 γρ. προσελκυστικών/παγίδα. **Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής:** Εφαρμογή των παγίδων από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών μέχρι τη συγκομιδή. Τοποθετείτε τις παγίδες όταν 1 ενήλικο/παγίδα/ημέρα εμφανιστεί στις παγίδες παρακολούθησης ή 30-40 ημέρες πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH: 81) ή 50 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Διάρκεια προστασίας: 120 ημέρες. **Αριθμός παγίδων/στρέμμα:** 5-8.

• **Τροπικά φρούτα** (Μάνγκο, Λωτός, Συκιά, Κοιμ Κουάτι, Ακτινιδιά, Star

Fruit (*Averrhoa carambola*): Μύγα Μεσογείου (*Ceratitis capitata*, *Ceratitis spp.*). **Τύπος:** Ετοιμόχρηστη παγίδα. **Περιεκτικότητα σε δ.ο:** 0,015 γρ. deltamethrin/παγίδα + 8,33 γρ. προσελκυστικών/παγίδα. **Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής:** Εφαρμογή των παγίδων από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών μέχρι τη συγκομιδή. Τοποθετείτε τις παγίδες όταν 1 ενήλικο/παγίδα/ημέρα εμφανιστεί στις παγίδες παρακολούθησης ή 30-40 ημέρες πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH: 81) ή 50 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Διάρκεια προστασίας: 120 ημέρες. **Αριθμός παγίδων/στρέμμα:** 5-8.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

**ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:** Όλες οι καλλιέργειες: 1.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**

Όλες οι καλλιέργειες: Μη εφαρμοσίμο.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

**Διάρκεια προστασίας:** 120 ημέρες.  
**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**

Το κενό συσκευασίας αφού καταστράφουν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:**

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστά, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, χωρίς να εκτίθεται απευθείας στο φως.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:** Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:**  
Βλέπε συσκευασία.

Εγγυημένη σύνθεση: deltamethrin 0,015 γρ./παγίδα  
Βοηθητικές προσελκυστικές ουσίες: 8,33 γρ./παγίδα

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Εντομοκτόνο**

**Εντομοκτόνο - Ετοιμόχρηστη παγίδα** προσελκυσής & θανάτωσης (attract & kill) για την καταπολέμηση της Μύγας της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*).



**ΚΑΤΑΜΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**  
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 834/07 ΚΑΙ 889/08

YNM2-H05J-W00N-WJ7R  
**GROUP 3A INSECTICIDE**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΜΕΝΟ.**  
**ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αηγιολόου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000, www.cropscience.bayer.gr

**ΔΙΑΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**

• **Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.** • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**ΔΙΑΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

• Μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μην ρουτίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

**Γενικά:** Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν). Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε στον καθαρό αέρα. Αν διαρκούν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφιβολία, συμβουλευθείτε ένα γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως με μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και

άφθονο νερό. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Κρατήστε σε ηρεμία. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

**Πληροφορίες για το γιατρό:**

Κίνδυνοι: Αυτό το προϊόν περιέχει ένα πυρεθροειδές. Η δηλητηρίαση από πυρεθροειδή δεν πρέπει να συγχέεται με αυτή από καρβαμικά ή οργανοφωσφορικά.

**Θεραπεία: Επιτόπιος χειρισμός:** Συστήνεται κατάλληλη υποστηρικτική και συμπτωματική θεραπεία όπως αυτή ενδείκνυται από την κατάσταση του ασθενή. Έλεγχος των αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών. Σε περίπτωση στασιμών, η χορήγηση βενζοδιαζεπών (diazepam) είναι η θεραπεία επιλογής.

**Αντένδειξη:** παράγωγα αδρεναλίνης. **Αντένδειξη:** ατροπίνη. Δεν υπάρχει αντίδοτο.

Η ανάρρωση είναι αυτόματη και χωρίς επακόλουθα.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.



Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer 24/7  
από σταθερό: **800 1135 353**  
από κινητό: **210 6166 332**

GR81692416D



5 200309 898505 >

**Bayer**

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ,  
Αηγιολόου 6-8, 151 23 Μαρούσι,  
Τηλ.: 210 6166000,  
www.cropscience.bayer.gr

Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί επίσημη/πρωτότυπη ετικέτα και παρατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.