



decis

evo

1Le

Γαλακτωματοποιήσιμο λάδι σε νερό (EW)

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
Δραστική ουσία: deltamethrin 2,5% (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 97,54% (β/β)

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο
επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση
μυζητικών και μασητικών εντόμων.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι,
Τηλ: 210 6166000, www.cropscience.bayer.gr

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά
(ΥΑΑΤ): 14746 / 13-5-2020

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GROUP 3A INSECTICIDE

UFI: 6M90-V02G-X00F-W4AM

GR89008514C

Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί
επίσημη/πρωτότυπη ετικέτα και παρατίθεται
μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ενημερωμένη
ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε
πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.

BAYwin

ΝΤΕΣΙΣ ΕΒΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασσητικών εντόμων. Το deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ/ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέσως μετά τον ψεκασμό καθαρίστε ενδελεχώς τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκασμού, την αντλία και τα ακροφύσια 3 φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν ο αφρός και τα ίχνη του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ– ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ– ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ

Ο.Ψ.Υ.: Όγκος ψεκ. υγρού **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: • **Μηλιά, Αχλαδιά: Αφίδες** (*Aphis pomi*). Εφαρμογή πριν την άνθηση. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Ο.Ψ.Υ.:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 14. **Ψύλλα αχλαδιάς** (*Psylla pyri*). Εφαρμογή με την πτώση των φύλλων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Ο.Ψ.Υ.:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 14. **Λεπιδόπτερα:** **Καρπόκαφα** (*Cydia pomonella*), **Φυλλοδέτεες** (*Archips rosanus*), **Δίπτερα:** **Μύγα της Μεσογείου** (*Ceratitis capitata*), **Βρωμούσα** (*Halymorpha halys*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Ο.Ψ.Υ.:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 14.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: • **Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά: Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Hyalopterus amygdali*), **Θρίπες** (*Thrips tabaci*). Εφαρμογή πριν την άνθηση. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Ο.Ψ.Υ.:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 14.

Λεπιδόπτερα: **Βλαστορύκτης ροδακινιάς** (*Grapholitha molesta* syn. *Cydia molesta*), **Ανάρσια**

(*Anarsia lineatella*), **Δίπτερα:** **Μύγα της Μεσογείου** (*Ceratitis capitata*), **Ραγολέτιδα** (*Rhagoletis cerasi*), **Δροσόφιλα** (μόνο για κερασιά) (*Drosophila suzukii*), **Βρωμούσα** (*Halymorpha halys*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Ο.Ψ.Υ.:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 14.

• **ΑΜΠΕΛΙ'** (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα): **Λεπιδόπτερα:** **Ευδεμίδα** (*Lobesia botrana*), **Κοχλίδα** (*Clydia ambiguella*), **Τζιτζικιά** (*Empoasca flavescens*, *Scaphoideus titanus*, *Metcalfa pruinosa*), **Philaenus spumarius** (φορέας του *Xylella fastidiosa*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-60 κ. εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (25-70 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Ο.Ψ.Υ.:** 80-115 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 14.

ΕΣΠΕΡΙΔΕΙΔΗ: • **Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-Φρουτ, Νεραντζιά: Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. spiraecola*, *Toxoptera aurantii*), **Μύγα της Μεσογείου** (*Ceratitis capitata*), **Λεκάνιο** (*Saissetia oleae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 35-40 κ. εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (40-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Ο.Ψ.Υ.:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε.:** 1.

• **Μαντανιριά: Χρήσεις ήσσονος σημασίας:** **Κοκκοειδή*** *Delotococcus aberiae*, **Ψύλλα των εσπεριδοειδών*** (*Trioza erythraea*), **Αλευρώδης*** (*Parabemisia myricae*, *Aleurocanthus spiniferus*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30 κ. εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Ο.Ψ.Υ.:** 100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε.:** 1.

• **Λεμονιά*: Χρήση ήσσονος σημασίας:** **Αλευρώδης** (*Aleurothrixus floccosus*, *Dialeurodes citri*, *Aleurocanthus spiniferus*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30 κ. εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Ο.Ψ.Υ.:** 100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε.:** 1.

• **ΚΑΡΥΔΙΑ, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΦΙΣΤΙΚΙΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ: Λεπιδόπτερα:** **Καρπόκαφα** (*Cydia pomonella*), **Καρπόκαφα Καστανιάς** (*Cydia splendana*), **Σκαθάρι φουντουκιάς** (μόνο για φουντουκιά) (*Gonocerus acuteangulatus*), **Βρωμούσα** (μόνο για φουντουκιά) (*Halymorpha halys*), **Philaenus spumarius** (μόνο για αμυγδαλιά, φορέας του *Xylella fastidiosa*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 35-40 κ. εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (40-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Ο.Ψ.Υ.:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 14.

• **ΕΛΙΑ: Δάκος** (*Bactrocera oleae*). Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. **Δόση:** 40-50 κ. εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (40-70 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Ο.Ψ.Υ.:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 14. **Πυρηνωτήτης** (*Prays oleae*). Στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) και αμέσως μετά την καρποδότηση (καρπόβια γενεά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες. **Δόση:** 40-50 κ. εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (40-70 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Ο.Ψ.Υ.:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 14. **Λεκάνιο** (*Saissetia oleae*), **Philaenus spumarius** (φορέας του *Xylella fastidiosa*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 40-50 κ. εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (40-70 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Ο.Ψ.Υ.:** 100-140 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 14.

• **ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ, ΣΙΚΑΛΗ, ΒΡΩΜΗ: Αφίδες** (*Macrosiphum avenae*, *Rhopalosiphum maydis*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 40-60 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε.:** 1.

• **ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ²: Αφίδες:** (*Rhopalosiphum maydis*), **Λεπιδόπτερα:** Πυραλίδα (*Ostrinia nubilalis*), Αργότιδες ή Καραφατμέ (*Agrotis segetum*, *A. ypsilon*), Σεζάμια (*Sesamia nonagrioides*), **Χρήση ήσσονος σημασίας:** *Spodoptera frugiperda*^{*}, **Διαβρώτικα** (*Diabrotica virgifera*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 50-100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 14.

• **ΓΛΥΚΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ, ΣΟΡΓΟ: Αφίδες:** (*Rhopalosiphum maydis*), **Λεπιδόπτερα:** Πυραλίδα (*Ostrinia nubilalis*), Αργότιδες ή Καραφατμέ (*Agrotis segetum*, *A. ypsilon*), **Σεζάμια** (*Sesamia nonagrioides*), **Διαβρώτικα** (*Diabrotica virgifera*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 50-100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 14.

• **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΤΕΥΤΛΑ:** Μαύρη αφίδα (*Aphis fabae*), **Λεπιδόπτερα:** Αργότιδες ή Καραφατμέ (*Agrotis segetum*, *A. ypsilon*), **Κολεόπτερα:** Άλτης (*Chaetocnema tibialis*), **Κασσιίδα** (*Cassida vittata*), **Μύγα των τεύτλων** (*Pegomya betae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 40-60 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε.:** 1.

• **ΚΑΠΝΟΣ: Αφίδες** (*Myzus persicae*, *M. nicotianae*), **Θρίπας** (*Thrips tabaci*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 50-100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-2/ 7.

ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Υ): • Τομάτα (Υ), Πιπεριά (Υ), Μελιτζάνα (Υ): **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*), **Λεπιδόπτερα:** Πράσινο σκουλήκι (*Heliothis armigera*), **Σποντόπτερα** (*Spodoptera littoralis*, *S. exigua*), **Χρήση ήσσονος σημασίας:** *Spodoptera frugiperda*^{*}, **Δορυφόρος** (*Leptinotarsa decemlineata*), **Θρίπας** (*Thrips tabaci*), **Βρωμούσα** (*Nezara viridula*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 50-100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 14.

ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ): • Τομάτα (Θ): **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*), **Αλευρώδεις** (*Trialeurodes vaporariorum*), **Λεπιδόπτερα:** Πράσινο σκουλήκι (*Heliothis armigera*), **Σποντόπτερα** (*Spodoptera littoralis*, *S. exigua*), **Δορυφόρος** (*Leptinotarsa decemlineata*), **Θρίπας** (*Thrips tabaci*), **Βρωμούσα** (*Nezara viridula*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 100-150 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 14.

ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ): • Πιπεριά (Θ), Μελιτζάνα (Θ): **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*), **Αλευρώδεις** (*Trialeurodes vaporariorum*), **Λεπιδόπτερα:** Πράσινο σκουλήκι (*Heliothis armigera*), **Σποντόπτερα** (*Spodoptera littoralis*, *S. exigua*), **Δορυφόρος** (*Leptinotarsa decemlineata*), **Θρίπας** (*Thrips tabaci*), **Βρωμούσα** (*Nezara viridula*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 50-70 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 100-150 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-4/ 7.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Υ): • Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα: **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*), **Θρίπας** (*Thrips tabaci*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 50-100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 14.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ): • Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*), **Θρίπας** (*Thrips tabaci*), **Αλευρώδεις** (*Trialeurodes vaporariorum*), **Χρήση ήσσονος σημασίας:** *Spodoptera frugiperda*^{*}. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 50-70 κ.

εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 100-150 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-4/ 7.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ): • Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*), **Θρίπας** (*Thrips tabaci*), **Χρήση ήσσονος σημασίας:** *Spodoptera frugiperda*^{*}. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 50-70 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 80-100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 7.

• **ΠΑΤΑΤΑ: Δορυφόρος** (*Leptinotarsa decemlineata*), **Θρίπας** (*Thrips tabaci*). **Χρήση ήσσονος σημασίας:** *Spodoptera frugiperda*^{*}. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 60-100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 14. **ΨΥΧΑΝΘΗ (Υ):** • Φασόλια με ή χωρίς λοβό, Μπιζέλια με λοβό ή χωρίς λοβό (Αρακάς), **Κουκιά: Αφίδες** (*Aphis fabae*, *Acyrtosiphon pisum*), **Σιτόνα ή Ρυγχωτός κάνθαρος μπιζελιών** (*Sitona lineatus*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 60-100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-2/ 14.

• **Μαρούλι (Υ), Μαρούλι κατσαρό (Υ): Αφίδες** (*Nasonovia ribis-nigri*), **Λεπιδόπτερα:** Σποντόπτερα (*Spodoptera littoralis*, *S. exigua*), **Μαμέστρα** (*Mamestra brassicae*), **Χρήση ήσσονος σημασίας:** *Spodoptera frugiperda*^{*}. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 50-100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-2/ 7.

• **Μαρούλι (Θ), Μαρούλι κατσαρό (Θ): Αφίδες** (*Nasonovia ribis-nigri*), **Λεπιδόπτερα:** Σποντόπτερα (*Spodoptera littoralis*, *S. exigua*), **Μαμέστρα** (*Mamestra brassicae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 80-100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 7.

ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ+Θ): • Ρόκα, Λυκοτρίβολο: **Αφίδες** (*Nasonovia ribis-nigri*), **Λεπιδόπτερα:** Σποντόπτερα (*Spodoptera littoralis*, *S. exigua*), **Μαμέστρα** (*Mamestra brassicae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 50-100 λίτρα/ στρέμμα (Υ), 80-100 λίτρα/ στρέμμα (Θ). **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 7.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Υ): • Βασιλικός, Δενδρολίβανο, Θυμάρι, Μαϊντανός, Σάλβια: **Αφίδες** (*Nasonovia ribis-nigri*), **Λεπιδόπτερα:** Σποντόπτερα (*Spodoptera littoralis*, *S. exigua*), **Μαμέστρα** (*Mamestra brassicae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 50-100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε.:** 1. **ΚΡΑΜΒΟΕΙΔΗ (Υ):** • Κουνουπίδι, Μπρόκολο: **Αφίδες** (*Brevicoryne brassicae*), **Λεπιδόπτερα:** Μαμέστρα (*Mamestra brassicae*), **Πιριδείς** (*Pteris rapae*, *P. brassicae*), **Πιλουτέλλα** (*Cerostoma xylostella* (= *Plutella maculipennis*)), **Θρίπες** (*Thrips tabaci*, *T. major*, *T. meridionalis*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 60-100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-2/ 7.

ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: • Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Ασκαλώνιο, Κρεμμύδι φρέσκο: **Θρίπας** (*Thrips tabaci*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 60-100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 14.

• **ΣΠΑΡΑΓΓΙ: Θρίπας** (*Thrips tabaci*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 60-100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-2/ 14.

• **ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ), ΦΡΑΟΥΛΑ (Θ): Αφίδες** (*Aphis gossypii*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** (Υ): 60-100 λίτρα/ στρέμμα. (Θ): 80-100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 14.

• **ΜΗΔΙΚΗ, ΤΡΙΦΥΛΛΙ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ: Κολεόπτερα:** Άπιον του μπιζελιού (*Apion pisi*), Φυτονόμος μηδικής (*Hypera variabilis*), *Philaenus spumarius* (φορέας του

Xylella fastidiosa). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 25 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 40-60 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-2/ 14.

• **ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ: Κολεόπτερα: Σκαθάρι γύρης (*Meligethes aeneus*), Πιερίδες (*Pieris rapae*, *P. brassicae*).** Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 60-100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-4/ 14.

• **ΒΑΜΒΑΚΙ: Αφίδες (*Aphis gossypii*), Αλευρώδης (*Bemisia tabaci*), Θρίπας (*Thrips tabaci*).** Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 50-70 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 60-100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-2/ 14.

• **ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ (Υ+Θ), ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Υ+Θ), ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ (Υ+Θ): Αφίδες (*Aphis gossypii*), Λεπιδόπτερα: Μαμέστρα (*Mamestra brassicae*), Θρίπας (*Thrips tabaci*), Αλευρώδης (*Trialeurodes vaporariorum*), *Philaenus spumarius* (φορέας του *Xylella fastidiosa*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** (Υ): 35-50 κ. εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα), (Θ): 30 κ. εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Ο.Ψ.Υ.:** (Υ): 80-100 λίτρα/ στρέμμα, (Θ): 100-150 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/ 7.**

• **ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΦΥΤΩΡΙΑ ΛΕΥΚΑΣ: *Philaenus spumarius* (φορέας του *Xylella fastidiosa*). α)** Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 50-75 κ. εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Ο.Ψ.Υ.:** 40-100 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε.:** 1. **β)** Εφαρμογή στον κορμό. **Δόση:** 80 κ. εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (40 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα). **Ο.Ψ.Υ.:** 50 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε.:** 1.

• **ΧΛΟΟΤΗΠΤΕΣ: Κολεόπτερα: Άπιον του μητζελίου (*Apion pisi*), Φυτονόμος μηδικής (*Hypera variabilis*).** Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. **Δόση:** 30-50 κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Ο.Ψ.Υ.:** 40-60 λίτρα/ στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-2/ 7.

Παρατηρήσεις:

1. Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
2. Η εφαρμογή του DECIS EVO στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* spp. και *Sesamia* spp.

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στις καλλιέργειες μανταρινιάς και λεμονιάς και κατά του *Spodoptera frugiperda* στις καλλιέργειες αραβόσπου, τομάτας (Υ), πιπεριάς (Υ), μελιτζάνας (Υ), αγγουριού (Θ), αγγουράκι (Θ), κολοκυθίου (Θ), πεπονιού (Θ), καρπουζιού (Θ), κολοκύθας (Θ), πατάτας, μαρουλιού (Υ) και κατσαρού μαρουλιού (Υ). Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Ελαιοκράμβη: 45 ημέρες.

Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-Φρουτ, Νερατζιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Καστανιά, Αραβόσπιτος, Σόργο, Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη, Ζαχαρότευτλα, Κτηνοτροφικά τεύτλα, Βαμβάκι: 30 ημέρες.

Μηδική, Τριφύλλι, Κτηνοτροφικά αρωστώδη, Μαρούλι (Θ), Μαρούλι κατσαρό (Θ), Ρόκα (Θ), Λυκοτριβόλο (Θ): 14 ημέρες.

Μηλιά, Αχλαδιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Αμπέλι (Επιτρ, Οιονη), Ελιά (Ελαιοπ, Επιτρ), Πατάτα, Μαρούλι (Υ), Μαρούλι κατσαρό (Υ), Κουνουπίδι (Υ), Μπρόκολο (Υ), Βασιλικός (Υ), Δενδρολίβανο (Υ), Θυμαρί (Υ), Μαϊντανός (Υ), Σάλβια (Υ), Φασόλια με ή χωρίς λοβό (Υ), Μπιζέλια με ή χωρίς λοβό (Υ), Κουκιά (Υ), Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Ασκαλώνιο, Κρεμμύδι φρέσκο: 7 ημέρες.

Βερικοκιά, Ροδακινιά, Φράουλα (Υ+Θ), Γλυκός Αραβόσπιτος, Τομάτα (Υ+Θ), Πιπεριά (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), Αγγουράκι (Υ+Θ), Κολοκύθι (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ+Θ), Καρπούζι (Υ+Θ), Κολοκύθα (Υ+Θ), Ρόκα (Υ), Λυκοτριβόλο (Υ): 3 ημέρες.

Σπαράγγι, Καπνός, Ανθοκομικά φυτά (Υ+Θ), Καλλωπιστικά φυτά (Υ+Θ), Φυτώρια Δένδρων (Υ+Θ), Φυτώρια κωνοφόρων δένδρων, Φυτώρια λεύκας, Χλοοτάπητες: --

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία deltamethrin, η οποία ανήκει στην **ομάδα 3**, κατά IRAC.

Να εφαρμόζονται τα παρακάτω:

- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με DECIS. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκάστικό υγρό.
- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.
- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.
- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:


-ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκάστικό υγρό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλ. συσκευασία

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. • Λάβετε μέτρα για την αποτροπή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ εκνεφώματα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ το πρόσωπο. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Φοράτε προστατευτική ενδυμασία (μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο και μπότες και γάντι) κατά την φόρτωση και ανάμιξη. • Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή. • Οι εργάτες να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

• Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μια απέκαστη ζώνη προστασίας ως ακολούθως:

- Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: 15 μ. ή 10 μ. με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μειωμένης διασποράς κατά 50% ή χρήση ακροφύσιων μειωμένης διασποράς κατά 90%.
- Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα: 30 μ. ή 20 μ. με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μειωμένης διασποράς κατά 50% ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μειωμένης διασποράς κατά 90%.
- Ελιά: 50 μ. ή 30 μ. με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μειωμένης διασποράς κατά 50% ή 10μ. με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μειωμένης διασποράς κατά 90%.
- Αμπέλι: 20 μ. ή 15 μ. με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μειωμένης διασποράς κατά 50% ή 5 μ. με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μειωμένης διασποράς κατά 90%.
- Λοιπές καλλιέργειες: 10 μ. ή 5 μ. με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μειωμένης διασποράς κατά 50% ή ακροφύσια μειωμένης διασποράς κατά 90%.

- Για να προστατέψετε αρθρώποδα μη στόχους, να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από μη γεωργική γη.
- Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας. Απομακρύνετε ή καλύψτε (εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης) τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί μία ημέρα μετά τη χρήση. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη.
- Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες σε απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων.
- Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετείτε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση.

• **Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.**

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό.**

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].**

Το ζεστό νερό μπορεί να αυξήσει την υποκειμενική σοβαρότητα του ερεθισμού/παραισθησίας. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη συστηματικής δηλητηρίασης. Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος, μπορεί να γίνει χρήση ελαίων ή λοσιόν που περιέχουν βιταμίνη Ε.

• **Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.**

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Το ζεστό νερό μπορεί να αυξήσει την υποκειμενική σοβαρότητα του ερεθισμού/παραισθησίας. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη συστηματικής δηλητηρίασης. Εφαρμόστε καταπραϋντικές οφθαλμικές σταγόνες, αν χρειάζεται αναισθητικές οφθαλμικές σταγόνες. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν ο ερεθισμός αναπτύσσεται και παραμένει.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και δώστε στον παθόντα να πιει νερό σε μικρές γουλιές. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Πληροφορίες για το γιατρό:

Θεραπεία: Αρχική θεραπεία συμπτωματική. Παρακολούθηση των αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών. Εάν καταποθεί σημαντική ποσότητα σκευάσματος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη γαστρική απόπλυση εντός των πρώτων 2 ωρών. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού Νατρίου. Κρατήστε την αναπνευστική οδό καθαρή. Οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή εάν χρειαστεί. Σε περίπτωση σπασμών, μια βενζοδιαζεπίνη (π. χ. διαζεπάμη) πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με τα πρότυπα σχήματα. Εάν δεν είναι αποτελεσματική, μπορεί να χρησιμοποιηθεί φαινοβαρβιτάλη. Αντενδείξεις: ατροπίνη και παράγωγα αδρεναλίνης. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Η αποκατάσταση είναι αυθόρμητη και χωρίς επακόλουθα.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777



Bayer


Bayer Ελλάς ABEE,
Αγρησιλάου 6-8,
151 23 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6166000,
www.cropscience.bayer.gr

Γραμμή **έκτακτης ανάγκης** Bayer

από σταθερό: **800 1135 353**

από κινητό: **210 6166 332**

24/7



GR89008514C