



decis[®] expert

250ml e

DECIS[®] EXPERT 100 EC

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγ. σύνθεση: Δραστική ουσία: deltamethrin 10% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 89,31% β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο

επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων.

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

GROUP 3A INSECTICIDE

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ABEE,
Αιγυλιάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Τηλ: 210 6166000, www.cropscience.bayer.gr

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ:
14345/17-2-2010

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



UFI: EP80-90G4-K000-NCWW

GR85359355D

Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί επίσημη/πρωτότυπη ετικέτα και παρατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.

ΝΤΕΣΙΣ ΕΞΠΕΡΤ 100 EC

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων. Το deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ):

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: • **Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ, Νερατζιά:** Αφίδες (*Myzus persicae*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **Λεκάνιο (*Saissetia oleae*), Μύγα της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*).** Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: • **Λεμονιά, Μανταρινιά:** Αφίδες (*Myzus persicae*). Ψεκασμός με

την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 7,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ: • **Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά:** Αφίδες (*Hyalopterus* spp.), Καρπόκαψα Καρυδιάς (*Laspeyresia romonella*), Καρπόκαψα Καστανιάς (*Laspeyresia splendana*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 7,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (10,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 140 λίτρα/στρ. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (10,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **Ευρύτομο (*Eurytoma plotnicovi*).** Με την έναρξη των πτήσεων των ακμαίων με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: • **Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά:** Καρπόκαψα (*Laspeyresia romonella*), Αφίδες (*Aphis pomi*, *Dysaphis plantaginea*), Ψύλλα μηλιάς (*Psylla mali*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5* κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/στρ. **Φυλλοδέτες (*Adoxophyes orana*, *Archips rosanus*).** Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 8,75 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (8,75-12,25 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/στρ. **Ψύλλα αχλαδιάς (*Psylla pyri*).** Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστή-

ματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: • **Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά:** Φυλλοδέτες (*Adoxophyes orana*, *Archips rosanus*), Ανάρσια (*Anarsia lineatella*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 8,75 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (8,75-12,25 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/ στρ. Ραγολέτιδα (*Rhagoletis cerasi*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 10-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (10-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/ στρ. Μύγα της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/ στρ. Αφίδες (*Myzus persicae*, *Myzus cerasi*, *Hyalopterus pruni*), Καρπόκαψα της δαμασκηνιάς (*Laspeyresia funebrana*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/στρ.

• **ΑΜΠΕΛΙ**:** Ευδεμίδα (*Lobesia botrana*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. (1η γενεά), 12,5-17,5 κ.εκ. (2η και 3η γενεά) σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. Κοχυλίδα (*Clysia ambiguella*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5-17,5

κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. Τζιτζικιάκια (*Emproasca spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ.

• **ΦΡΑΟΥΛΑ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):** Αφίδες (*Aphis spp.*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (6,25-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ.

• **ΕΛΙΑ:** Δάκος [*Bactrocera (Dacus) oleae*]. Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/στρ. Λεκάριο (*Saissetia oleae*). Με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/στρ. Βαμβακάδα (*Euphyllura spp.*). Με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/στρ. Πυρηνοτρήτης (*Prays oleae*). Στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) ή αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια γενεά) μεταξύ ωθοσεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες. **Δόση:** 7,5 κ.εκ. (ανθοβ. γενεά) σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. 12,5 κ.εκ. (καρποβ. γενεά) σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού.

(7,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-140 λίτρα/στρ.

• **Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο:** Θρίπας (*Thrips tabaci*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* sp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-50 λίτρα/στρ.

• **ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Τομάτα - Πιπεριά - Μελιτζάνα (Υπαίθρου):** Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera* spp.), Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Anuraphis cardui*, *Hyperomyzus lactucae*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ. Βρωμούσα (*Nezara viridula*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 7,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (4,5-7,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ. Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* sp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ.

• **Πιπεριά (Θερμοκηπίου):** Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera* spp.), Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Anuraphis cardui*, *Hyperomyzus lactucae*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-

140 λίτρα/στρ. Βρωμούσα (*Nezara viridula*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 7,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (4,5-10,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-140 λίτρα/στρ. Αλευρώδης (*Trialeurodes vaporariorum*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 17,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (10,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ.

• **ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Τομάτα, Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου):** Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera* spp.), Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Anuraphis cardui*, *Hyperomyzus lactucae*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα /στρ. Βρωμούσα (*Nezara viridula*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 7,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (4,5-10,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-140 λίτρα/στρ.

• **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: • Αγγούρι - Αγγουράκι - Κολοκύθι - Πεπόνι - Καρπούζι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):** Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera* spp.), Αφίδες (*Aphis* spp., *Hyperomyzus lactucae*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. (Υπαίθρου: 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ., Θερμοκηπίου: 7,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος**

ψεκαστικού υγρού: Υπαίθρου: 60-100 λίτρα/στρ., Θερμοκηπίου: 60-140 λίτρα/στρ.

• **Αγγούρι - Αγγουράκι - Κολοκύθι - Πεπόνι - Καρπούζι (Υπαίθρου):** Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* sp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ.

• **Κουνουπίδι, Μπρόκολο:** Πιερίδα (*Pieris* spp.), Μαμέστρα (*Mamestra brassicae*), Πλούζια (*Plusia gamma*), Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera littoralis*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Brevicoryne brassicae*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα /στρ. Πλουτέλλα (*Plutella xylostella*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα/στρ.

• **Μαρούλι (Υπαίθρου):** Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera exigua*), Άλτης (*Chrysodeixis chalcites*), Αφίδες (*Nasonovia ribis-nigri*, *Hyperomyzus lactucae*, *Aphis* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. (6,25-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ.

• **Μαϊντανός, Φύλλα σέλινου, Ρόκα:** Αφίδες (*Aphis* sp.), Σποντόπτερα (*Spodoptera exigua*), Μαμέστρα (*Mamestra* spp.), Άλτης (*Chrysodeixis chalcites*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (8,75 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 70 λίτρα/στρ. Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* sp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 70 λίτρα/στρ.

• **ΨΥΧΑΝΘΗ (όσπρια):** • **Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια:** Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis* spp.), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ.

• **Μπιζέλια Φρέσκα (αρακάς):** Αφίδα των μπιζελιών (*Acyrtosiphon pisum*), Σιτόνα (*Sitona* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 6,25 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. Αφίδα των κουκιών (*Aphis fabae*), Κάμπια των μπιζελιών (*Laspeyresia nigricana*), Θρίπας (*Thrips angusticeps*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ.

• **Πατάτα:** Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60 λίτρα/στρ. Σποντόπτερα (*Spodoptera littoralis*). Ψε-
κασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 7,5-
12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/στρ.

• **Βαμβάκι:** Ρόδινο σκουλήκι (*Pectinophora gossypiella*), Πράσινο σκουλήκι
(*Helicoverpa armigera*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστή-
ματα 14 ημερών. **Δόση:** 12,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού**
υγρού: 30-50 λίτρα/στρ. Αλευρώδης (*Bemisia tabaci*), Τζιτζικάκια (*Empoasca* spp.).

Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:**
12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα/στρ. Σπο-
ντόπτερα (*Spodoptera* spp.), Αφίδα (*Aphis gossypii*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.).
Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:**
7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-50 λίτρα/στρ.

• **Καπνός:** Θρίπας (*Thrips tabaci*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκασμός με την
εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευ-
άσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα /στρ.

• **Ζαχαρότευτλα, Παντζάρι:** Αφίδες (*Aphis fabae*, *Myzus persicae*), Μύγα των τεύτ-
λων (*Pegomya* spp.), Άλτης (*Chaetocnema tibialis*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.),
Σποντόπτερα (*Spodoptera* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:**
7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα/στρ. Κασσίδα
(*Cassida nebulosa*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ.
σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα/στρ.

• **Αραβόσιτος ***:** Πυραλίδα (*Ostrinia nubilalis*), Σεζάμια (*Sesamia nonagrioides*),
Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera* spp.), Αφί-
δες (*Rhopalosiphum padi*, *Sitobion avenae*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψε-
κασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14-21 ημερών.
Δόση: 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60 λίτρα/
στρ. (*Diabrotica virgifera*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδι-
αστήματα 7-14 ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού**
υγρού: 60 λίτρα/στρ.

• **ΣΙΤΗΡΑ:** • **Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη:** Αφίδες (*Rhopalosiphum padi*,
Sitobion avenae), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των
προσβολών. **Δόση:** 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:**
40-60 λίτρα/στρ.

• **Μηδική:** Αφίδα των μπιζελιών (*Acyrtosiphon pisum*), Σκαθάρι των μπιζελιών
(*Arion pisi*), Φυτονόμος (*Hypera postica*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβο-
λών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **Δόση:** 6,25 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος**
ψεκαστικού υγρού: 40 λίτρα/στρ.

• **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):** Αφίδες (*Myzus* spp.), Θρίπες
(*Thrips tabaci*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7
ημερών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (6,25-12,5
κ.εκ. σκευάσματος/στρ.) **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα /στρ. Αλευρώδης
(*Trialeurodes vaporariorum*). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδι-

αστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 17,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (12,25 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.) **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 70 λίτρα /στρ. Φυλλοδέτες (*Archips* spp., *Adoxophyes* spp., *Pandemis* spp.). Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. **Δόση:** 8,75 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (4,375-8,75 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.) **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα /στρ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλοειδή η δόση των 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/hl πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 lt/στρέμμα) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 12,5 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα.

** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

*** Η εφαρμογή του σκευάσματος στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* spp. και *Sesamia* spp.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

• Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περι-

ορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.

- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.
- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με DECIS. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

- **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:** (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρουτ, Νερατζιά), **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά), **Ελιά, Ζαχαρότευτλα, Παντζάρι, ΣΙΤΗΡΑ** (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη): 1.
- **ΑΚΡΟΔΡΥΑ:** (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά),

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά), Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Μαρούλι (Υπαίθρου), Μαϊντανός, Φύλλα σέλινου, Ρόκα, **ΨΥΧΑΝΘΗ** (όσπρια): Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια, Μπιζέλια Φρέσκα (αρακάς), Βαμβάκι, Μηδική: 2.

• Αμπέλι, Φράουλα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου), Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, **ΣΟΛΑΝΩΔΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ** (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα), **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ** Υπαίθρου και Θερμοκηπίου (Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι), Πατάτα, Καπνός, Αραβόσιτος, Καλλωπιστικά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): 3.

• **ΣΟΛΑΝΩΔΗ:** Θερμοκηπίου (Πιπεριά, Τομάτα, Μελιτζάνα): 4.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

• Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Παντζάρι, Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρουτ, Νερατζιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Αραβόσιτος, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη: 30 ημέρες.

• Φασόλια, Κουκιά: 28 ημέρες.

• Μηδική: 14 ημέρες.

• Αμπέλι (Επιτρ, Οينوπ), Ελιά (Ελαιοπ, Επιτρ), Πατάτα, Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Μαρούλι, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Καπνός, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βυssινιά, Φύλλα Σέλινου, Μαϊντανός, Φακή, Ρεβίθια, Μπιζέλια/Αρακάς: 7 ημέρες.

• Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Φράουλα, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Ρόκα: 3 ημέρες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος να γίνεται σε υψικαμίνους που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξέπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε συσκευασία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



UFI: EP80-90G4-K000-NCWW

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. • Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκίασιμο. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Διατηρείται/Φυλάσσεται μακριά από ενδύματα/καύσιμα υλικά. • Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη. • Μην αναπνέετε εκνεφώματα. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από σώματα επιφανειακών υδάτων για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και την καλλιέργεια της ελιάς, 20 μέτρων για την καλλιέργεια αμπελιού και 10 μέτρων για τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες στον αγρό. • Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τη μη γεωργική γη. • Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας. Απομακρύνετε ή καλύψτε (εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης) τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί μία ημέρα μετά τη χρήση. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Γενικά: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: Μεταφέρετε τον πάσχοντα σε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρήσουν, καλέστε γιατρό (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν βραχεί με το σκεύασμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.**

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.**

Για το γιατρό: Συμπτώματα: ακαμψία, υπνηλία, δυσκολία συντονισμού κινήσεων, σπασμοί, τοπική υπερευαισθησία. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση κατάποσης μεγάλης ποσότητας του σκευάσματος συστήνεται πλύση στομάχου και χορήγηση ενεργού άνθρακα και συγχρόνως προστασία των αναπνευστικών οργάνων.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer

από σταθερό: **800 1135 353**

από κινητό: **210 6166 332**

24/7



Bayer

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ,
Αγησιλάου 6-8,
151 23 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6166000,
www.cropscience.bayer.gr



GR85359355D