



Fungicida  
Grupo 7  
Grupo 3  
Grupo 11



Suspensión concentrada (SC)

Composición

Bixafen: N-(3',4'-dicloro-5-fluoro [1,1'-bifenil]-2-il)-3-(difluorometil)-1metil-1H-pirazol-4-carboxamida .....	12,5 g
Protiocanazole: 2-[2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2 hidroxipropil]-1,2-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona .....	17,5 g
Trifloxistrobin: (E) α-(metoxiimino)-2-[[[ ( E )-[1-3-(Trifluorometil) fenil] etiliden] amino]oxi]metil] bencén acetato de metilo .....	15 g
coadyuvantes c.s.p. ....	100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito ante el SENASA bajo el N° 39.181

Lote N°: Ver envase  
Elab.: Ver envase  
Vto.: Ver envase

Contenido Neto: **2x10L**  
Industria Argentina  
**No Inflamable**



BAYER S.A.  
Domicilio: Ricardo Gutiérrez 3652 B1605EHD, Munro,  
Bs.As. Argentina. Representante de Bayer AG, Alemania  
www.bayercropscience.com - Tel.: 011-4762-7000.



**Advertencia para el médico:**  
PRODUCTO CLASE III – PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO. MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORÍA III. Causa irritación moderada a los ojos. CATEGORÍA INHALATORIA III (CUIDADO). LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORÍA IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. SENSIBILIZANTE DERMAL. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

**Síntomas de intoxicación aguda:**

No se conocen síntomas específicos.

**Advertencias toxicológicas especiales:** no posee.

**Consultas en caso de intoxicaciones:**

**Ciudad de Buenos Aires:** Div. Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel.: (011) 5950-8804/06. Hospital Italiano de Bs. As.. Tel.: (011) 4959-0311/0313 / 0800-444-4400. Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez". Tel.: (011) 4962-6666. Hospital de Niños "Dr. Pedro de Elizalde". Tel.: (011) 4300-2115 / 4307-5842. Hospital Escuela "José de San Martín". (011) 4508-3931 / 5950-8000. **Prov. Buenos Aires:** Hospital Nac. "Prof. A. Posadas" (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int. 1102 / 0-800-333-0160. **La Plata:** Hospital Interzonal de Agudos Esp. en Pediatría "Sor María Ludovica". Tel.: (0221) 451-5555 / 453-5901 (int. 1312) / 0800-222-9911. **Pergamino:** Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259. **Rosario:** Hospital "J. M. Cullen". Tel.: (0342) 457-3357 int. 267/8. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. **Córdoba:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. **Mendoza:** Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. **Chaco:** Hospital "J.C. Perrando". Tel.: (03722) 42-5050/7233 / 44-2399. **Neuquén:** Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800 /44-90890.

**Compatibilidad toxicológica:** no se conocen

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

**Nota:** Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.



**ONU 3082**  
**SUSTANCIA**  
**LÍQUIDA PELIGROSA**  
**PARA EL MEDIO**  
**AMBIENTE, N.E.P.**  
**(BIXAFEN EN SOLUCIÓN)**