

Decis® Trap Droso



Účinná látka

deltamethrin 0,015 g/ks (IRAC 3A)

Jednorázová lapací past k ochraně před octomilkou japonskou (*Drosophila suzukii*) pro použití v peckovinách, révě vinné a bobulovitěm a drobném ovoci.

Působení přípravku

Decis® Trap Droso je jednorázová lapací past ve formě „ready to use“ (připravena k okamžitému použití) na ochranu proti octomilce japonské (*Drosophila suzukii*). Plastová past se skládá ze dvou částí: spodní (červené) části obsahující potravní atraktanty (Drosulab A a Drosulab E) a průhledného víčka, jehož vnitřní stěny jsou naimpregnovány účinnou látkou deltamethrin. Lapací pasti umístěné v porostu lákají pomocí potravních atraktantů dospělce (obě pohlaví) dovnitř pastí, kde hynou při kontaktu s účinnou látkou deltamethrin.

Doporučení pro použití

Po vybalení z obalu je past připravena k použití. Před umístěním pasti do porostu již dále s pastí nemanipulujte, neotvírejte ji ani neotvírejte sáčky s atraktanty. Atraktanty se uvolňují samovolně díky mikropórům v jejich obalech. Lapací pasti zavěste ručně na stromy/keře v množství

dle návodu k použití, rovnoměrně do porostu. Pasti se umísťují do porostu v závislosti na monitoringu náletu škůdce, většinou mezi odkvětem a dosažením konzumní zralosti plodů. Je nutno pasti umístit před naklazením vajíček na zralé plody, aby nedošlo k jejich následnému poškození. Při rozmístění pastí lze vzít v úvahu i směr hlavního náletu škůdce a z této strany pozemku zvýšit hustotu pastí. Toto lze využít v případě pěstování různých odrůd plodiny s odlišnou dobou dozrávání. Škůdce se ze sklizené odrůdy pohybuje směrem k další dozrávající odrůdě. Pasti umístěte tak, aby byly chráněny před přímým slunečním svitem a současně listy nepřekrývaly vletové otvory. V případě mechanizované sklizně odstraňte plastové pasti z porostu již před vlastní sklizní. U ruční sklizně odstraňte pasti z porostu na konci vegetační sezóny. K zajištění kontroly proti octomilce japonské během celé vegetační sezóny použijte Decis® Trap Droso jako součást komplexní insekticidní ochrany. Doba trvání ochrany (funkčnosti atraktantů) je minimálně 100 dnů.

Antirezistentní strategie

Vzhledem k typu a povaze pasti nevzniká možnost snížení citlivosti cílového škodlivého organismu k použité účinné látce.

Návod k použití

Plodina	Účel použití	Dávkování	Poznámka
Peckoviny, bobulovité a drobné ovoce, réva vinná, jahodník	octomilka japonská (<i>Drosophila suzukii</i>)	100 ks/ha	BBCH 71–89, před kladením vajíček
Bobulovité a drobné ovoce, réva vinná, jahodník	octomilka japonská (<i>Drosophila suzukii</i>)	100 ks/ha	BBCH 71–89 před kladením vajíček, fóliovníky
Jahodník, maliník	octomilka japonská (<i>Drosophila suzukii</i>)	100 ks/ha	BBCH 71–89, před kladením vajíček, skleníky