

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN.
Před použitím si přečtete příložený návod k použití.

Decis® Trap Droso

Jednorázová lapací past k ochraně před octomilkou japonskou (*Drosophila suzukii*) pro použití v peckovinách, révě vinné a bobulovitém a drobném ovoci.

PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

Název a množství účinné látky:	deltamethrin 0,015 g/ks
--------------------------------	-------------------------

 Nebezpečí	
H225 H319 H336 H410	Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261 P280 P303+P361 +P353 P305+P351 +P338 P337+P313 P391 P403+P235 P501	Zamezte vdechování par. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Uniklý produkt seberte. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním provozovateli zařízení oprávněného nakládat s nebezpečným odpadem.
EUH401 SP1	Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.
Držitel povolení:	Bayer S.A.S., 74 Rue Gorge de Loup, F-69009 Lyon, Francie
Právní zástupce/dodavatel/osoba odpovědná za konečné balení a označení:	BAYER s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3; Tel.: 266 101 111

® je registrovaná ochranná známka společnosti Bayer

Evidenční číslo:	6145-0
UFI:	RUM2-H0JC-H00N-77DV
2D-kód:	uvedeno na obalu
Číslo šarže:	uvedeno na obalu
Datum výroby formulace:	uvedeno na obalu
Doba použitelnosti:	6 měsíců od data výroby při správném způsobu skladování v originálních neporušených obalech (teplota skladování +5 až +30 °C)
Množství přípravku v obalu:	plastový lapač v PE/EVOH/PE sáčku

Způsob působení

Decis Trap Droso je jednorázová lapací past „připravená k okamžitému použití“ na ochranu proti octomilce japonské (*Drosophila suzukii*).

Plastová past se skládá ze dvou částí: spodní (červené) části obsahující atraktanty (Drosulab A a Drosulab E) a průhledného víčka, jehož vnitřní stěny jsou naimpregnovány účinnou látkou deltamethrin. Lapací pasti umístěné v porostu lákají dospělé, kteří hynou při kontaktu s účinnou látkou deltamethrin.

SKUPINA 3A INSEKTICID

Návod k použití

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	OL (dny)	Poznámka k 1) plodině 2) ŠO 3) OL 4) umístění
peckoviny, bobulovité a drobné ovoce, réva vinná, jahodník	octomilka japonská (<i>Drosophila suzukii</i>)	100 ks/ha	--	1) BBCH 71-89 2) před kladením vajíček 4) pole
bobulovité a drobné ovoce, réva vinná, jahodník	octomilka japonská (<i>Drosophila suzukii</i>)	100 ks/ha	--	1) BBCH 71-89 2) před kladením vajíček 4) fóliovníky
jahodník, maliník	octomilka japonská (<i>Drosophila suzukii</i>)	100 ks/ha	--	1) BBCH 71-89 2) před kladením vajíček 4) skleníky

ŠO-škodlivý organismus; OL (ochranná lhůta); (--) – OL není nutné stanovit

Plodina	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
peckoviny, bobulovité a drobné ovoce, réva vinná, jahodník, maliník	lapací past	1x za rok

Upřesnění použití

Lapací pasti zavěste ručně na stromy/keře, max. 1 lapací past/1 strom/keř, rovnoměrně do porostu dle monitoringu výskytu škůdce se zohledněním termínu sklizně. Pasti zavěste do porostu po odkvětu (v období před nakladením vajíček), od počátku vývoje plodů až do konzumní zralosti, kdy plody mají typickou chuť a pevnost, tj. BBCH 71-89. Doba trvání ochrany je 100 dnů. U okraje velkých pozemků může být hustota větší. Umístěte je tak, aby byly chráněny před slunečním svitem a současně listy nepřekrývaly vletové otvory.

Lapací pasti po vyndání z obalu jsou připravené k použití. Sáčky s atraktanty neotvírejte.

V případě mechanizované sklizně odstraňte plastové pasti z porostu již před vlastní sklizní.

U ruční sklizně odstraňte pasti z porostu na konci vegetační sezóny.

K zajištění kontroly proti octomilce japonské během celé vegetační sezóny použijte Decis Trap Droso jako součást komplexní insekticidní ochrany.

Antirezistentní strategie

K zabránění vzniku rezistence zvažte použití postřiku přípravky, které obsahují účinnou látku typu pyrethroidu (cypermethrin, deltamethrin, etofenprox, lambda-cyhalothrin a další).

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí

Nejsou vyžadovány

Další omezení

Zamezte styku přípravku s kůží a očima.

Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Po odložení OOPP se umyjte. Po skončení práce ochranný oděv a další OOPP vyperte/očistěte. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Ochrana dýchacích orgánů:	není nutná
Ochrana rukou:	vhodné ochranné rukavice s piktogramem ochrana proti pesticidům (ČSN ISO 18889) nebo ochrana proti chemikáliím (ČSN EN ISO 374-1)
Ochrana očí a obličeje:	ochranné brýle nebo ochranný štít (ČSN EN ISO 16321-1)
Ochrana těla:	ochranný/pracovní oděv (nezbytná podmínka – oděv musí mít dlouhé rukávy a nohavice)
Dodatečná ochrana hlavy:	není nutná
Dodatečná ochrana nohou:	pracovní/ochranná obuv (uzavřená, odolná proti průniku a absorpci vody - s ohledem na vykonávanou práci)
Společný údaj k OOPP:	Poškozené OOPP (např. protřžené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

Informace o první pomoci

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.	
Při nadýchání:	Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
Při zasažení kůže:	Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
Při zasažení očí:	Vyplachujte oči velkým množstvím, pokud možno vlažné čisté vody. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
Při náhodném požití:	Ústa vypláchněte vodou. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku (s informací, že se jedná o přípravek na bázi syntetického pyrethroidu) a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem - **Telefon nepřetržitě: (+420) 224 919 293 nebo (+420) 224 915 402 (www.tis-cz.cz)**.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách +5 až +30 °C odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před vlhkem, mrazem, ohněm, vysokou teplotou a přímým slunečním světlem. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku.

Likvidace obalů a zbytků

Použité lapací pasti se nesmějí používat k jinému účelu!

Použité lapací pasti se znehodnotí a zlikvidují se jako nebezpečný odpad předáním provozovateli zařízení oprávněného nakládat s nebezpečným odpadem. Poté se doporučuje spálení ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200-1400 °C ve druhém stupni a čištěním plyných zplodin. Případné nepoužité lapací pasti se zlikvidují stejným způsobem.

Dodatková informace společnosti Bayer:

**Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití.
Přípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v textu etikety anebo nejsou součástí písemných doporučení společnosti Bayer, platných pro aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin.
Společnost Bayer nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či skladováním přípravku.**