



GR91267947A

# Equip<sup>®</sup>

## 5Le

Α.Α.Δ.Α. Υ.Α.Α.Τ.:  
7734 / 16-08-2004

**Equip OD**

**Ελαιώδες εναιώρημα (OD)**

Εγγ. Σύσταση: Foramsulfuron 2,25% β/ο,

Isoxadifen-ethyl (safener) 2,25% β/ο

Βοηθ. ουσίες: 95,13% β/β

# Διασυστηματικό εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**



UFI: REF4-20DY-C00S-56ED

**GROUP 2 HERBICIDE**

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000, [www.cropscience.bayer.gr](http://www.cropscience.bayer.gr)

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.**

# BAYWIN



Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί επίσημη/πρωτότυπη επικέτα και παρατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ενημερωμένη επικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.

# Εκτίμ ΟD

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο δράση τους μέσω παρεμπόδισης του ενζύμου οξελαλακτική συνθέτωση (ALS), για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατυφύλλων ζιζανίων στον αραβόσπο. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανόιντα όσο και με τον κοπάντα χυμό. Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματά αμέσως μετά τον ψεκασμό, ενώ η πλήρης νέκρωση τους επέρχεται σε διάστημα 2-4 εβδομάδων.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Καθολικός ψεκασμός του φυλλώματος της καλλιέργειας και των ζιζανίων. Ο ψεκασμός γίνεται με ακροφύσια τύπου σκούφια και πίεση 2,5-3 atm.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με νερό. Ανακινήστε πολύ καλά τη φιάλη και προσθέστε το περιεχόμενο στο δοχείο του ψεκαστικού. Αδειάστε τελείως τη φιάλη και ξεπλύνετε τη καλά με νερό, το οποίο θα προσθέσετε στο δοχείο του ψεκαστικού. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Μην προετοιμάσετε περισσότερο ψεκαστικό υγρό απ' όση πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Μετά τη χρήση καθαρίστε προσεκτικά τον εξοπλισμό, έτσι ώστε να μην προκληθούν ζημιές σε άλλες καλλιέργειες.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** Αδειάστε τελείως τον εξοπλισμό, αποσυρμαλογήστε τα φίλτρα των ακροφυσίων και καθαρίστε με νερό. Γεμίστε το ψεκαστικό κατά το 10% της χωρητικότητάς του με νερό και βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Εφαρμόστε το νερό αυτό στην ψεκασμένη περιοχή. Επανάλαβετε τη διαδικασία ξεπλένοντας καλά. Ελέγξτε ξανά τα ακροφύσια και τα φίλτρα για τυχόν υπολείμματα και καθαρίστε τα καλά αν είναι απαραίτητα.

## ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Αραβόσποτος

## ΣΤΟΧΟΣ:

**Αγρωστώδη:** Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), σετάριες (*Setaria verticillata*, *Setaria viridis*), αιματόχορτο\* (*Digitaria sanguinalis*), κοινή πτόα (*Poa annua*).

**Πλατυφύλλα:** Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), πλαγιστό βλήτο (*Amaranthus biifidus*), αγριονιατόκι (*Solanum nigrum*), αγριοελιτζάνα\* (*Xanthium strumarium*), λουβουδιά\* (*Chenopodium album*), αγριοβαμβάκι\* (*Abutilon theophrasti*), αντράκλα (*Portulaca oleracea*), ττάτουλα (*Datura stramonium*), μικρή τοουκνίδα (*Urtica urens*).

## ΔΟΣΕΙΣ – ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

**Μια εφαρμογή:** Μεταφυτρωτικό ψεκασμός όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2-6 φύλλων. **Δόση:** 200-267 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30 λίτρα/ στρ.

**Δύο εφαρμογές:** Η πρώτη εφαρμογή να γίνει όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2-4 φύλλων και η δεύτερη δύο εβδομάδες αργότερα. **Δόση:** 130 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30 λίτρα/ στρ.

**Παρατηρήσεις:** Το ζιζάνιο θα πρέπει να βρίσκεται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης και ιδιαιτέρως τα σημειωμένα με \* να μην έχουν ξεπεράσει το στάδιο των 4 φύλλων.

**Συνδυαστικότητα:** Για καλύτερη καταπολέμηση μέτρια ευαίσθητων ή ανθεκτικών πλατυφύλλων ζιζανίων μπορεί να συνδυαστεί με το Butiril EC.

## ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΥΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

Σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί αραβόσποτος, αφού προηγηθεί άρσης.

Σποράς ή της φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί το φθινόπωρο να σπαρουν χειμερινά σπέρν (σπάρια, κριθάρι) και την επόμενη άνοιξη ζαχαρότευτλα, βαμβάκι, ηλιάνθος ή σόγια.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΣΗ:** Αραβόσποτος: - **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:** Να αποφευχθεί η εφαρμογή του σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση στρες από χαμηλές θερμοκρασίες (χαμηλότερες από 10oC) υπερβολική υγρασία ή έραση, ή άλλους λόγους καθώς επίσης και όταν αναμένονται θερμοκρασίες υψηλότερες από 25-30oC, σε συνδυασμό με έντονη ηλιόφania και έλλειψη επαρκούς εδαφικής υγρασίας. Η δράση του προϊόντος δεν θα επιηρεαστεί εάν ακολουθηθεί βροχόπτωση ή πότισμα με κατανοισμό, μετά την πάροδο 2 ωρών μετά τον ψεκασμό. Να αποφευχθεί ο ψεκασμός φυτών τα οποία είναι υγρά λόγω βροχής ή ατμοσφαιρικής υγρασίας.

Το προϊόν εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στο καλαμπόκι. Όλες οι άλλες καλλιέργειες είναι ευαίσθητες γι' αυτό να αποφευχθεί η διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες.

**Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων (γετονικές καλλιέργειες και υδάτινες επιφάνειες):**

- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αδέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων από υδάτινες επιφάνειες.
- Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού να μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα στις καλλιέργειες αγρού οι οποίες απέχουν λιγότερο από 5 μέτρα από γετονικές καλλιέργειες ή φυτά.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΠΡΕΪΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Η ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:**

Το EQUIP OD δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις περισσότερες από τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και υβρίδια.

Να μην ψεκάζονται σε καλλιέργεια στην οποία έχει γίνει εφαρμογή διασυστηματικού οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου.

Να μην εφαρμόζονται σε γλυκό καλαμπόκι ή καλαμπόκι σποροπαραγωγής. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΑΓΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Ποσότητες του σκευάσματος πρέπει να καιούνται σε εμπορικά αποστειρωτές. Άδειες συσκευασίας του σκευάσματος, πρέπει να πλένονται πολύ καλά με άφθονο νερό. Τα νερά του ξεπλύνματος συλλίσταται να προστέθονται στο ψεκαστικό υγρό. Κατόπιν τούτου οι άδειες συσκευασίες, απορρίπτονται είτε με κούση σε αποστειρωτή είτε ως οικιακά απόβλητα αφού προηγουμένως καταστεί αδύνατη η περαιτέρω χρήση τους ( π.χ. με τρίψιμο).

**ΣΥΝΗΘΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, στην αρχική του απαριθμεία συσκευασία μακριά από το άμεσο ηλιακό φως σε θερμοκρασίες δωματίου.

**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:** Βλέπε συσκευασία.

## ΚΙΝΔΥΝΟΣ



UFI: REF4-2DDY-C005-56ED

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  
• Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • Ύψοποτο για πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Περιέχει isoxadifen-ethyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Περιέχει Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene.

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εφοδιάστε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση. • Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Μη μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. • Για να προστατέψετε φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά.

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ήρεμο. Εάν τα συμπτώματα επιμεινούν ή σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν βραχεί. Πλυνθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα πολύ καλά με νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμεινούν ή σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα πολύ καλά με νερό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.  
Για το γιατρό: Δεν υπάρχουν γνωστά συμπτώματα. Αρχική θεραπεία συμπτωματική και υποστηρικτική. Εάν καταποθεί φροντίστε να προλάβετε πιθανή εισρόφιση του γαστρικού υγρού σε περίπτωση εμετού.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777

GR91267947A

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer

από σταθερό: **800 1135 353**

από κινητό: **210 6166 332**

24/7



5

200309 841624 >



# Bayer

Bayer Ελλάς ABEE, Αγγραλιάου 6-8,  
151 23 Μαρούσι,  
Τηλ.: 210 6166000,  
www.cropscience.bayer.gr