

**Fitotoxicidad:**  
EMESTO SILVER® no es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.



Fungicida terapico para tratamiento de semillas  
GRUPO 3  
GRUPO 7



Suspension concentrada para tratamiento de semillas

Composicion

Penflufen: N-(2-(1,3-dimetilbutil)fenil)-5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxamida .....	10 g
Prothioconazole: 2-(1-cloro ciclopropil)-1-(2clorofenil)-3-(5-mercapto-(1,2,4-triazol-5-il)2-propanol.....	1,8 g
Inertes, coadyuvantes y colorantes c.s.p.....	100 ml

**LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO**

Inscrito ante el SENASA bajo el N° 40.480

Lote N°: ver envase  
Fecha Fab.: ver envase  
Fecha Vto.: ver envase

Industria Argentina



**BAYER S.A.**  
Domicilio: Ricardo Gutiérrez 3652 B1605EHD  
Munro, Bs.As. Argentina.  
Representante de Bayer AG, Alemania  
www.bayercropscience.com - Tel.: 011-4762-7000.

Contenido Neto: **20L**  
No inflamable

Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

AR 85430106a 06/2021



Fungicida terapico para tratamiento de semillas  
GRUPO 3  
GRUPO 7



Suspension concentrada para tratamiento de semillas

Composicion

Penflufen: N-(2-(1,3-dimetilbutil)fenil)-5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxamida .....	10 g
Prothioconazole: 2-(1-cloro ciclopropil)-1-(2clorofenil)-3-(5-mercapto-(1,2,4-triazol-5-il)2-propanol.....	1,8 g
Inertes, coadyuvantes y colorantes c.s.p.....	100 ml

**LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO**

Inscrito ante el SENASA bajo el N° 40.480

Lote N°:  
Fecha Fab.:  
Fecha Vto.:

Industria Argentina



**BAYER S.A.**  
Domicilio: Ricardo Gutiérrez 3652 B1605EHD  
Munro, Bs.As. Argentina.  
Representante de Bayer AG, Alemania  
www.bayercropscience.com - Tel.: 011-4762-7000.

Contenido Neto: **20L**  
No inflamable

**ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO**

**CLASE III** – Producto ligeramente peligroso. Categoría inhalatoria III. No irritante dermal, no irritante ocular, no sensibilizante dermal. Aplicar tratamiento sintomático.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA**

No se conocen.

**ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES**

No aplica

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES**

**Capital Federal:** Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (011)4962-6666/2247 – Hospital de clínicas de Bs.As. (011) 5950-8804/06 int 480. **Pcia. de Buenos Aires:** Hospital A. Posadas (Haedo). (011) 4658-7777/4654-6648. Servicio toxicológico del Hosp. de Niños Sor María Ludovica – La Plata Tel.: (0221) 451-5555/453-5901 (int. 1312). **Pcia. de Santa Fe:** Centro de consultas toxicológicas TAS – CASAFE. Rosario T.E.: (0341) 448-0077 **Pcia. de Córdoba:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 422-2004/421-5400/421-0243. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. **Pcia. de Mendoza:** Hospital Regional Tel.: (0261) 420-0600/Guardia 449-0513/0890. **Pcia. del Chaco:** Hospital J.C. Perrando Tel.: (0372) 42-5050/42-7233/44-2399.

**COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA**

No se conoce.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.



ABRIR  
AQUI



**CUIDADO**



**MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.  
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.  
INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.  
EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.  
EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y  
APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS  
PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.  
PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA  
SALUD Y AL AMBIENTE.  
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA**

**Medidas precautorias generales:**

Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Usar durante la aplicación, protector, guantes y ropa protectora adecuada. Después de la aplicación, lavarse todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto con abundante agua y jabón. Evite el contacto con la piel y el tracto respiratorio y use equipo de protección adecuado durante el manejo de la semilla y la limpieza del equipo. No use semilla tratada para consumo humano o animal o para procesamiento. Manténgase fuera del alcance de los niños, el ganado y la vida silvestre. NO MANIPULE la semilla innecesariamente. No deje bolsas vacías ni semillas sobrantes en el ambiente. Elimínalos de acuerdo con la legislación local. Asegúrese de que las semillas sobrantes se devuelvan a sus bolsas originales y no use bolsas de semillas vacías para otros fines.

**Riesgos ambientales:**

**Toxicidad para abejas:** Virtualmente no tóxico.  
**Toxicidad para aves:** Prácticamente no tóxico.  
**Toxicidad para peces:** Moderadamente tóxico. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde exista agua libre en superficie. Dejar una franja de seguridad de 4 metros entre la zona tratada y el espejo de agua. Evitar derrames en cursos de agua y no contaminar fuentes de agua con el enjuague de los equipos de aplicación. Para proteger a las aves y mamíferos, las semillas tratadas deben estar cubiertas por el suelo una vez sembradas. Eliminar cualquier derrame de semillas.

**Tratamiento de remanentes y caldos de aplicación:**

Los remanentes de caldo que no se utilicen pueden ser asperjados en banquinas o caminos de tierra.

**Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos:**

Los envases vacíos deben descontaminarse mediante triple enjuague. Para ello seguir los siguientes pasos: Llenar los envases con agua hasta 1/3 de su capacidad y cerrarlos firmemente con su tapa. Agitar energicamente los envases durante 30 segundos. El agua del enjuague puede ser asperjada en banquinas o caminos de tierra. Repetir dos veces los pasos 1 al 3. Inutilizar los envases realizando perforaciones en los mismos, evitando dañar la etiqueta en esta operación. Los envases previamente inutilizados, deberán ser trasladados al centro de acopio CampoLimpio más cercano a u otros centros adaptados a los fines.

**Almacenamiento:**

Conservar en el envase original bien cerrado en lugar seco y fresco, lejos del fuego y fuentes de calor. Mantener apartado de semillas, fertilizantes y

alimentos a efectos de prevenir la contaminación de éstos como también del agua de riego y de consumo. Mantener fuera del alcance de la luz directa.

**Derrames:**

Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en los centros de acopio CampoLimpio más cercano o a otros centros adaptados a los fines.

**Primeros auxilios:**

Retirar a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable. Quitar inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada.

En caso de salpicaduras en la piel: Sacar la ropa y los zapatos contaminados. Lavar con abundante agua y jabón. Si los síntomas continúan llamar al médico. En caso de contacto con los ojos: Lavar cuidadosamente y a fondo con abundante agua tibia y seguir las indicaciones del médico.

En caso de inhalación: retirar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo. En caso de ingestión NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Riesgo de que el producto ingrese en los pulmones si se produce el vómito después de la ingestión. Enjuagar la boca.

No administrar nada por boca a un paciente inconsciente.

**Advertencias para el médico:**

**CLASE III – Producto ligeramente peligroso. Categoría inhalatoria II. No irritante demal, no irritante ocular, no sensibilizante dermal. Aplicar tratamiento sintomático.**

**Síntomas de intoxicación aguda:**

No se conocen.

**Advertencias toxicológicas especiales**

No aplica

**Consultas en caso de intoxicaciones:**

**Capital Federal:** Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (011)4962-6666/2247 – Hospital de clínicas de Bs.As. (011) 5950-8804/06 int 480. **Pcia. de Buenos Aires:** Hospital A. Posadas (Haedo). (011) 4658-7777/4654-6648. Servicio toxicológico del Hosp. de Niños Sor María Ludovica – La Plata Tel.: (0221) 451-5555/453-5901 (int. 1312). **Pcia. de Santa Fe:** Centro de consultas toxicológicas TAS – CASAFE. Rosario T.E.: (0341) 448-0077 **Pcia. de Córdoba:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 422-2004/421-5400/421-0243. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. **Pcia. de Mendoza:** Hospital Regional Tel.: (0261) 420-0600/Guardia 449-0513/0890. **Pcia. del Chaco:** Hospital J.C. Perrando Tel.: (0372) 42-5050/42-7233/44-2399.

**Compatibilidad toxicológica**

No se conoce.



Fungicida terapico para tratamiento de semillas  
GRUPO 3  
GRUPO 7



Suspensión concentrada para tratamiento de semillas

**Composición**

Penflufen: N-(2-(1,3-dimetilbutil)fenil)-5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxamida .....	10 g
Prothioconazole: 2-(1-cloro ciclopropil)-1-(2clorofenil)-3-(5-mercapto-(1,2,4-triazol-5-yl)2-propanol .....	1,8 g
Inertes, coadyuvantes y colorantes c.s.p. ....	100 ml

**LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO**

Inscrito ante el SENASA bajo el N° 40.480

Lote N°: ver envase

Fecha Fab.: ver envase

Fecha Vto.: ver envase

Industria Argentina

Contenido Neto: **20L**  
No inflamable



**BAYER S.A.**  
Domicilio: Ricardo Gutiérrez 3652 B1605EHD  
Munro, Bs.As. Argentina.  
Representante de Bayer AG, Alemania  
www.bayercropsscience.com - Tel.: 011-4762-7000.

**Generalidades:** EMESTO SILVER® es un producto compuesto por los ingredientes activos Penflufen y Prothioconazole. Penflufen es un fungicida perteneciente al grupo químico de las Carboxamidas específico para el tratamiento de enfermedades causadas por hongos de suelo. Penflufen actúa inhibiendo el transporte de electrones (complejo 2). Prothioconazole es un fungicida de la clase química de las triazolintionas y actúa interfiriendo la ruta metabólica del ergosterol. Actúa en forma preventiva, curativa y erradicativa. Tiene acción sistémica y de contacto. EMESTO SILVER®, actúa como un eficiente fungicida. Debe asperjarse la suspensión en el fondo del surco y en el corte de la papa durante el proceso de plantación de la papa.

**Instrucciones para el uso:**

**Preparación:**

EMESTO SILVER® se aplica de manera preventiva durante la plantación, asperjando en la línea de caída de la papa "semilla" o corte y en el fondo del surco. La aplicación debe ser realizada con el producto diluido en agua. Esto permite una aplicación precisa de la dosis recomendada, lo cual se logra con instalaciones diseñadas para tal fin. Es suficiente un volumen de 50 a 70 l/ha de caldo.

**Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:**

El equipo a utilizar debe estar diseñado para tal fin, montado sobre la plantadora y con picos aspersores sobre cada línea de aplicación, mojando surco y el corte de la papa semilla. NO MANIPULE la semilla innecesariamente. Los trabajadores de campo no deben estar en las sembradoras expuestos a la aspersión.

**Recomendaciones de uso:**

Cultivo	Plaga/Enfermedad	Dosis	Momento de Aplicación
Papa	Fusarium ( <i>Fusarium spp.</i> ) Rhizoctonia ( <i>Rhizoctonia spp.</i> )	1.000 - 1.250 col/ha	La aplicación debe ser realizada en el surco y sobre el corte de la papa al momento de plantación.

**Restricciones de uso:**

Período de carencia: no corresponde, en virtud de tratarse de un producto utilizado junto a la siembra. (Uso posicionado)  
EMESTO SILVER® no altera el poder germinativo de la papa semilla. Importante: "En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia". El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

**Compatibilidad:**

EMESTO SILVER® es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. No aplicar EMESTO SILVER® en mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo. No hacer mezclas de tanque para más de un día de trabajo.



**CUIDADO**



Fungicida terapico para tratamiento de semillas  
GRUPO 3  
GRUPO 7



AR 85430106a 06/2021

Suspension concentrada para tratamiento de semillas  
Composicion

Penflufen: N-(2-(1,3-dimetilbutil)fenil)-5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxamida .....	10 g
Prothioconazole: 2-(1-cloro ciclopropil)-1-(2clorofenil)-3-(5-mercapto-(1,2,4-triazol-5-yl)2-propanol .....	1,8 g
Inertes, coadyuvantes y colorantes c.s.p. ....	100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito ante el SENASA bajo el N° 40.480

Lote N°: ver envase  
Fecha Fab.: ver envase  
Fecha Vto.: ver envase

Industria Argentina

Contenido Neto:

**20L**  
No inflamable



BAYER S.A.  
Domicilio: Ricardo Gutiérrez 3652 B1605EHD  
Munro, Bs.As. Argentina.  
Representante de Bayer AG, Alemania  
www.bayercropscience.com - Tel.: 011-4762-7000.

**ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO**

CLASE III – Producto ligeramente peligroso. Categoría inhalatoria III. No irritante dermal, no irritante ocular, no sensibilizante dermal. Aplicar tratamiento sintomático.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA**

No se conocen.

**ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES**

No aplica

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES**

**Capital Federal:** Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (011)4962-6666/2247 – Hospital de clínicas de Bs.As. (011) 5950-8804/06 int 480. **Pcia. de Buenos Aires:** Hospital A. Posadas (Haedo). (011) 4658-7777/4654-6648. Servicio toxicológico del Hosp. de Niños Sor María Ludovica – La Plata Tel.: (0221) 451-5555/453-5901 (int. 1312). **Pcia. de Santa Fe:** Centro de consultas toxicológicas TAS – CASAFe. Rosario T.E.: (0341) 448-0077 **Pcia. de Córdoba:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 422-2004/421-5400/421-0243. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. **Pcia. de Mendoza:** Hospital Regional Tel.: (0261) 420-0600/Guardia 449-0513/0890. **Pcia. del Chaco:** Hospital J.C. Perrando Tel.: (0372) 42-5050/42-7233/44-2399.

**COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA**

No se conoce.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.



**CUIDADO**

