FLINT® MAX 75 WG

ΦΛΙΝΤ ΜΑΞ 75 WG

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το Flint Max 75 WG είναι μίγμα δυο μυκητοκτόνων με προστατευτική και θεραπευτική δράση: του trifloxystrobin που εμφανίζει διελασματική και τοπικά διασυστηματική κίνηση καθώς και αξιόλογη δράση με ατμούς και του tebuconazole που εμφανίζει διασυστηματική κίνηση. Το trifloxystrobin, είναι συνθετικό παράγωγο των φυσικών στρομπιλουρινών με διελασματική δράση. Οι στρομπιλουρίνες παρεμποδίζουν τη μιτοχονδριακή αναπνοή, διακόπτοντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην κυτοχρωμική άλυσίδα. Το tebuconazole σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε στο ψεκαστικό την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε με νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιες ποικιλίες): Oιδιο (*Erysiphe necator*). Προληπτικοί/ Θεραπευτικοί ψεκασμοί φυλλώματος από την έκπτυξη του πέμπτου φύλλου μέχρι το τέλος της άνθησης. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες. **Δόση:** 18-20 γρ./100 λίτρα νερού (18-20 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): Oιδιο (*Erysiphe necator*). Προληπτικοί/ Θεραπευτικοί ψεκασμοί φυλλώματος από την έκπτυξη του πέμπτου φύλλου μέχρι την έναρξη χρωματισμού των ραγών. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες. **Δόση:** 18-20 γρ./100 λίτρα νερού (18-20 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

ΜΗΛΙΑ: Φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis*), Oιδιο (*Podosphaera leucotricha*), Αλτερνάρια (*Alternaria alternata*). Προληπτικές εφαρμογές από την περίοδο πριν την άνθηση μέχρι πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες. **Δόση:** 20 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

ΑΧΛΑΔΙΑ: Φουζικλάδιο (*Venturia pirina*), Στεμφύλιο (*Stemphylium vesicarium*). Προληπτικές εφαρμογές από την περίοδο πριν την άνθηση μέχρι πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες. **Δόση:** 20 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ: Ωίδιο (*Sphaerotheca pannosa*). Προληπτικές εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες. **Δόση:** 20 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** • Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά: 2. • Δαμασκηνιά, Κερασιά: 3.

Μονίλια (*Monilia spp.*).Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης με μεσοδιάστημα εφαρμογών 12-14 ημερών και πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση) με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημερών.**Δόση:** 20 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** • Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά: 2. • Δαμασκηνιά, Κερασιά: 3.

Εξώασκος της Ροδακινιάς (*Taphrina deformans*). Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 12-14 ημέρες. **Δόση:** 20 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα).**Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: • Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά: 2. • Δαμασκηνιά, Κερασιά: 3.

ΧΡΗΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ - ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ)*: Κλαδοσπόριο* (*Cladosporium carpophilum* συν. *Fusicladium carpophilum*). Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο απόπτισης του κάλυκα και μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης. Μεσοδιάστημα εφαρμογών:12-14 ημέρες. **Δόση:** 20 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2.

Σκωρίαση* (*Tranzschelia prunispinosae*). Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης και μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 12-14 ημέρες. **Δόση:** 20 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2.

ΕΛΙΑ: Κυκλοκόνιο (*Spilocaea oleagina*).

Προληπτική εφαρμογή από την έναρξη της βλάστησης μέχρι πριν την άνθηση. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 12-14 ημέρες. **Δόση:** 20 γρ./100 λίτρα νερού (25 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 125 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1.

ΤΟΜΑΤΑ (Υ & Θ), ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ & Θ): Ωίδιο (*Leveillula taurica*). Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο πριν την άνθηση έως πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 8-12 ημέρες. **Δόση:** 20-30 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** Υπαίθριες: 100 λίτρα/στρέμμα, Θερμοκήπιο: 150 λίτρα/ στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

ΧΡΗΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ - ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ* (ΥΠΑΙΘΡΟΥ): Ωίδιο (*Leveillula taurica*). Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο πριν την άνθηση έως πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 8-12 ημέρες. **Δόση:** 30 γρ./100 λίτρα νερού (20-30 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

ΑΓΓΟΥΡΙ (Υ & Θ), ΚΟΛΟΚΥΘΙ (Υ & Θ), ΠΕΠΟΝΙ (Υ & Θ), ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υ & Θ), ΚΟΛΟΚΥΘΑ (Υ & Θ): Ωίδιο (*Podosphaera fusca, Erysiphe cichoracearum*). Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο πριν την άνθηση έως πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 8-12 ημέρες. **Δόση:** 20-30 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** Υπαίθριες: 100 λίτρα/στρέμμα, Θερμοκήπιο: 150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

ΧΡΗΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ - ΑΓΚΙΝΑΡΑ*: Ωίδιο ανθοκεφαλής (*Leveillula taurica*). Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη ανάπτυξης των βλαστών έως πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 8-12 ημέρες. **Δόση:** 20-25 γρ./100 λίτρα νερού (20-25 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Προληπτικές εφαρμογές πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. 2. Σε περίπτωση υψηλής προσβολής χρησιμοποιείστε το Flint Max στην υψηλή του δοσολογία και με τα πιο σύντομα μεσοδιαστήματα.

*: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια των πυρηνόκαρπων της μελιτζάνας και της αγκινάρας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. • **Υ & Θ** = Υπαίθρου & Θερμοκηπίου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: • Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες): Εφαρμογή μέχρι το τέλος της άνθησης. • Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): 14 ημέρες • Μηλιά, Αχλαδιά: 14 ημέρες. • Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Αγκινάρα: 7 ημέρες. • Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα, Μελιτζάνα: 3 ημέρες. • Ελιά: Δ.Ε. (χρόνος εφαρμογής).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: • Εφαρμόστε το Flint Max 75 WG προληπτικά πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. • Εφαρμόστε το Flint Max 75 WG σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης. • Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3 ανάλογα με την καλλιέργεια. • Να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άμμο υψηλότερη του 80%.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστώμενη χρήση και δόση, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΗΜΕΡ. Λ'ΗΞΗΣ: Ελέπε συσκευασία.

Bayer

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ,
Αγησιλάου 6-8,
151 23 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6166000,
www.cropscience.bayer.gr

5 200309 888940 >

FLINT® MAX

FLINT® MAX 75 WG

200gr e

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (Υ.Α.Α.Τ.):60405/07-02-2014

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)
Εγγ. Σύνθεση:
Δραστική ουσία: tebuconazole 50% β/β,
trifloxystrobin 25% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 21,73% β/β

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων

με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

UFI: 41D0-10DM-H009-FPNE

GROUP 11 | 3 FUNGICIDE

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση
στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ,
Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6166000, www.cropscience.bayer.gr

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

BAYWIN

GR84493368E

BONUS STICKER

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.• Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο. • Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα. • Περιέχει trifloxystrobin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.• Μην αναπνέετε σκόνη. • Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση.• Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή. • Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Γενικά:** Απομακρυνθείτε από την επιπόλυπη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετείστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και ησεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε αμέσως ένα γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. • **Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.**

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. **Πληροφορίες για το γιατρό: Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. **Θεραπεία:** Συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση κατάποσης η πλύση στομάχου πρέπει να ακολουθείται στις 2 πρώτες ώρες μόνο εφόσον έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα. Παρ' όλα αυτά η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού νατρίου συνιστάται πάντα.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Γραμμή **έκτακτης ανάγκης** Bayer 24/7
από σταθερό: **800 1135 353**
από κινητό: **210 6166 332**

Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί επίσημη/πρωτότυπη ετικέτα
και παρατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ενημερωμένη ετικέτα
του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.