



FLINT
50 WG

ΦΛΙΝΤ 50 WG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μυκητοκτόνο με κυρίως προληπτική αλλά και θεραπευτική δράση. Εμφανίζει διελασματική και τοπικά διασυσταμιακή κίνηση καθώς και αξιόλογη δράση σε αμιούς. Η δραστική ουσία trifloxystrobin είναι παρεμποδιστή της μιτοχονδριακής αναπνοής των μυκήτων στη θέση Qo του συμπλόκου III του κυτοχρωμάτου bc 1 (ομάδα Qo1s, υποομάδα οκίμινωσacetates).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματων.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Σε περίπτωση μγμάτων βυτίου, βάλτε το Flint 50 WG πρώτο και συνεχίστε με τα υπόλοιπα σκευάσματα, αναδευόμενα συνεχώς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:

ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποθιμίσιες ποικιλίες, Επιτραπέζιες ποικιλίες, Σταφίδα): **Όλιδο** (*Ustilago necator*). Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο μήκους βλαστού 10 εκ μέχρι το κλείσιμο της σταφύλης. Το προϊόν εμφανίζει δευτερεύουσα δράση εναντίον του περονόσπορου (*Plasmopara viticola*) (BBCH 14-79). **Δόση:** 12,5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 3/10-14.

ΜΗΛΙΑ: Φουζυκιάδιο (*Venturia inaequalis*). **Δόση:** 7,5-10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-10 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Όλιδο** (*Rhodospaera leucotricha*). **Δόση:** 10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (10 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα. Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι μέγεθος καρπού ημίσιος του τελικού. Για το φουζυκιάδιο και το ωίδιο θεραπευτικές επεμβάσεις με τη δόση των 10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα νερό και μόνο κατόπιν σύστασης από τις γεωργικές προεδιοποιήσεις (BBCH 09-75). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 3/10-12.

ΑΧΛΙΑΔΙΑ: Φουζυκιάδιο (*Venturia inaequalis*). **Δόση:** 7,5-10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-10 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/ στρέμμα. **Όλιδο** (*Rhodospaera leucotricha*). **Δόση:** 10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (10-15 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Στεμφύλιο** (*Stemphylium* spp.). **Δόση:** 15 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (15 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι μέγεθος καρπού ημίσιος του τελικού. Για το φουζυκιάδιο και το ωίδιο θεραπευτικές επεμβάσεις με τη δόση των 10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα νερό και μόνο κατόπιν σύστασης από τις γεωργικές προεδιοποιήσεις (BBCH 09-75). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 3/10-12.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: Όλιδο (*Sphaerotheca pannosa*). Από την πτώση των πετάλων μέχρι το μέγεθος του καρπού να φτάσει το 90% τελικού μεγέθους (BBCH 69-79). **Δόση:** 15 γρ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (15 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 3/10-14.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: Χρήση ήσσονος σημασίας: Κλαδοσπορίωση* (*Venturia carpophila* (*Cladosporium carpophilum*)). Από την πτώση των πετάλων μέχρι το μέγεθος του καρπού να φτάσει το 90% τελικού μεγέθους (BBCH 69-79). **Δόση:** 15 γρ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (15 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός**

εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 3/10-14.

ΕΛΙΑ: Κυκλοκόνιο (*Cycloconium oleaginum*). **Χρήση ήσσονος σημασίας: Πλοισπόριο*** (*Colletotrichum gloeosporioides*, *Colletotrichum acutatum*, *Colletotrichum clavatum*). Από το στάδιο όπου οι βλαστοί φτάνουν το 70% του τελικού μεγέθους μέχρι και το στάδιο όπου ο καρπός αποκτάει ανοιχτό πράσινο-κίτρινο χρώμα (BBCH 37-79). **Δόση:** 10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (10-15 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/ στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 2 / Μόνο 1 εφαρμογή επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου.

ΤΟΜΑΤΑ (Θ): Όλιδο (*Leveillula tomativora*). Προληπτικές επεμβάσεις (πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων) (BBCH 21-89). **Δόση:** 12,5 γρ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/ στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 3/10-14.

ΠΕΠΟΝΙ (Α, Θ): Όλιδο (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*). Προληπτικές επεμβάσεις (πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων) (BBCH 21-89). **Δόση:** 12,5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού, 25** γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (max), 25** γρ. σκευάσματος/-στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 3/10-14.

ΡΥΖΙ: Καφέ κηλίωση φύλλων (*Bipolaris* sp.). Πυρκαυλάριο (*Pyricularia oryzae*). Προληπτικές επεμβάσεις (πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων) από την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους έως την έναρξη της άθισης (BBCH 30-61). **Δόση:** 25 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (max). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-60 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1.

Παρατηρήσεις:
* «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στο γλοισπόριο της ελιάς και την κλαδοσπορίωση της ροδακινιάς. Για τις χρήσεις αυτές ο κατάλογος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα την εφαρμογή του σκευάσματος».

**Στο πεπόνι προτείνεται η εφαρμογή της μεγαλύτερης δόσης των 25 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού, υπό συνθήκες υψηλής πίεσης προσβολής και για μεγαλύτερα μεσοδιαστήματα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΚΟΜΙΔΗ:
Αμπέλι (Οινοποθιμίσιες ποικιλίες, Επιτραπέζιες ποικιλίες, Σταφίδα), **Ρύζι:** 28 ημέρες

Μήλα, Αχλάδια, Ελιά: 14 ημέρες
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερκοκιά: 7 ημέρες.
Τομάτα, Πεπόνι: 3 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διαγερίση ανθεκτικότητας:
• Εφαρμόστε το Flint 50 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.

• Εφαρμόστε το Flint 50 WG σε προγραμματά ψεκασιών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους Qo1s με τα οποία δεν εμφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα.

• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3 ανάλογα με την καλλιέργεια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιεργείες και στις συσσωστώμενες δόσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα καλά συσκευασίες αφού καταστραφούν προηγούμενος με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα



FLINT
50 WG

εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική φραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
Βλέπε συσκευασία.

Επίσημο έλεγχος ανάγνωσης Bayer 124/7 από σελίδα: 800 1135 353 από κάρτα: 210 6166 332



Bayer

Bayer Ελλάς ABEE, Αηγιάλδου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000, www.cropsience.bayer.gr



FLINT
50 WG



FLINT
50 WG

100 gr e

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγ. Σύνθεση: Δραστική ουσία: Trifloxystrobin 50,0% β/β, Βοηθ. ουσίες: 47,9% β/β

Μυκητοκτόνο

με κυρίως προληπτική αλλά και θεραπευτική δράση

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μην αναπνέετε σκόνη. • Να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα. • Αποφύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλες μάσκες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Διάθεση περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μα μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιδοστρωτές επιφάνειες και τους δρόμους.) • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και 5 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού από τα επιφανειακά ύδατα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. • Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

GROUP 11 FUNGICIDE

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κατάλογος της άδειας Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ABEE, Αηγιάλδου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000, www.cropsience.bayer.gr



GR84451142F



FLINT
50 WG

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΙΟΤΑ:

Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. Μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:

Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζωστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Σε περίπτωση επαφής με το

δέρμα: Πλύνετε επιμελώς με άφθονο νερό και σα- πούν (εάν υπάρχει, με polyethyl- eneglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. • Βγάλτε αμέ- σως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξανα- χρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση επαφής με τα

μάτια: Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομα- κρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά το πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή, στην περίπτωση που ο ερεθισμός επι- μένει και αναπτύσσεται. Σε περι- πτώση κατάποσης: ΜΗΝ προκα- λέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Πληροφορίες για το γιατρό:

Θεραπεία: Σε περίπτωση κατά- ποσης ή πτώσης στομάχου πρέπει να ακολουθείται στις 2 πρώτες ώρες μόνο εφόσον έχει καταποθεί σιγμανικό χορήγηση. Παρ' όλα αυτά η χορήγηση ενεργού άνθρα- κα και θειικού νατρίου συστατάι πάντα. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΠΡΟΣΟΧΗ



UFI: VF60-40HT-M004-FGS7

Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί επίσημη/πρωτότυπη ετικέτα και παρατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.