



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Βιοασημαντικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολίν), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιόμυκητες, Ασκιόμυκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors – DMIs).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλλύψεως.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδύοντας τη συνιστώμενη δόση του ψεκαστικού.

ΡΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:

ΜΗΛΙΑ: Φουζηλάδιο (*Venturia theaequalis*): Εφαρμογές από το φρούκωμα των ανθοφόρων ροθαλιών (λίγο πριν την ρόδινη κορυφή) έως το τέλος της άνθησης και την πτώση των πετάλων.
Δόση: 60 γρ./στρέμμα (μέγιστο) (40 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 2/14.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: Ωίδιο (*Sphaerotheca pannosa*): Εφαρμογές από το στάδιο της εμφάνισης του καρπίδιου έως την πλήρη ωρίμανση και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs. **Δόση:** 75 γρ./στρέμμα (μέγιστο) (50 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 2/14.

Μούλια (Monilia laxa): Εφαρμογές από το στάδιο της εμφάνισης του καρπίδιου έως την πλήρη ωρίμανση και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs. **Δόση:** 75 γρ./στρέμμα (μέγιστο) (50-75* γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150* λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 2/14.

ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιες ποικιλίες): Ωίδιο (*Uncinula necator*): Εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης μέχρι το τέλος της άνθησης ανά 12-14 ημέρες. **Δόση:** 40 γρ./στρέμμα (μέγιστο) (40 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 80-100 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 2/12-14.

ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): Ωίδιο (*Uncinula necator*): Εφαρμογές από το στάδιο της καρπώσεως μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής ανά 12-14 ημέρες. **Δόση:** 40 γρ./στρέμμα (μέγιστο)

(40 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 80-100 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 2/12-14.

ΣΠΑΡΑΓΓΙ:
Σκωρίαση (*Puccinia asparagi*): Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας με μεσοδιάστημα 14 ημέρες. **Δόση:** 100 γρ./στρέμμα (μέγιστο). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 2/14.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Στα Πυρηγόκαρπα για την καταπολέμηση της **Μονιλίας** ο μεγάλος όγκος νερού (150 λίτρα/στρέμμα) να χρησιμοποιείται με τη χαμηλή δόση σκευάσματος ανά εκατόλιτρο (50 γρ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 75 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει **Υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων.**

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Μήλια: 35 ημέρες.

Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 7 ημέρες.
Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες): Εφαρμογή μέχρι το τέλος της άνθησης.
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): 21 ημέρες.

Σπαράγγι: 6 μήνες.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΤΟΜΟΦΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Χρήση του Folicur 25 WG μόνο προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά περίπτωση επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το Tebuconazole.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχάρα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναπομπή τους σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόμενο και σε κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΗΕΡ. ΑΛΗΘΗΣ: Βλέπε συσκευασία.




1kg e

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Εγγ. Σύνθεση: Tebuconazole 25% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 73,7% β/β

Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ABEE, Αηγιολάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000, www.cropscience.bayer.gr

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.






1kg e

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Εγγ. Σύνθεση: Tebuconazole 25% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 73,7% β/β

Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ABEE, Αηγιολάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000, www.cropscience.bayer.gr

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.



Φολικούρ 25 WG

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Υποπνο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤ:
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμείνει ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση στυγνιμότητας ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε αυτή την ετικέτα.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

