

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 958/2025d z dnia 21.11.2025 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 99/2013 z dnia 20.06.2013 r.

Posiadacz zezwolenia:

Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51 373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00, www.agro.bayer.com.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
.....

Z A T O 50 W G

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

trifloksystrobina - związek z grupy strobiluryn - 500 g w 1 kg środka (50,0%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 99/2013 z dnia 20.06.2013 r.
ostatnio zmieniony decyzją MRiRW nr R - 958/2025d z dnia 21.11.2025 r.



UWAGA

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H362 – Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P260 – Nie wdychać pyłu

P263 – Unikać kontaktu w czasie ciąży i karmienia piersią.

P280 – Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy

P308+313- W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zebrać rozsypany produkt

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), o działaniu mezostemicznym, do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Działanie mezostemiczne polega na rozprzestrzenianiu się substancji czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na powierzchni liści, wiązaniu się z powierzchniową warstwą wosków oraz częściowym działaniem wgłębnym połączonym z przemieszczaniem się w przestworach międzykomórkowych.

Środek zawiera substancję czynną - trifloksystrobina, związek z grupy strobiluryn (inhibitor oddychania komórkowego – inhibitor cytochromu bc1 - fungicydy QoI, wg klasyfikacji FRAC grupa 11).

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

Jabłoń

mączniak jabłoni

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg/10 000 m² powierzchni ściany liści – LWA (0,15 kg/ha).

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku kwitnienia, gdy otwarte jest około 10% kwiatów do fazy rozwoju owoców, gdy owoc osiąga 90% typowej wielkości (BBCH 61- 79).

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

gorzka zgnilizna jabłek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg/ 10 000 m² powierzchni ściany liści – LWA (0,15 kg/ha).

Termin stosowania: środek zastosować na cztery i dwa tygodnie przed planowanym zbiorem, od fazy rozwoju owoców, gdy owoc osiąga 90% typowej wielkości do fazy zaawansowanego dojrzewania (barwa owoców staje się bardziej intensywna) (BBCH 79-85).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Uwaga: Środek wykazuje średni poziom skuteczności w ochronie jabłoni przed mączniakiem jabłoni.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH

***Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.***

Grusza

parch gruszy, mączniak jabłoni (na gruszy), rdza gruszy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg/ 10 000 m² powierzchni ściany liści – LWA (0,15 kg/ha).

Termin stosowania: środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od końca fazy rozwoju kwiatostanu, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę do fazy zaawansowanego dojrzewania owoców, gdy barwa owoców staje się bardziej intensywna (BBCH 59- 85).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

brązowa plamistość liści gruszy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg/ 10 000 m² powierzchni ściany liści – LWA (0,15 kg/ha).

Termin stosowania: środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy zasychania kwiatów, gdy większość płatków opada do fazy zaawansowanego dojrzewania owoców, gdy barwa owoców staje się bardziej intensywna (BBCH 67-85).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 500 -750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w uprawie gruszy): 2

Truskawka (w uprawie w szklarni i w uprawie pod osłonami)

mączniak prawdziwy truskawki.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha

Termin stosowania: środek stosować w okresie największego zagrożenia występowania choroby, od początku tworzenia pędu rozłogowego (od ok. 2 cm długości) do fazy drugiego zbioru owoców, gdy większość z nich jest wybarwiona (zbiór późny) (BBCH 41-90).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Truskawka (w uprawie w polu)

biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha

Termin stosowania: środek stosować w okresie największego zagrożenia występowania chorób, od fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę do fazy początku dojrzewania (owoce zaczynają się wybarwiać) (BBCH 59-81).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 600-1200 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Pigwowiec japoński

parch gruszy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha

Termin stosowania: środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy zielonego pąka do fazy, gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji, posiadają typowy smak i jędrność (BBCH 56-89).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Jabłoń płonka, nieszpulka zwyczajna, pigwa, grusza azjatycka

parch jabłoni, parch gruszy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg/ 10 000 m² powierzchni ściany liści – LWA (0,15 kg/ha).

Termin stosowania: środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy zielonego pąka do fazy, gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji, posiadają typowy smak i jędrność (BBCH 56-89).

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Seler korzeniowy

septorioza selera

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liści właściwych do fazy całkowitego rozwoju, gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 16-49).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Rośliny ozdobne cebulowe i bulwiaste (w uprawie w polu)

szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju liści do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 11-89).
Środek można stosować wyłącznie na roślinach o wysokości powyżej 50 cm.

Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Rośliny ozdobne doniczkowe i uprawiane na kwiat cięty (w uprawie w polu)

rdze, mączniaki prawdziwe

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,0125% (12,5 g środka w 100 l wody).
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy rozwiniętych dwóch liści właściwych (dwóch par lub dwóch okółek) do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 12-89).

Środek można stosować wyłącznie na roślinach o wysokości powyżej 50 cm.

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Rośliny ozdobne wieloletnie – byliny o wysokości powyżej 50 cm (w uprawie w polu)
mączniaki prawdziwe

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,0125% (12,5 g środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętych dwóch liści właściwych (dwóch par lub dwóch okółek) do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 12-89).

Środek można stosować wyłącznie na roślinach o wysokości powyżej 50 cm.

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Róża (w uprawie w polu)
mączniak prawdziwy róży

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,0125% (12,5 g środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętych dwóch liści właściwych (dwóch par lub dwóch okółek) do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 12-89).

Środek można stosować wyłącznie na roślinach o wysokości powyżej 50 cm.

Liczba zabiegów: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Środek cechuje się bardzo dobrą przyczepnością i jest mało wrażliwy na zmywanie przez deszcz.

Środek można stosować na mokre liście, podczas mgły i mżawki. Stosując na wilgotne liście używać mniejszej ilości wody, aby nie dopuścić do spływania cieczy użytkowej z liści.

Środek działa w szerokim zakresie temperatur powietrza.

Środek zawiera substancję czynną - trifloksystrobina, związek z grupy strobiluryn (inhibitory oddychania komórkowego – inhibitor cytochromu bc1 - fungicydy QoI, wg klasyfikacji FRAC grupa 11). W ramach strategii przeciwdziałania rozwojowi odporności w populacjach sprawców chorób zaleca się:

- stosować środek głównie w zabiegach zapobiegawczych (profilaktycznie),
- nie stosować środka w dawkach/stężeniach niższych niż są zalecane na etykiecie,
- nie przekraczać zalecanej dla środka liczby zabiegów w sezonie,
- w realizowanym programie ochrony środek stosować przemienne lub w mieszaniu ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup wg klasyfikacji FRAC, środki te należy stosować zgodnie z zapisami z etykiety, w pełnych zalecanych dawkach.

Stosowanie środka w mieszaniu z innym środkiem grzybobójczym jest szczególnie zalecane w ochronie jabłoni przed mączniakiem jabłoni. Środek taki powinien zawierać substancję czynną o innym mechanizmie działania (z innej grupy niż grupa FRAC 11) i cechować się wysoką, potwierdzoną w praktyce skutecznością w ochronie przed tą chorobą.

Zalecana dawka środka w ochronie jabłoni, gruszy, pigwy, jabłoni płonki, nieszpulki zwyczajnej i gruszy azjatyckiej odnosi się do faktycznej powierzchni opryskiwania, czyli bocznej powierzchni rzędu drzew, określanej jako „powierzchnia ściany liści” – LWA:

Powierzchnia ściany liści - LWA [m ² /ha]	=	$\frac{2 \times \text{wysokość opryskiwanej ściany liści [m]} \times 10\,000 \text{ [m}^2\text{/ha]}}{\text{rozstawa rzędów [m]}}$
---	---	--

Obliczenie dawki przestrzennej – zalecanej dawki środka na powierzchnię ściany liści (LWA):

Zalecana dawka środka na powierzchnię ściany liści [kg/10 000 m ²]	=	$\frac{\text{Ilość środka [kg/ha]} \times 10\,000 \text{ [m}^2\text{/ha]}}{\text{powierzchnia ściany liści [m}^2\text{/ha]}}$
---	---	---

Obliczenie ilości środka potrzebnego na 1 ha sadu (kg/ha) w celu sporządzenia cieczy użytkowej:

Ilość środka [kg/ha]		Zalecana dawka środka na powierzchnię ściany
	=	liści [kg/10 000 m ²] x powierzchnia ściany liści
		[m ² /ha]
		10 000 [m ² /ha]

Przed zastosowaniem środka ochrony roślin w ochronie jabłoni, gruszy, pigwy, jabłoni płonki, nieszpulki zwyczajnej i gruszy azjatyckiej należy każdorazowo wyliczyć rzeczywistą powierzchnię ściany liści (LWA) i dawkę przestrzenną dla kwatery/sadu w której/w którym środek ma być zastosowany.

Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki środka na 1 ha powierzchni płaskiej uprawy nawet w sytuacji, gdy aktualna powierzchnia ściany liści (LWA) wskazywać może na potrzebę zastosowania wyższej dawki

OKRESY KARENCJI

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Jabłoń, grusza, jabłoń płonka, nieszpulka zwyczajna, pigwa, pigwowiec japoński, grusza azjatycka,

seler korzeniowy – 14 dni

truskawka – 3 dni

Rośliny ozdobne cebulowe i bulwiaste, doniczkowe i na kwiat cięty, byliny ozdobne – nie dotyczy

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszałem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszałem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak jak z resztkami cieczy użytkowej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz rękawice ochronne i odzież ochronną w trakcie wykonywania zabiegu.

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczoł.

Stosowanie środka w szklarniach o trwałej, odizolowanej od podłoża konstrukcji nie wymaga wyznaczania stref ochronnych ani stosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej.

Jabłoń, grusza, jabłoń płonka, nieszpuka zwyczajna, pigwa, pigwowiec japoński, grusza azjatycka

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

- 50 m od zbiorników i cieków wodnych lub
- 30 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%, lub
- 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Truskawka – zabieg w dawce 0,125 kg/ha

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

- 5 m od zbiorników i cieków wodnych lub
- 1 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

- 10 m od zbiorników i cieków wodnych lub
- 5 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%, lub
- 1 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

Truskawka – zabieg w dawce powyżej 0,125 kg/ha, seler korzeniowy

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

- 10 m od zbiorników i cieków wodnych lub
- 5 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%, lub
- 1 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Rośliny ozdobne (w tym róża)

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA ORAZ PIERWSZA POMOC

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -