

*Fungicide*

**Fandango®**

VOORBEELD

**5 l**



ARTIKELNR.: 80877595

**Productnaam:** Fandango

**Toelatingsnummer:** 12723N - W6

**Aard van het preparaat:** emulgeerbaar concentraat

**Werkzame stof:** prothioconazool & fluoxastrobin

**Gehalte:** 100 g/l & 100 g/l

**Professioneel gebruik**

de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Fluoxastrobin, Prothioconazool.

**Gevarenaanduidingen**

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H332 Schadelijk bij inademing.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Voorzorgsmaatregelen**

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming.

P305 + P351+ P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk Een arts raadplegen (die eventueel contact kan

opnemen met het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**

P410 Tegen zonlicht beschermen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor afval. Zie STORL

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

**Aanvullende etiketelementen**

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

**Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende originele verpakking.**

**Droog, vorstvrij en achter slot bewaren.**

**Verbod hergebruik verpakking.**

UFI: MEC0-G0JU-C00U-T9JY

**GEVAAR**

**Werkingswijze**

| GROUP | 3 | 11 | FUNGICIDES |
|-------|---|----|------------|
|-------|---|----|------------|



Lege, schone en droge verpakkingen kan bij STORL worden ingeleverd.

**IN GEVAL VAN NOOD:**  
Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor  
professionele hulpverleners:  
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum  
(NVIC) +31 (0)88 755 8000  
In overige gevallen Bayer CropScience  
+31 (0)6-553 724 90

NL85841459I



4 000680 075486



UN 3082

Chargennummer:  
zie elders op de verpakking

® is een geregistreerd  
handelsmerk van de  
Bayer Groep

Bayer CropScience SA-NV  
Postbus 88  
2130 AB Hoofddorp  
Tel. 023-7991095

**Bayer**

## **Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

### **Algemeen advies:**

Buiten de gevaarlijke zone brengen.

Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.

### **Inademing:**

In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

### **Aanraking met de huid:**

Met veel water en zeep afwassen, indien voor handen, met veel polyethyleenglykol 400. Vervolgens reinigen met water.

Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

### **Aanraking met de ogen:**

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.

Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten.

Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

### **Inslikken:**

GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

## **Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

### **Verschijnselen:**

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

## **Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

### **Behandeling:**

Symptomatisch behandelen.

Een maagspoeling is normaal niet nodig. Als een grotere hoeveelheid ingeslikt is, medicinale houtskool en natrium-sulfaat geven. Een specifiek tegengif is niet bekend.

## WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitieflijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgj juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

### Toepassingsvoorwaarden:

| Toepassings-<br>gebied | Werkzaamheid<br>getoetst op                                                                                                                          | Dosering*<br>middel per<br>toepassing | Maximaal aantal<br>toepassingen<br>per teeltcyclus | Maximaal aantal<br>liter middel per<br>ha per teeltcyclus | Minimum interval<br>tussen toepassingen<br>in dagen | Veiligheidstermijn<br>in dagen |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wintertarwe            | Voetziekte <sup>1</sup> , kafjesbruin <sup>2</sup> ,<br>aarfusarium <sup>3</sup>                                                                     | 1,5 l/ha                              | 1                                                  | 1,5 l/ha                                                  | -                                                   | 35                             |
|                        | of<br>Bladvlekkenziekte <sup>4</sup> ,<br>echte meeldauw <sup>5</sup> ,<br>DTR <sup>6</sup> , bruine roest <sup>7</sup> ,<br>gele roest <sup>8</sup> | 1,5 l/ha                              | 2                                                  | 3 l/ha                                                    | 21                                                  | 35                             |
| Wintergerst            | Netvlekkenziekte <sup>9</sup> ,<br>bladvlekkenziekte <sup>10</sup> ,<br>dwergroest <sup>11</sup> ,<br>echte meeldauw <sup>5</sup>                    | 1,25 l/ha                             | 2                                                  | 2,5 l/ha                                                  | 21                                                  | 35                             |
| Triticale              | Voetziekte <sup>1</sup> , kafjesbruin <sup>2</sup> ,<br>aarfusarium <sup>3</sup>                                                                     | 1,5 l/ha                              | 1                                                  | 1,5 l/ha                                                  | -                                                   | 35                             |
|                        | of<br>Bladvlekkenziekte <sup>4</sup> ,<br>echte meeldauw <sup>5</sup> ,<br>DTR <sup>6</sup> , bruine roest <sup>7</sup> ,<br>gele roest <sup>8</sup> | 1,5 l/ha                              | 2                                                  | 3 l/ha                                                    | 21                                                  | 35                             |
| Zomertarwe             | Voetziekte <sup>1</sup> , kafjesbruin <sup>2</sup> ,<br>aarfusarium <sup>3</sup>                                                                     | 1,5 l/ha                              | 1                                                  | 1,5 l/ha                                                  | -                                                   | 35                             |
|                        | of<br>Bladvlekkenziekte <sup>4</sup> ,<br>echte meeldauw <sup>5</sup> ,<br>DTR <sup>6</sup> , bruine roest <sup>7</sup> ,<br>gele roest <sup>8</sup> | 1,5 l/ha                              | 2                                                  | 3 l/ha                                                    | 21                                                  | 35                             |
| Zomergerst             | Netvlekkenziekte <sup>9</sup> ,<br>bladvlekkenziekte <sup>10</sup> ,<br>dwergroest <sup>11</sup> ,<br>echte meeldauw <sup>5</sup>                    | 1,25 l/ha                             | 2                                                  | 2,5 l/ha                                                  | 21                                                  | 35                             |
| Uien                   | Valse meeldauw <sup>12</sup> ,<br>bladvlekkenziekte <sup>13</sup>                                                                                    | 1-1,25 l/ha**                         | 2                                                  | 2,5 l/ha                                                  | 5                                                   | 14                             |

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

\*\* De dosering is afhankelijk van ziektedruk en weersomstandigheden.

<sup>1</sup> Voetziekte (*Cercospora herpeticoides*/*Oculimacula yallundae*)

<sup>2</sup> Kafjesbruin (*Septoria nodorum*/*Parastagonospora nodorum*)

<sup>3</sup> Aarfusarium (*Fusarium* spp.)

<sup>4</sup> Bladvlekkenziekte (*Septoria tritici*/*Zymoseptoria tritici*)

<sup>5</sup> Echte meeldauw (*Erysiphe graminis*/*Blumeria graminis*)

<sup>6</sup> DTR (*Pyrenophora tritici-repentis*)

<sup>7</sup> Bruine roest (*Puccinia recondita*)

<sup>8</sup> Gele roest (*Puccinia striiformis*)

<sup>9</sup> Netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*)

<sup>10</sup> Bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

<sup>11</sup> Dwergroest (*Puccinia hordei*)

<sup>12</sup> Valse meeldauw (*Peronospora destructor*)

<sup>13</sup> Bladvlekkenziekte (*Botryotinia squamosa*)

Het gebruik in de onbedekte teelt van sjalotten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

| Toepassings-<br>gebied | Werkzaamheid<br>aannemelijk tegen                                 | Dosering*<br>middel per<br>toepassing | Maximaal aantal<br>toepassingen<br>per teeltcyclus | Maximaal aantal<br>liter middel per<br>ha per teeltcyclus | Minimum interval<br>tussen toepassingen<br>in dagen | Veiligheidstermijn<br>in dagen waarop<br>toegepast mag worden |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Sjalotten              | Valse meeldauw <sup>12</sup> ,<br>bladvlekkenziekte <sup>13</sup> | 1-1,25 l/ha**                         | 2                                                  | 2,5 l/ha                                                  | 5                                                   | 14                                                            |

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

\*\* De dosering is afhankelijk van ziektedruk en weersomstandigheden

<sup>12</sup> Valse meeldauw (*Peronospora destructor*)

<sup>13</sup> Bladvlekkenziekte (*Botryotinia squamosa*)

### Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van sjalotten uitsluitend toepassen met machinaal voortbewogen apparatuur.

In de teelt van granen het middel toepassen vanaf tweede knoop ten minste 2 cm boven de eerste knoop (BBCH 32)

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van dit middel in de teelt van uien en sjalotten op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruikt gemaakt wordt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot), of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van 300 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot).

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van dit middel in de teelt van wintertarwe, triticale en zomertarwe, met een dosering van 2 x 1,5 L product/ha, op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruikt gemaakt wordt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van 100 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot).

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van dit middel in de teelt van wintergerst en zomergerst op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruikt gemaakt wordt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van 75 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot), of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van 250 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot).

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van dit middel in de teelt van wintertarwe, triticale en zomertarwe, met een dosering van 1 x 1,5 L product/ha, op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruikt gemaakt wordt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van 75 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot), of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van 200 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot).

In verband met mogelijke gewasreactie dient overlap van spuitbanen te worden vermeden.

## Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen prothioconazool en fluoxastrobine. Prothioconazool hoort tot de Demethylation inhibitors (DMI-fungiciden). De Frac code is 3. Fluoxastrobine hoort tot de Quinone outside inhibitors (QoI-fungiciden). De Frac code is 11. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

## AANBEVELINGEN

### Normoverschrijdingen in oppervlaktewater beperken

Al een aantal jaren wordt er in het oppervlaktewater normoverschrijdingen gemeten van de actieve stof fluoxastrobin.

Waterkwaliteit is een steeds bepalende factor in de toelating van middelen in het algemeen. De Nederlandse toelatingsautoriteit heeft aangegeven toelatingen te heroverwegen bij aanhoudende overschrijdingen van de toelatingsnorm. Het is belangrijk om de normoverschrijdingen terug te dringen. Naast het aanhouden van het geldende WG etiket adviseren we aanvullende maatregelen:

- Beperk oppervlakkige afspoeling door micro-dammen rond het perceel;
- Bufferstroken liefst ingezaaid met een bodembedekker;
- Graaf een greppel tot aan de bufferstrook + infiltratie geul;
- Greppels minimaal 1 meter vanaf de sloot; extra organische strook langs watergangen;
- Voorkom erf emissie: zorg dat spuitapparatuur overdekt staat;
- Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking".

### Definitief toepassingsgebieden (DTG)

De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG lijst 2.1 (Ctgb, juni 2015). Wilt u weten onder welke sub- en hoofdgewasgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het betreffende gewas kunt u dit vinden via onze website (<https://agro.bayer.nl/producten/belangrijke-overzichten>).

### Belangrijke informatie voor specifieke gewassen

#### Uien

Fandango dient te worden toegepast in een preventief behandelingsschema. In verband met de kans op gewasreactie dient de eerste behandeling met Fandango plaats te vinden nadat bolvorming (BBCH 41) zichtbaar is geworden. In verband met mogelijke gewasreactie dient overlap van spuitbanen te worden vermeden.

#### Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

#### Voorkomen emissie

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl) voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek – opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer Crop Science zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer Crop Science in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.

Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

ARTIKELNR.: 80877595

Productnaam: Fandango

Toelatingsnummer: 12723N - W6

Aard van het preparaat: emulgeerbaar concentraat

Werkzame stof: prothioconazool & fluoxastrobin

Gehalte: 100 g/l & 100 g/l

**Professioneel gebruik**

de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Fluoxastrobin, Prothioconazool.

**Gevarenaanduidingen**

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H332 Schadelijk bij inademing.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Voorzorgsmaatregelen**

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming.

P305 + P351+ P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk Een arts raadplegen (die eventueel contact kan

opnemen met het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**

P410 Tegen zonlicht beschermen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor afval. Zie STORL

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

**Aanvullende etiketelementen**

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

**Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende originele verpakking.**

**Droog, vorstvrij en achter slot bewaren.**

**Verbod hergebruik verpakking.**

UFI: MEC0-G0JU-C00U-T9JY

**GEVAAR**



**Werkingswijze**

| GROUP | 3 | 11 | FUNGICIDES |
|-------|---|----|------------|
|-------|---|----|------------|



Lege, schone en droge verpakkingen kan bij STORL worden ingeleverd.

**IN GEVAL VAN NOOD:**

Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor  
professionele hulpverleners:  
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum  
(NVIC) +31 (0)88 755 8000  
In overige gevallen Bayer CropScience  
+31 (0)6-553 724 90

NL85841459I



UN 3082

Chargennummer:  
zie elders op de verpakking

® is een geregistreerd  
handelsmerk van de  
Bayer Groep

Bayer CropScience SA-NV  
Postbus 88  
2130 AB Hoofddorp  
Tel. 023-7991095

Bayer