

FlorBac®

BIOLOGISCH INSECTICIDE

WATER DISPERGEERBAAR GRANULAAT

Toelatingsnummer:
15033 N

1 kg

Alleen voor
professioneel gebruik

Voor het gebruik de
bijgevoegde
gebruiksaanwijzing
lezen.



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals wettelijk is
voorgeschreven.



ART.NR.: 8M49283
Productnaam: FlorBac
Toelatingsnummer: 15033 N WZ
Aanpak van het preparaat: Water dispergeerbaar Granulaat
Micro-organismen: Bacillus thuringiensis (subsp. aizawai), strain ABTS-1857
Behalte: 15.000 U/ving (U = International Unit)
Cultuur-aanduidingen
IC178: Insecticide effectieve opspijtelijke
SP1: Ziekteveroorzaker met het product of zijn verpakking geen water veroorzaakt.
Voorzorgsmaatregelen
P201: Bescherming van de afvalkuilveel vermijden.
P280: Droog beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met water wassen.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspülen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P305: Verontreinigde kleding wassen afzonderlijk op aparte te gebruiken.
P307: Inhoudverpakking afbreken naar instructie voor afval. Zie STORL.
Niet alle beschermende kleding na gebruik.
Aanwijzende elementen
E340:1: Volg de gebruiksaanwijzing en geveer voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Andere gevaren: Micro-organismen kunnen eventueel sensibiliserende reacties provoceren.
Opmaak en verpakking: Inhoud alleen toegestaan in onze oorspronkelijke originele verpakking.
Groep, versie en acties die bevoorren.
Verbond hergebruik verpakking: Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt. UFF: 6CD1-SOAH-900X-VIAY

WAARSCHUWING



GROUP 11A INSECTICIDE
Geproduceerd door:



Toelatingshouder:
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
10A rue de la Voie Lactée
69370 Saint Didier au Mont d'Or, France

© FlorBac is een geregistreerd handelsmerk
van Valent BioSciences LLC,
Libertyville, Illinois 60048 USA
List No. A511292-24-03
A50410393/R5

Distributeur:
Bayer CropScience SA-NV
Postbus 88, 2130 AB Hoofddorp
Tel. 023-7118013

NL 10-2023

IN GEVAL VAN NOOD:
Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor
professionele hulpverleners:
Nationaal Vergiftigings Informatie Centrum
(NVIC) +31 (0)88 755 8000
In overige gevallen Bayer CropScience
+31 (0)6-553 724 90

Bayer



Productnaam: FlorBac

Toelatingsnummer: 15033 N - W2

Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar Granulaat

Werkzame stoffen:

Bacillus thuringiensis (specie *aizawa*),

strain ABTS-1857

Gehalte: 15.000 IU/mg (IU = International Unit)

Gevarenaanduidingen

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Voorzorgsmaatregelen

P261 Inademing van stof/spuitnevel vermijden.

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor afval. Zie STORL

Was alle beschermende kleding na gebruik.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Andere gevaren: Micro-organismen kunnen eventueel sensibiliserende reacties provoceren.

Opslag en verwijdering: Verkoop alleen toegestaan in onze oengopenende originele verpakking. Droog, vorstvrij en achter slot bewaren.

Verbod hergebruik verpakking: Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

UF: 6CD1-SOAH-90X-V9AY

GROUP 11A INSECTICIDE

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.

Inademing: In de frisse lucht brengen. Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen. Stachtoffer warm en rustig houden.

Aanraking met de huid: Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.

Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 15 minuten. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Aanraking met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water spoelen en een medisch advies innemen.

Inslukken: Mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschijnselen: Volgende symptomen kunnen optreden: Sensibilisering, Irritatie.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitief lijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgj juni 2015) onder de hierna vermelde toelatingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden



Toepassingsgebied	Werkzame middel gebotef op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassing per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassing in dagen
Wilof (pennteeft)	Rupsen ¹	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Cichorei	Rupsen ¹	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Pluivuchten met uitzondering van peer en kweeper	Rupsen ^{1,2,3,4,5,6,7}	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	10	6
Peer	Rupsen ^{1,2,3,4,5,6,7}	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1,2 kg/ha	10	6
Kweeper	Rupsen ^{1,2,3,4,5,6,7}	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1,2 kg/ha	10	6
Steenruchten (onbedekte teelt)	Rupsen ²	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	10	6
Aardbei (onbedekte teelt)	Rupsen ^{1,7}	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Aardbei (bedekte teelt)	Rupsen ^{1,7}	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	8	5
Bessen (onbedekte teelt)	Rupsen ²	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1,2 kg/ha	8	6
Bessen (bedekte teelt)	Rupsen ²	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1,2 kg/ha	8	5
Druif (onbedekte teelt)	Rupsen ²	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Druif (bedekte teelt)	Rupsen ²	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1,2 kg/ha	8	5
Braam- en framboos-achtigen (Rubus spp.) (onbedekte teelt)	Rupsen ²	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1,2 kg/ha	8	6
Braam- en framboos-achtigen (Rubus spp.) (bedekte teelt)	Rupsen ²	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1,2 kg/ha	8	5
Sla (Lactuca spp.) (onbedekte teelt)	Rupsen ^{1,7,8,9}	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Sla (Lactuca spp.) (bedekte teelt)	Rupsen ^{1,7,8,9}	1 kg/ha	1 kg/ha	8	5
Andijvie (onbedekte teelt)	Rupsen ^{1,7,8,9}	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Andijvie (bedekte teelt)	Rupsen ^{1,7,8,9}	1 kg/ha	1 kg/ha	8	5
Spinaze-achtigen (onbedekte teelt)	Rupsen ^{1,7,8,9}	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Spinaze-achtigen (bedekte teelt)	Rupsen ^{1,7,8,9}	1 kg/ha	1 kg/ha	8	5
Veldslu (onbedekte teelt)	Rupsen ^{1,7,8,9}	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Veldslu (bedekte teelt)	Rupsen ^{1,7,8,9}	1 kg/ha	1 kg/ha	8	5
Rucola (onbedekte teelt)	Rupsen ^{1,7,8,9}	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Rucola (bedekte teelt)	Rupsen ^{1,7,8,9}	1 kg/ha	1 kg/ha	8	5
Lamsoor (onbedekte teelt)	Rupsen ^{1,7,8,9}	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Lamsoor (bedekte teelt)	Rupsen ^{1,7,8,9}	1 kg/ha	1 kg/ha	8	5
Bon met peul (onbedekte teelt)	Rupsen ^{1,8}	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Bon met peul (bedekte teelt)	Rupsen ^{1,8}	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1 kg/ha	8	5
Vuchtingentem (onbedekte teelt)	Rupsen ^{1,8,10}	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Vuchtingentem m.a.w. tomatillo (bedekte teelt)	Rupsen ^{1,8,10}	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	8	5
Koolgewassen (onbedekte teelt)	Rupsen ^{1,7,8,9,11}	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Koolgewassen (bedekte teelt)	Rupsen ^{1,7,8,9,11}	1 kg/ha	1 kg/ha	8	5
Radischachtigen (onbedekte teelt)	Rupsen ²	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Radischachtigen (bedekte teelt)	Rupsen ²	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Koolraap (onbedekte teelt)	Rupsen ²	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Koolraap (bedekte teelt)	Rupsen ²	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Aardpeer (onbedekte teelt)	Rupsen ²	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Japanse aardappel (onbedekte teelt)	Rupsen ²	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Zoete aardappel (onbedekte teelt)	Rupsen ²	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Rode biet (onbedekte teelt)	Rupsen ²	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Knolradic (onbedekte teelt)	Rupsen ²	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Schorsener (onbedekte teelt)	Rupsen ²	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Merikwortel (onbedekte teelt)	Rupsen ²	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Yam (onbedekte teelt)	Rupsen ²	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Zoete aardappel (bedekte teelt)	Rupsen ²	1 kg/ha	1 kg/ha	8	5

toepassingsgebied	Werkzaamheid toetstoft op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bleekselderij (onbedekte teelt)	Rupsen 2	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Bleekselderij (bedekte teelt)	Rupsen 2	1 kg/ha	1 kg/ha	8	5
Kruidenteel (vers of gedroogd) m.u.v. eetbare bloemen (onbedekte teelt)	Rupsen 2	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Kruidenteel (vers of gedroogd) m.u.v. eetbare bloemen (bedekte teelt)	Rupsen 1	1 kg/ha	1 kg/ha	8	5
Bloemstierigewassen (bedekte teelt)	Rupsen 1, 3, 5, 10	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1,2 kg/ha	8	5
Bloemstierigewassen (onbedekte teelt)	Rupsen 1, 3, 5, 10	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Boomkwekerigewassen (bedekte teelt)	Rupsen 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1 kg/ha	8	5
Boomkwekerigewassen (onbedekte teelt)	Rupsen 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Rupsen 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14	1 kg/ha	1 kg/ha	8	5
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Rupsen 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Openbaar groen	Rupsen 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1 kg/ha	8	6
Sierbeplanting	Rupsen 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1 kg/ha	8	6

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

- | | |
|--|--|
| 1 Gamma-uil (<i>Autographa gamma-Plusia</i> spp.) | 9 Groente-uil (<i>Pala oleracea</i>) |
| 2 Wintervlinder (<i>Operoptera brumata</i>) | 10 Turkse mot (<i>Chrysodeixis calcithes</i>) |
| 3 Ringelvlinder (<i>Malacosoma neustria</i>) | 11 Late koolmot (<i>Evergestis forficata</i>) |
| 4 Stippel- of spinemot (<i>Pronomaera-soorten</i>) | 12 Bastaardsatijnvlinder (<i>Euproctis chryorrhoea</i>) |
| 5 Koojarsuil (<i>Orthosia soaria</i>) | 13 Satijnvlinder (<i>Leucania salicis</i>) |
| 6 Fruitmot (<i>Oryza pomonella</i>) | 14 Plakker (<i>Lymnema discolor</i>) |
| 7 Koolmot (<i>Plutella xylostella</i>) | 15 Eikenprocessierups (<i>Thaumetopoea processionea</i>) |
| 8 Koolwitje (<i>Pieris</i> spp.) | 16 Vruuchtbladroller (<i>Adoxophyes orana</i>) |

Het gebruik in de teelt van peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, noten, vijg, kiwi, kiemgroenten, baby leaves, sjalotten, bosuien, knoflook, asperge, kardoen, rabarber, knolvenkel, prei, artisjok, zeeכול, in de veredeling en zaadteelt (bedekte teelt) en in de veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergrassen wifof, cichorei, boekweit, hop en meekrap is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009.

Er zijn voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd.

Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

toepassingsgebied	Werkzaamheid samennamek lingen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Peulvruchten (inclusief lupine)	Rupsen 1, 3	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Oliehoudende zaden	Rupsen 1, 3, 5	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Vezelgewassen	Rupsen 1	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Noten	Rupsen 2	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	8	6

toepassingsgebied	Werkzaamheid samennamek lingen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Vijg (onbedekte teelt)	Rupsen 2	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	8	6
Kiwi (onbedekte teelt)	Rupsen 2	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	8	6
Kiwi (bedekte teelt)	Rupsen 2	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1,5 kg/ha	8	5
Kiemgroenten (bedekte teelt) m.u.v. tuinkers en ruoclokers	Rupsen 1, 3, 4, 5	1 kg/ha	1 kg/ha	8	5
Baby leaves (onbedekte teelt)	Rupsen 1, 3, 4, 5	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Baby leaves (bedekte teelt)	Rupsen 1, 3, 4, 5	1 kg/ha	1 kg/ha	8	5
Sjalotten	Rupsen 14	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Bosuien (onbedekte teelt)	Rupsen 14	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Bosuien (bedekte teelt)	Rupsen 14	1 kg/ha	1 kg/ha	8	5
Knoflook	Rupsen 14	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Asperge (onbedekte teelt)	Rupsen 1, 3	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Asperge (bedekte teelt)	Rupsen 1, 3	1 kg/ha	1 kg/ha	8	5
Kardoen (onbedekte teelt)	Rupsen 3, 5, 6	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Rabarber (onbedekte teelt)	Rupsen 1, 3, 5	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Rabarber (bedekte teelt)	Rupsen 1, 3, 5	1 kg/ha	1 kg/ha	8	5
Knolvenkel (onbedekte teelt)	Rupsen 1, 3, 5	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Knolvenkel (bedekte teelt)	Rupsen 1, 3, 5	1 kg/ha	1 kg/ha	8	5
Prei (onbedekte teelt)	Rupsen 1, 3	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Artisjok (onbedekte teelt)	Rupsen 1, 3, 5	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Zeeכול (onbedekte teelt)	Rupsen 1, 3, 5	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)	Rupsen 1, 3, 5	0,1 % (100 gram middel per 100 liter water)	1 kg/ha	8	5
Veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergrassen, wifof, cichorei, boekweit, hop en meekrap (onbedekt)	Rupsen 1, 3, 5	1 kg/ha	1 kg/ha	8	6

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

- | | |
|--|--|
| 1 Gamma-uil (<i>Autographa gamma-Plusia</i> spp.) | 8 Koolwitje (<i>Pieris</i> spp.) |
| 2 Wintervlinder (<i>Operoptera brumata</i>) | 9 Groente-uil (<i>Pala oleracea</i>) |
| 7 Koolmot (<i>Plutella xylostella</i>) | 18 Preimot (<i>Acrolepiopsis assectella</i>) |

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Belangrijk: Bij toepassing tegen rupsen die brandharen vormen (zoals de eikenprocessierups) dient rekening te worden gehouden met "nesten" van rupsen van het voorgaande seizoen. Brandharen uit deze nesten kunnen nog lang actief blijven. Voorkom dat door de toepassing brandharen uit nesten in aangrenzende percelen belanden. Houdt daarom bij de wijze van toepassing en het moment van toepassing

rekening met windrichting en windsnelheid om verspreiding van brandharen naar de omgeving te voorkomen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof *Bacillus thuringiensis* subspecies *aizawai*.

De Irac code is 11A.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentie-management dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

AANBEVELINGEN

Algemeen

FlorBac is een bacteriepreparaat op basis van sporen en kristallen van sporen van *Bacillus thuringiensis* subspecies *aizawai* ter bestrijding van bladetende rupsen van vlinders en motten op diverse gewassen.

Het duurt in het algemeen enige dagen voordat de rupsen dood zijn; een vraatstrop kan echter vrij spoedig intreden.

Van de meeste soorten zijn de jongere rupsen aanmerkelijk gevoeliger dan de oudere. Bij alle toepassingen dient de 1e behandeling dan ook te worden uitgevoerd zodra de jonge rupsen worden waargenomen.

De behandeling indien nodig herhalen. Voor toepassing in buitenteelten in het vroege voorjaar vooral rekening houden met zonnige dagen waarop de zon het gewas verwarmt. Voor het bereiken van een goede bestrijding is het noodzakelijk dat alle plantdelen voldoende met de spuitvloeistof worden bedekt.

FlorBac bestaat volledig uit de stam *Bacillus thuringiensis* subspecies *aizawai* (Bta). Deze stam is uitermate effectief tegen een breed rupsenspectrum die voorkomen in de glastuinbouw en ook in de diverse buitenteelten. In het openbaar groen is FlorBac uitermate effectief gebleken ter bestrijding van de eikenprocessierups. Het brede werkingsspectrum tegen verschillende soorten rupsen van FlorBac is te verklaren uit het feit dat van de bekende *Bacillus thuringiensis* preparaten FlorBac het meest brede toxineprofiel heeft.

Bestuivers en nuttige insecten

FlorBac is zeer veilig voor nuttige insecten en kan uitstekend worden toegepast in geïntegreerde teeltsystemen en in combinatie met nuttigen. FlorBac is veilig voor bijen en hommels en kan derhalve kan zowel voor, tijdens als na de bloei worden toegepast.

TOEGELATEN

Definitielijst toepassingsgebieden (DTG)

De toepassingsgebieden op het etiket volgens de DTG lijst 2.1 (Ctgb, juni 2015). Wilt u weten onder welke sub- en hoofd-gewasgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het betreffende gewas kunt u dit vinden via onze website (<http://agro.bayer.nl/Producten/DTG>).

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur geventileerd is). Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen

Voorkomen emissie

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer Crop Science zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer Crop Science in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht