

Twoja moc zwalczania chwastów

Nowe możliwości zwalczania chwastów

- // Skuteczne rozwiązanie na miotłę i chwasty dwuliścienne
- // Ogranicza zachwaszczenie wtórne, utrzymując aktywność przez 2-3 miesiące po zabiegu
- // Gotowy zestaw z długą listą zwalczanych chwastów



Mateno
PROSET



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

HERBICYD

ROŚLINA CHRONIONA

pszenica ozima, pszenżyto ozime,
żyto ozime, jęczmień ozimy

SUBSTANCJA AKTYWNA

aklonifen (związek z grupy
difenylloeterów) – 500 g/l (40,98%)
– HRAC 32

diflufenikan (związek z grupy
fenoksynikotynoanilidów)
– 100 g/l (8,0%) – HRAC
12 (dawniej F1)

ZWALCZANE CHWASTY

Dawka 0,7 l/ha:

chwasty wrażliwe:

fiotek polny, gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa, mak polny,
maruna bezwonna, miotła
zbożowa, niezapominajka polna,
przetacznik perski, przetacznik
polny, przytulia czepna, samosiewy
rzepaku, tasznik pospolity,
tobołki polne, chaber bławatek

chwasty średniowrażliwe:

wiechlina roczna

TERMIN STOSOWANIA

od fazy gdy z pochwłki
liściowej wydostaje się pierwszy
liść do fazy trzeciego liścia
(BBCH 10-13). **Najlepsze
rezultaty osiąga się wykonując
zabieg w fazie 1 liścia zbóż.**

DAWKA

0,35-0,7 l/ha

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

150-200 l/ha

Twoja moc zwalczania chwastów

Stosując jesienią herbicydy w zbożach oczekujemy pewności i długo-
trwałości działania, aby zminimalizować ryzyko wykonywania wiosną
poprawki. Bazą Mateno PRO SET jest aklonifen, substancja nie
stosowana dotąd w zbożach. Aklonifen blokuje enzym SPS biorący
udział w procesie fotosyntezy. **Jest to jedyny znany herbicyd blokujący
powstawanie chlorofilu o takim mechanizmie działania.**

Dodatkowo aklonifen hamuje biosyntezę karotenoidów. Po zabiegu
tworzy na powierzchni gleby jednolitą powłokę tzw. film herbicydowy.
Dlatego Mateno PRO SET to rozwiązanie, chroniące przez długi czas
zboża przed uciążliwymi chwastami. Najlepszy efekt chwastobójczy
uzyskujemy po zaaplikowaniu Mateno PRO SET na wilgotną glebę, we
wczesnych fazach rozwojowych chwastów, w czasie ich kietkowania lub
krótko po wschodach.

Mateno PRO SET


Pak sprzedażowy

Gotowy zestaw na 7 hektarów:

Mateno Duo 0,7 l/ha + Cofeno 0,7 l/ha

Mateno PRO SET – gotowy zestaw z długą listą zwalczanych chwastów

Zwalczanie chwastów dwuliściennych, średnia z dwóch terminów stosowania,
n=8, BCS Polska, 2024-2025



Mateno PRO SET - zalecany wczesny termin stosowania

Najlepszy efekt działania - gdy chwasty są w fazie siewek tzn. najczęściej w fazie szpilkowania zbóż




Mateno PRO SET to gotowy zestaw, który doskonale sprawdzi się w walce z chwastami uodpornionymi na herbicydy z grupy sulfonilomoczników. Zwalczy miotłę zbożową, chwasty dwuliścienne oraz ograniczy pozostałe chwasty jednoliścienne.

Oba herbicydy wchodzące w skład zestawu uzupełniają się wzajemnie poszerzając spektrum chwastobójcze i stabilizują działanie na niektóre mniej wrażliwe chwasty. Bazując na trzech różnych substancjach o trzech różnych mechanizmach działania zestaw Mateno PRO SET stanowi bardzo mocny element strategii antyodpornościowej. Wszystko po to, by wiosną pola były wolne od chwastów. Głównym zadaniem dla Mateno PRO SET jest zwalczenie miotły zbożowej, w tym tej uodpornionej.

Dzięki Mateno PRO SET, rolnicy uzyskują nowe możliwości zwalczania trudnych do opanowania chwastów jednoliściennych.

Skuteczność na miotłę zbożową, dwa terminy aplikacji, n=3, BCS Polska, 2025



Mateno PRO SET ogranicza zachwaszczenie wtórne, utrzymując aktywność przez 2-3 miesiące po zabiegu.

cofeno[®]

HERBICYD

ROŚLINA CHRONIONA

pszenica ozima

SUBSTANCJA AKTYWNA

prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (78,43%)
- HRAC 15 (dawniej N)

ZWALCZANE CHWASTY

chwasty wrażliwe: ambrozja bylicolistna, gwiazdnica pospolita, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, szarłat szorstki

chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna, komosa biała, przetacznik perski, psianka czarna

TERMIN STOSOWANIA

Stosować po zasiewie od fazy przed wschodami do fazy 3 liści zboża (BBCH 01-13). Nasiona zbóż muszą być przykryte warstwą gleby o grubości 3 cm.

DAWKA

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

200-400 l/ha



Dołącz do Programu
Bayer Kometa

KUPUJESZ

Zyskujesz



Dołącz do
**Bayer
Kometa**

Łatwa
rejestracja
w mniej
niż

2
minuty



Bayer
Kometa

1 pkt = 1 zł

Punkty wymieniaj
na **karty przedpłacone**
lub **produkty Bayer**

Bayer
Kometa

Punkty zebrane w ramach Programu mogą Państwo wymieniać na produkty Bayer lub wykorzystać w ramach kart przedpłaconych w największych sieciach handlowych. Oferujemy również bony turystyczne do wykorzystania w wybranych biurach podróży.