

Posiadacz zezwolenia:

Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Niemcy, tel.: +33 472 854 908

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Bayer Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00, www.agro.bayer.com.pl

DECIS® TRAP CERASI

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

deltametryna (związek z grupy pyretroidów) 0,015 g/pułapkę

Zezwolenie MRiRW nr R – 7/2024 z dnia 15.01.2024

**Uwaga**

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P301 + P330 + P311 – W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P304 + P340 + P311 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

ATRAKTANT i INSEKTYCYD w formie jednorazowej, gotowej do użycia pułapki, przeznaczonej do zwalczania nasionnicy trześniówki. Pułapka Decis Trap Cerasi składa się z podstawowej części zawierającej atraktant specyficzny dla nasionnicy trześniówki i pokrywki impregnowanej insektycydem od wewnętrznej strony. Działanie pułapki opiera się na metodzie „attract and kill”. Po umieszczeniu pułapek na drzewach postacie dorosłe szkodnika są do nich wabione. Wewnątrz pułapek w wyniku kontaktu z insektycydem owady te giną. Pułapka zawiera substancję czynną - deltametryna, związek z grupy pyretroidów (wg klasyfikacji IRAC grupa 3A).

STOSOWANIE ŚRODKA

Pułapki przeznaczone do ręcznego zawieszania na drzewach.

Wiśnia

Nasionnica trześniówka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 pułapek/ha (maksymalnie 1 pułapka na drzewo).

Termin stosowania środka: Pułapki zawiesić na początku pierwszych nalotów szkodnika, w okresie od końca fazy kwitnienia (wszystkie płatki opadły) do fazy, gdy owoce osiągają około 90% typowej wielkości (BBCH 69- 79).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOObszarowych

*Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik*

Czereśnia

Nasionnica trześniówka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 pułapek/ha (maksymalnie 1 pułapka na drzewo).

Termin stosowania środka: Pułapki zawiesić na początku pierwszych nalotów szkodnika, w okresie od końca fazy kwitnienia (wszystkie płatki opadły) do fazy, gdy owoce osiągają około 90% typowej wielkości (BBCH 69- 79).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Pułapki należy zawiesić równomiernie w obrębie sadu. Na obrzeżach większych upraw zaleca się zwiększenie zagęszczenia pułapek, nie przekraczając jednocześnie maksymalnej dopuszczalnej dawki dla jednorazowego zastosowania.

Pułapki powinny być rozwieszane na wysokości od 1,80 do 2,20 m w górnej części korony drzew skierowanej na południe. Pułapkę należy zawiesić pośrodku drzewa pod osłoną liści w taki sposób, aby nie była narażona na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Należy zwrócić uwagę, by otwory w pułapce nie były zablokowane przez liście.

Czas trwania ochrony wynosi 150 dni.

Aby osiągnąć wystarczającą ochronę przed nasionnicą trześniówką przez cały sezon, stosowanie pułapek Decis Trap Cerasi powinno stanowić tylko część przyjętego programu ochrony sadu, w którym przewidziane są również zabiegi środkami owadobójczymi zarejestrowanymi do zwalczania tego szkodnika.

Po zakończeniu sezonu wegetacyjnego pułapki należy zdjąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Strategia zarządzania odpornością:

Pułapka zawiera substancję czynną deltametryna, związek z grupy pyretroidów (wg klasyfikacji IRAC grupa 3A – substancje działające na układ nerwowy owada – modulatory kanałów sodowych). W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności szkodnika w przyjętym programie ochrony należy uwzględnić stosowanie środków owadobójczych, zawierających substancje czynne z innych grup wg klasyfikacji IRAC, o odmiennym mechanizmie działania.

OKRESY KARENCJI

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Niewymagany

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą (kombinezon) w trakcie wieszania pułapek.

Pułapki są gotowe do użycia, nie wymagają dodatkowego montażu przed ich zawieszeniem w uprawie.

Aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z deltametryną lub atraktantem, nie należy otwierać pułapek ani saszetek z atraktantem.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): **nie dotyczy**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

– w oryginalnych opakowaniach,

– w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,

– w temperaturze 0°C-40°C,

Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu wyposażonym w wentylację ogólną.

Chronić przed mrozem.

Chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

POSTĘPOWANIE Z PUSTYMI OPAKOWANIAM

Puste opakowania i zużyte pułapki należy zwrócić do punktów zbiórki odpadów przeznaczonych do tego celu. Puste opakowanie nie może być ponownie użyte do innych celów.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody lub wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku połknięcia wypłukać usta; nie wywoływać wymiotów

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -