

Posiadacz zezwolenia:

M2i Biocontrol S.A.S., 112 Bureaux de la Colline 1 Rue Royale 92210 Saint Cloud, Republika Francuska, tel.: +33 5 32 09 68 85, e-mail: contact@m2i-biocontrol.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00, www.agro.bayer.com.pl

VYNYTY TUTA PRESS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Substancja czynna: feromony motyli o łańcuchach prostych (octan (E,Z,Z)-3,8,11-tetradekatrien-1-ylu + octan (E,Z)-3,8-tetradekatrien-1-ylu) – 31 g/kg (3,10%)

Zezwolenie MRiRW nr R-114/2024 z dnia 5.09.2024 r.

H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

OPIS DZIAŁANIA

Środek ochrony roślin w formie produktu wytwarzającego pary (VP), który zawiera substancje czynne (feromony) uwalniane w sposób ciągły. Środek jest przeznaczony do wabienia i dezorientacji samców motyla skośnika pomidorowego, utrudniając tym samym kojarzenie się osobników, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia występowania szkodnika.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek gotowy do użycia, przeznaczony do stosowania punktowego. Produkt umieszcza się na obojętnym podłożu (np. kołkach, łańcuchach lub drutach) w szklarni, za pomocą urządzenia do aplikacji na sprężone powietrze, w taki sposób, aby nie było bezpośredniego kontaktu środka z roślinnością.

Pomidor, bakłażan (oberżyna), papryka (w uprawie szklarniowej oraz w uprawie pod osłonami)

Skośnik pomidorowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha - jeden punkt aplikacyjny (2,00 g) na 15 m² powierzchni.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,5 kg /ha - jeden punkt aplikacyjny (1,33-2,00 g) na 15 m² powierzchni.

Termin stosowania: Środek stosować od momentu rozpoczęcia zakładania plantacji (sadzenia roślin) do fazy pełnej dojrzałości rośliny uprawnej, gdy owoce mają typową barwę (BBCH 89). Stosowanie środka należy rozpocząć wraz z początkiem pierwszego nalotu motyli (osobników dorosłych szkodnika).

Wykonać od 1 do 4 zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy).

Odstęp między zabiegami: 90-120 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cyklu uprawy): 4

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Pojedyncze punkty aplikacji należy rozmieścić równomiernie na obszarze zastosowania (bez bezpośredniego kontaktu z roślinnością). Punkty powinny być równomiernie rozmieszczone w jednym rzędzie i naprzemiennie w kolejnych rzędach. W przypadku szklarni otwartych lub słabo izolowanych zastosować dodatkowe punkty na bocznych ścianach.
2. Substancje wabiące zawarte w środku wydzielają się w ściśle określonej ilości i powodują masowe wabienie samców szkodnika przez okres 3-4 miesięcy.
3. Opakowanie z dyspenserami należy otworzyć bezpośrednio przed użyciem.
4. Unikać zanieczyszczania dyspensera - nie dotykać dyspensera bezpośrednio dłonią (stosować rękawice ochronne – np. nitrylowe).

OKRESY KARENCJI

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (**okres karencji**):
Niewymagany.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą (kombinezon) w trakcie wykonywania zabiegu.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (**okres prewencji**):
Niewymagany.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 4°C – 25°C.

Chronić przed zamarzaniem.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradzić się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Termin ważności: 2 lata

Data produkcji:

Zawartość netto:

Nr partii: