

Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί επίσημη/πρωτότυπη ετικέτα και παρατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.  
Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.

GR91056350A



1,5kg e

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην  
Αγορά Υ.Α.Α.Τ.: 70165 / 16-06-2016

**LAUDIS WG**

**Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)**

Δραστική ουσία: tembotrione 20% β/β

Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: isoxadifen-ethyl 10% β/β

Βοηθ. ουσίες: 68,53% β/β

**Εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο**

**GROUP 27 HERBICIDE**

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Bayer Ελλάς ABEE, Αηγιολάου 6-8, 151 23 Μαρούσι,

Τηλ.: 210 6166000, [www.cropscience.bayer.gr](http://www.cropscience.bayer.gr)

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



UFI: 0ER3-G0QA-Y002-TT7V

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

## ΛΑΟΥΝΤΙΣ WG

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των τρικετονών για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσπο και στον γλυκό αραβόσπο.

Το tembotrione απορροφάται γρήγορα από τα φύλλα μετά την εφαρμογή με το Laudis WG και μεταφέρεται στα αναπτυσσόμενα μέρη των ζιζανίων. Δρα παρεμποδίζοντας τη δράση του ενζύμου 4-HPPD (αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών) προκαλώντας έντονο μεταχρωματισμό (λεύκανση) των φύλλων των ζιζανίων. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται στα φύλλα 3 με 4 ημέρες μετά την εφαρμογή με το Laudis WG και στη συνέχεια σταδιακά εξαφανίζονται. Τελικά τα ζιζάνια νεκρώνονται μέσα σε 2 εβδομάδες.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Καθολικός ψεκασμός.

### ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:**

**ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ, ΓΛΥΚΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ:** Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε συνδυασμό με 100-200 κ.εκ. Μερο στο στρέμμα. Μεταφυτρωτική εφαρμογή όταν α) ο αραβόσπος είναι στο στάδιο των 2-8 πραγματικών φύλλων και β) όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2 φύλλων έως την έναρξη του αδελφώματος και/ή τα πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4 φύλλων έως την πλήρη έκπτυξη 3 πλάγιων βλαστών. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 10-40 λίτρα/ στρέμμα.

1. **Δόση:** 37,5-50 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 1/--.
2. **Δόση:** 25 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 2/7-14.

### Παρατηρήσεις:

1. **Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 37,5-50 γρ./στρ. ή 2 x 25 γρ./στρ.:** Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*), *Acalypha virginica*, Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus*), Πλαγιαστό βλήτο (*Amaranthus blitoides*), Βλήτα (*Amaranthus* sp.), Αμβροσία (*Ambrosia artemisifolia*),

*Bidens tripartite*, Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Αγριάδα (*Cynodon dactylon*), Τάτουλας (*Datura stramonium*), Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), Λαπάτσα (*Polygonum lapathifolium*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), Αγριοντοματιά ή στύφνος (*Solanum nigrum*), Βέλιουρας από σπόρο (*Sorghum halepense*), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*).

**2. Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 50 γρ./στρ. ή 2 x 25 γρ./στρ.:** Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*), Πάνικο (*Panicum capillare*, *P. dichotomiflorum*).

**3. Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 50 γρ./στρ. ή 2 x 25 γρ./στρ.:** Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Bilderdykia convolvulus*), Σπονδυλωτή σετάρια (*Setaria verticillata*).

**4.** Η δόση του Laudis WG εξαρτάται από την πυκνότητα καθώς και το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Αραβόσποτος, Γλυκός Αραβόσποτος: Μη εφαρμόσιμο.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

- Να μην εφαρμόζεται σε καλαμπόκι που προορίζεται για την παραγωγή σπόρου.
- Το Laudis WG μπορεί να εφαρμόζεται σε ποικιλίες ποπκορν.
- Συστήνεται η εφαρμογή να πραγματοποιείται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα.
- Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

◆ Προφυλάξεις για τις παρακείμενες καλλιέργειες:

- Ψεκάστε σε ήρεμες καιρικές συνθήκες και χωρίς άνεμο. Αποφύγετε την εφαρμογή με υψηλή πίεση του ψεκαστικού μηχανήματος.
- Κατά τον ψεκασμό, πρέπει να αποφύγετε οπωσδήποτε τη διασπορά του προϊόντος σε διπλανές καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε καλλιέργειες ζαχαρότευτλου, μπιζελιού, σόγιας, πατάτας, ηλίανθου και ελαιοκράμβης.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:**

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας του αραβοσίτου, στην ίδια περίοδο μπορούν να σπαρθούν οι κάτωθι καλλιέργειες:

- **Ηλίανθος, μηδική:** μετά από όργωμα και αφήνοντας χρονικό διάστημα 30 ημερών μεταξύ της εφαρμογής του Laudis WG και της νέας σποράς.

• **Αραβόσιπος, ελαιοκράμβη:** χωρίς όργωμα και αφήνοντας χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών μεταξύ της εφαρμογής του Laudis WG και της νέας σποράς.

Δεν μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες: σόργο, φασόλια και σόγια.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:**

Μετά την εφαρμογή του Laudis WG, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες: σιτάρι, κριθάρι, τριπικήλε, μπιζέλια, ελαιοκράμβη, φασόλια, λινάρι, αραβόσιπος, ηλίανθος, σόγια, πατάτα, ζαχαρότευτλα και σόργο.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:**

Να μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή προτού στεγνώσουν εντελώς τα φύλλα. Στην περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεकाσμό φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συστήνεται η χρήση γαντιών.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:**

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:**

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ – ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:** Βλέπε συσκευασία.

## ΠΡΟΣΟΧΗ



UFI: 0ER3-G0QA-Y002-TT7V

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (μάτια, νεφρά, συκώτι) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Περιέχει isoxadifen-ethyl, tembotrione. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Μακριά από παιδιά. • Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. • Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Φοράτε ανθεκτικά υποδήματα κατά την εφαρμογή. • Φοράτε μάσκα με φίλτρο κατά την ανάμιξη/φόρτωση. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς από τη διασπορά και την απορροή του ψεκαστικού υγρού, αφήστε/διατηρήστε μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων στη μονή εφαρμογή ή 10 μέτρων στη διπλή εφαρμογή. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

## ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Γενικά:

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.**

Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν βραχεί με το σκεύασμα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. Εάν τα συμπτώματα αναπτυχθούν και επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Επαφή με το δέρμα:** Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και τα παπούτσια. Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.

**Επαφή με τα μάτια:** Απομακρύνετε τους φακούς επαφής και πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός αναπτυχθεί και επιμένει, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

**Κατάποση:** ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

**Πληροφορίες για το γιατρό:**

**Συμπτώματα:** Προς το παρόν δεν υπάρχουν γνωστά συμπτώματα.

**Θεραπεία:** Συμπτωματική. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Παρ'ολ'αυτά εάν έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα (μεγαλύτερη μιας γουλιάς), χορηγήστε ενεργό (φαρμακευτικό) άνθρακα και θεϊκό νάτριο.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.**

Γραμμή **έκτακτης ανάγκης** Bayer

από σταθερό: **800 1135 353**

από κινητό: **210 6166 332**

24/7

B  
A  
Y  
E  
R  
B  
A  
Y  
E  
R  
E  
R



**Bayer**

Bayer Ελλάς ABEE,  
Αγησιλάου 6-8,  
151 23 Μαρούσι,  
Τηλ.: 210 6166000,  
[www.cropscience.bayer.gr](http://www.cropscience.bayer.gr)

GR91056350A



5 200309 893135 >