



καρπιδίου) έως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 71-81).

Αχλαδιά:
Φουζικλάδιο (*Venturia pyrina*), **Στεμφύλιο** (*Stemphylium vesicarium*), **Ωίδιο** (*Podosphaera leucotricha*), **Βακτηριακό κάψιμο** (*Erwinia amylovora*), **Βακτηρίωση** (*Pseudomonas syringae* pv. *syringae*). Εφαρμογές από το στάδιο του «φρουσκώματος» των σφραγισμένων έως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 51-81).

Δόση:
- 100 γρ./ στρ. για ύψος κόμης 100 εκ. (200 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού) με όγκο ψεκ. υγρού 50 λίτρα/-στρέμμα.
- 200 γρ./ στρ. για ύψος κόμης 200 εκ. (200 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού) με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/-στρέμμα.
- 300 γρ./ στρ. για ύψος κόμης 300 εκ. (200 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού) με όγκο ψεκ. υγρού 150 λίτρα/-στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 3/7-12

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Μηλιά, Αχλαδιά: 28 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Για να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα, μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει fluopyram περισσότερο από 3 φορές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμό στην ποικιλία Golden/ Golden Delicious και στις ποικιλίες που προέρχονται από αυτές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχισίνο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, σε συνθήκες συνήθους αποθήκευσης, στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία μέχρι 40° C.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
Βλέπε συσκευασία.



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετείτε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethylenglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια.
• **Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.**
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.
Πληροφορίες για το γιατρό:
Θεραπεία: Θεραπεία συμπτωματική.
Εάν καταποθεί σημαντική ποσότητα σκευάσματος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη γαστρική απόπλυση εντός των πρώτων 2 ωρών. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού Νατρίου. Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό.
Αντενδείξεις: ατροπίνη

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer 24/7
από σταθερό: **800 1135 353**
από κινητό: **210 6166 332**



Luna Care WG
Εναιωρηματοποιησιμο κόκκοι (WG)
Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
Δραστικές ουσίες: fluopyram 5% β/β, fosetyl-Al 66,6% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 25,41% β/β

Αρ. Αδείας Διάθεσης στην Αγορά
Υ.Α.Α.Τ.: 60871/24.06.2019

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο

με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καλλιέργεια της μηλιάς και της αχλαδιάς.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

GROUP 7 | P₀₇ FUNGICIDES

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:
• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. • Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Κάτοχος της άδειας: Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Bayer Ελλάς ABEE, Αγηολάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000, www.cropscience.bayer.gr



Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί επίσημη/πρωτότυπη ετικέτα και παρατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.



ΠΡΟΣΟΧΗ



WKE0-40TS-1006-CU4K

Bayer
Bayer Ελλάς ABEE
Αγηολάου 6-8, 151 23 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6166000,
www.cropscience.bayer.gr



ΛΟΥΝΑ ΚΕΑΡ WG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καλλιέργεια της μηλιάς και της αχλαδιάς. Το Luna Care WG είναι μίγμα της νέας δραστικής ουσίας fluopyram και του fosetyl-Al. Το fluopyram δρα στην επιφάνεια των φυτικών ιστών και ταυτόχρονα παρουσιάζει διεισδυτική δράση, διαλαματική κίνηση καθώς και ακροπέταλη κίνηση μέσω των αγγείων του ξύλου. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στο ενζυμικό σύμπλοκο της αφυδρογονάσης του ηλεκτροκού οξέος (Succinate Dehydrogenase, SDH, σύμπλοκο II) και έτσι διακόπτει την αναπνοή στα μιτοχόνδρια. Το fluopyram δρα παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη μυκήτων κατά τη βλάστηση και την ανάπτυξη των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση.

Το fosetyl-Al είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο, παρουσιάζει αποπλαστική και συμπλαστική κίνηση και δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση του μύκητα. Ελέγχει αποτελεσματικά διάφορες ασθένειες που οφείλονται σε Φυκομυκήτες, ενώ επιπλέον παρουσιάζει δράση εναντίον αρκετών φυτοπαθογόνων βακτηρίων. Ο συγκεκριμένος τρόπος δράσης του fosetyl-Al επάγει τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών, αποτρέποντας κατ'αυτόν τον τρόπο την εμφάνιση ανθεκτικών στελεχών των μυκήτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ/ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Αμέσως μετά τον ψεκασμό καθαρίστε ενδελεχώς τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκασμού, την αντλία και τα ακροφύσια 3 φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν ο αφρός και τα ίχνη του προϊόντος.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:--
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ --
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ / ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:

Μηλιά (εκτός των ποικιλιών Golden, Golden Delicious και των ποικιλιών που προέρχονται από αυτές):

Ωίδιο (*Podosphaera leucotricha*), **Φουζικλάδιο** (*Venturia inaequalis*), **Βακτηρίωση** (*Pseudomonas syringae* pv. *syringae*). Εφαρμογές από το στάδιο σχηματισμένων καρπών διαμέτρου 10 mm (στάδιο

GR66788888B