

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, respeitar o n.º de aplicações recomendadas com **Luna® SENSATION** ou qualquer produto que contenha QoI's e/ou SDHI's. Em culturas anuais, por ciclo cultural e parcela agrícola, não exceder as 2 aplicações de **Luna® SENSATION** (exceto nas culturas com um máximo de 1 aplicação), nem realizar qualquer tratamento adicional com fluopirame. Para evitar resíduos nas culturas seguintes, não é aconselhável cultivar alho, bambu (rebentos), cardo, espargo, funcho, palmito e/ou ruibarbo, após colheita de culturas tratadas com este produto ou outros produtos com fluopirame. Na mesma parcela agrícola, e por um período de 12 meses, não efetuar nenhum tratamento adicional com **Luna® SENSATION** ou qualquer outro produto à base de fluopirame.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda diluir metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogêneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação respeitando as doses indicadas.

Volume de Calda Recomendado: Amora-silvestre, Framboesa, Mirtilo-azul (=arando-azul), Mirtilo-vermelho (=arando-vermelho), Groselheira, Groselheira-vermelha, Morangueiro (500-1000 L/ha), Beringela, Tomateiro (500-750 L/ha), Agrião (=mastrugo, agrião-mouro), Alfafa e Alfafa-de-cordeiro (=canônicos) (200-800 L/ha), Chicarro, Ervilheira, Faveira, Feijão-Frade, Feijão-de-bico, Lentilha e Tremoceiro (400 L/ha); Viveiros de ornamentais para produção de estacas (500-1000 L/ha).

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

[UFI: GCGO-YOVF-200A-4XYW]

- Nocivo por ingestão. ● Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno. ● Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros. ● Pedir instruções específicas antes da utilização. ● Não respirar a nuvem de pulverização. ● Evitar o contacto durante a gravidez e o aleitamento. ● Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. ● EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. ● Recolher o produto derramado. ● Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. ● Contém trifloxistrobina, 1,2-benzotiazol-3-ona e mistura de 5-dloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona com 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Pode provocar uma reação alérgica. ● Richa de segurança fornecida a pedido. ● Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas. ● Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às águas de superfície, em morangueiro, alfafa, agrião e alfafa-de-cordeiro. ● Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 30 metros em relação às águas de superfície. Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 75% ou 90% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, podendo reduzir a zona não pulverizada respetivamente para 10 ou 5 metros em relação às águas de superfície, em Amora-silvestre, Framboesa, Groselheira, Groselheira-vermelha, Mirtilo-azul e Mirtilo-vermelho. ● Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às águas de superfície ou utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 75% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, em tomateiro e beringela. ● Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às águas de superfície ou utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 75% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto. Se utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 50% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, pode reduzir a zona não pulverizada para 5 metros em relação às águas de superfície, em Chicarro, Ervilheira, Faveira, Feijão-Frade, Feijão-de-bico, Lentilha, Tremoceiro e Viveiros de ornamentais para produção de estacas. ● Arrojear bem as estufas tratadas até à secagem do pulverizado, antes de nelas voltar a entrar. ● Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas. ● O aplicador deverá usar: luvas e vestuário de proteção durante a preparação da calda e aplicação do produto. ● Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas, até à secagem do pulverizado. ● Após o tratamento, lavar bem o material de proteção, tendo especial cuidado em lavar as luvas por dentro.

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef.: 800 250 250.

Mantém em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Ed. 20125



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.



Bayer

PT85415638E



Contém

Suspensão concentrada (SC)
com 250 g/L ou 21,37% (p/p) de fluopirame
e 250 g/L ou 21,37% (p/p) de trifloxistrobina

Fungicida

GRUPO	7	FUNGICIDA
GRUPO	11	FUNGICIDA

Autorização de venda nº 0857 concedida pela DGAV
Lote Nº e Data de produção: impressas na embalagem

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA
O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE
DAS CRIANÇAS

Titular da
Autorização de Venda:
Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Av. Vitor Figueiredo, N.º 4 - 4.º Piso
2790-255 CARNAXIDE
Telef.: 21 417 21 21 | <http://cropsscience.bayer.pt>

O **Luna® SENSATION** é um fungicida sistémico, com ação preventiva e curativa à base de fluopirame e trifloxistrobina. O fluopirame é uma substância ativa inibidora da respiração dos fungos (complexo II), que inibe a sucinato desidrogenase (SDHI) e pertence ao Grupo FRAC - 7. A trifloxistrobina é um fungicida do grupo das estrobilurinas (QoI) que inibe a respiração no complexo III e pertence ao Grupo FRAC - 11.

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Doenças	Dose (Nº. Máx. Aplicações)	Época de Aplicação	I.S.
Agrião, Alfafa e Alfafa-de-cordeiro (=canônicos) (ar livre)	Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> sp.), Podridão cinzenta (<i>Botrytis cinerea</i>) e Rizoctonia (<i>Thanatephorus solani</i>)	0,8 L/ha 1 tratamento por ano	Tratar no aparecimento da infecção, durante o desenvolvimento da parte comestível (BBCH 40-49). Não aplicar em variedades de agrião-de-água.	7 dias
Ervilheira (consumo em fresco (grão ou vagem)) e Outras Leguminosas ⁽¹⁾ (ar livre)	Ascoquita (<i>Ascochyta</i> sp.), Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Oídio (<i>Erysiphe pisi</i>) e Podridão-cinzenta (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,8 L/ha (Realizar no máximo 1 aplicação por ano)	Tratar no aparecimento da infecção, após o período de floração (BBCH 70-89).	Ervilheira: 7 dias Outras Leguminosas (consumo em seco): 21 dias (consumo em fresco): 14 dias
Morangueiro (estufa)	Oídio (<i>Podospaera macularis</i>) e Podridão cinzenta (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,6-0,8 L/ha (Realizar no máximo 2 aplicações , com intervalo mínimo de 7 dias)	Tratar no aparecimento da infecção, desde o início da folhagem até à colheita (BBCH 13-89). Não aplicar quando a planta estiver a mais de 1 metro de altura.	1 dia
Pequenos Frutos Amora-silvestre e framboesa ⁽¹⁾ Mirtilo/arando, groselheira ⁽¹⁾ (ar livre)	Antracnose (<i>Colletotrichum</i> sp.), Oídio (<i>Podospaera mors-uvae</i>) e Podridão cinzenta (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,8 L/ha (Realizar no máximo 1 tratamento por ano)	Tratar no aparecimento da infecção, após o período de floração (BBCH 70-89).	⁽¹⁾ 3 dias ⁽¹⁾ 7 dias
Solanáceas Beringela e tomateiro (estufa)	Podridão cinzenta (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,6 L/ha (Realizar no máximo 2 aplicações , com intervalo mínimo de 10 dias).	Tratar no aparecimento da infecção, a partir das primeiras inflorescências (BBCH 51-89).	3 dias

⁽¹⁾ Chicarro (consumo em seco), faveira (consumo em fresco (grão ou vagem) e consumo em seco), feijão-frade (consumo em seco), feijoeiro (consumo em fresco (vagem; feijão-verde)), grão-de-bico (consumo em seco), lentilha (consumo em seco) e tremoceiro (consumo em seco).

USOS MENORES (UM's)

A eficácia e a fitotoxicidade resultantes destes usos menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.

Cultura	Doenças	Dose (Nº. Máx. Aplicações)	Época de Aplicação	I.S.
Pequenos Frutos Amora-silvestre e framboesa ^(*) ; Groselheira, mirtilo/arando ^(*) (estufa)	Antracnose (<i>Colletotrichum</i> sp.), Oídio (<i>Podospaera mors-uvae</i>) e Podridão cinzenta (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,6-0,8 L/ha (Realizar no máximo 2 aplicações , com intervalo mínimo de 7 dias)	Tratar ao aparecimento da doença, desde o início da folhagem até à maturação dos frutos (BBCH 15-89). Tratar no aparecimento da doença, desde o início da folhagem até à maturação dos frutos (BBCH 13-89).	^(*) 3 dias ^(*) 7 dias

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.