

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!



Сигнална дума: Опасно
UFI: EP80-90G4-K000-NCWW

[®]
ДЕЦИС 100 ЕК
[®]
DECIS 100 ЕС
ИНСЕКТИЦИД

1. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
бул. Цариградско шосе № 115М
сграда D, Партер
1784 София
Тел. 02/424 72 80; e-mail: bcs.bulgaria@bayer.com

2. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО И ЗАПОВЕДТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ –

Разрешение № 01180, Издание 4/18.06.2025 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита и Заповеди № РД 11-526/29.04.2013 г., № РД 11-1836/09.12.2015 г., № РД 11-2609/01.12.2017 г., № РД 11-1210/17.04.2025 г. и № РД 11-1677/30.05.2025, на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

3. ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА ЗА БЪЛГАРИЯ

БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
бул. Цариградско шосе № 115М
сграда D, Партер
1784 София
Тел. 02/424 72 80; e-mail: bcs.bulgaria@bayer.com

4. АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА - Делтаметрин 100 г/л
Общоприето ISO наименование/CAS № /CIPAC №:
Делтаметрин/Deltamethrin - CAS № 52918-63-5; CIPAC № 333

Опасни съставки/CAS №:
Hydrocarbons, C9, aromatics - CAS № 918-668-5
Cyclohexanone - CAS № 108-94-1

5. НЕТО КОЛИЧЕСТВО НА ПРОДУКТА

Бутилка – 0,01; 0,025; 0,05; 0,1; 0,125; 0,25; 0,5 и 1 л
Туба – 5 л

6. НОМЕР НА ПАРТИДАТА И ДАТАТА НА ПРОИЗВОДСТВО – Виж опаковката

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

Основни указания – Преместете пострадалия от опасната зона. Транспортирайте пострадалия в стабилно положение (лежащ настрани). Незабавно свалете замърсеното облекло и го изхвърлете съгласно инструкциите за безопасност.

При вдишване – Преместете пострадалия на чист въздух, на топло и в покой. Незабавно потърсете лекар или се обадете в център по токсикология.

При контакт с кожата – Измийте обилно с течаща вода и сапун, ако имате в наличност – с полиетиленгликол 400, след което да се изплакне с вода. Измиването с топла вода може да увеличи степента на раздразнение/парестезия. Това не е признак на системно отравяне. В случай на кожно раздразнение е препоръчително използването на масла или лосиони, съдържащи витамин Е. Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

При контакт с очите – Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути. Контактните лещи, ако има такива, да се отстранят след първите 5 минути, след това да продължи изплакването на очите. Измиването с топла вода може да увеличи степента на раздразнение/парестезия. Това не е признак на системно отравяне. Поставете успокояващи капки за очи. При необходимост използвайте капки за очи с обезболяващ ефект. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължи.

При поглъщане – Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Не оставяйте пострадалия без наблюдение. Незабавно потърсете лекар или се обадете в център по токсикология.

Полезни за лекаря указания

Симптоми:

Местни: Кожна и очна парестезия, която може да бъде тежка, обикновено преминава в рамките на 24 часа, раздразнение на кожата, очите и лигавиците, кашлица, кихане.

Системни: Неразположение в гръдната област, тахикардия, хипотензия, повдигане, коремна болка, диария, повръщане, замъглено зрение, главоболие, анорексия, сънливост, кома, конвулсии, треперене на крайниците, отпадналост, свръхчувствителност на дихателните пътища, белодробен оток, сърцебиене, мускулна фасцикулация, апатия, замаяност.

Рискове

Този продукт съдържа пиретроид. Отравянето с пиретроид не трябва да се смесва с отравянето с карбаматни или органофосфатни съединения.

Лечение

Системно лечение: Първоначално лечение: Симптоматично.

Да се проследи функцията на дихателната и сърдечната дейност.

В случай на поглъщане на по-голямо количество, да се направи стомашна промивка в рамките на 2 часа от поглъщането. Във всички случаи е препоръчително да се приеме активен въглен и натриев сулфат.

Освободете дихателните пътища.

При нужда подайте кислород или направете изкуствено дишане.

При поява на конвулсии да се даде бензодиазепин (напр. диазепам) по стандартна схема. Ако няма резултат да се даде фенобарбитал.

Противопоказания: Атропин.

Противопоказания: Производни на адреналина.

Няма специфичен антидот.

Възстановяването е спонтанно и без последствия.

При нужда да се направи консултация с Клиника по токсикология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ – тел.: +359 2 915 43 46, +359 2 915 42 33 или се обадете на тел. 112.

8. РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ИЛИ ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ИЗРАЗЕНИ ЧРЕЗ СТАНДАРТНИ ФРАЗИ

H226 Запалими течности и пари.

H302 Вреден при поглъщане.

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H332 Вреден при вдишване.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN066 Повтаряща се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

9. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА ИЛИ НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ

P210	Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено.
P280	Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.
P301+P310	При поглъщане: Незабавно се обадете се в Център по токсикология/ на лекар.
P305+P351	При контакт с очите: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.
+P338	Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P308+P311	При авна или предполагаема експозиция:Обадете се в Център по токсикология/ на лекар.
P331	Не предизвиквайте повръщане.
P391	Съберете разлятото.
P501	Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните наредби.
SP1	Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
SPe3	Да се осигури нетретирана буферна зона от 30 м при овощни и маслинови насаждения, 20 м при лозя и 10 м при зеленчукови и други подобни насаждения до повърхностни води с цел опазване на водните организми, които не са обект на третиране. За да се защитят нецелевите членестоноги, да се осигури нетретирана буферна зона от 10 м от необработваема земя.
SPe8	Опасен за пчелите. Да не се прилага върху култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им. След употреба пчелите трябва да останат в кошерите им за един ден, осигурявайки им храна и вода вътре или кошерите да се отдалечат.

10. ЕКОТОКСИЧНОСТ

Да се вземат всички предпазни мерки да не се допуска попадане на продукта директно или в близост до водоизточници (реки, извори, язовири, езера) и канализационната мрежа. В случай на изпускане в канализацията, повърхностните и подпочвените води или почвата да се уведоми компетентният орган – Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

ДЕЦИС 100 ЕК е опасен за пчели при директно попадане върху тях. Да не се пръска по време на цъфтеж на културите посещавани от пчели. След изсъхване ДЕЦИС 100 ЕК няма токсично последствие върху пчелите.

11. ТИП И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА

ДЕЦИС 100 ЕК е пиретроиден инсектицид, с контактно и стомашно действие, съдържащ активното вещество делтаметрин (IRAC 3A). Притежава много бърз инициален (нокдаун) ефект срещу голям брой смучещи и гризещи неприятел по оранжерийни, зърнени (зърнено-житни, зърнено-бобови), технически, фуражни, зеленчукови, картофи, овощни видове (семкови, костилкови, черупкови) и лозя.

12. ФОРМУЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Емулсионен концентрат - ЕК

13. РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

Култура	За борба срещу	Доза на прилагане мл/дка	Количество работен разтвор на декар – л/дка	Момент на прилагане	Максимален брой приложения за вегетация	Интервал между третиранията
Бадеми, лешници, орехи, кестени	Листна въшка (<i>Hyalopterus spp.</i>), Ябълков плодов червей (<i>Laspeyresia pomonella</i>), Кестенов молец (<i>Laspeyresia splendana</i>)	10,5 – 12,5	100 – 140	При поява на неприятеля	2	14 дни
	Бадемов семеяд (<i>Eurytoma plotnikovi</i>)	12,5	100	В началото на цъфтежа	2	14 дни

Ябълки, круши, дюли, мушмули	Ябълков плодов червей (<i>Laspeyresia pomonella</i>), Ябълкова листна бълха (<i>Psylla mali</i>), Зелена ябълкова листна въшка (<i>Aphis pomi</i>), Живовлекава листна въшка (<i>Dysaphis plantaginea</i>)	7,5 – 12,5	100 – 140	При поява на неприятеля	2	14 дни
	Плодова корогризачка (<i>Adoxophyes orana</i>), Розена листозавивачка (<i>Archips rosanus</i>)	8,75 – 12,25		При поява на неприятеля	2	14 дни
		Обикновена крушова листна бълха (<i>Psylla pyri</i>)	12,25	100	При поява на неприятеля	2
Праскови, нектарини, кайсии, сливи, черешни, вишни	Плодова корогризачка (<i>Adoxophyes orana</i>), Розена листозавивачка (<i>Archips rosanus</i>), Прасковен молец (<i>Anarsia lineatella</i>)	8,75 – 12,25	100 – 140	При поява на неприятеля	1	-
	Черешова муха (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	10 – 17,5				
	Черна златка* (<i>Capnodis tenebrionis</i>)	10 – 17,5	40 – 140	При поява на възрастна форма на неприятеля		
	Средиземноморска плодова муха (<i>Ceratitis capitata</i>)	12,5 – 17,5	100 – 140	При поява на неприятеля		
	Зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), Черешова листна въшка (<i>Myzus cerasi</i>), Прашеста сливова листна въшка (<i>Hyalopterus pruni</i>), Сливов плодов червей (<i>Laspeyresia funebrana</i>)	7,5 – 17,5				
Лозя	Гроздов молец (<i>Lobesia botrana</i>)	12,5 (първо поколение) 12,5 – 17,5 (второ и трето поколение)	100	При поява на неприятеля	3	14 дни
	Еднопоясен гроздов молец (<i>Clysia ambiguella</i>)	12,5 – 17,5		При поява на неприятеля	3	14 дни
	Лозова цикадка (<i>Empoasca spp.</i>)	12,5		При поява на неприятеля	3	14 дни
Ягоди (на открито и оранжерий -ни)	Листни въшки (<i>Aphis spp.</i>)	6,25 – 12,5	50 – 100	При поява на неприятеля	3	14 дни

Кромид, праз, чесън	Тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>), Подгризваща ношенка (<i>Agrotis spp.</i>)	7,5 – 12,5	40 – 50	При поява на неприятеля	3	14 дни
Домат, пипер, патладжан	Памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), Ношенки (<i>Spodoptera spp.</i>), Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), Памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>), Голяма сливова листна въшка (<i>Anuraphis cardui</i>), (<i>Hyperomyzus lactucae</i>)	7,5 – 12,5	60 – 100	При поява на неприятеля	3	7 дни
	Южна зелена смрадлика (миризливка) -щитоносец (<i>Nezara viridula</i>)	4,5 – 7,5		При поява на неприятеля	3	7 дни
	Подгризваща ношенка (<i>Agrotis spp.</i>)	7,5 – 12,5		При поява на неприятеля	3	7 дни
Пипер (оранжерия)	Памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), Малка полска ношенка (<i>Spodoptera spp.</i>), Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), Памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>), Голяма сливова листна въшка (<i>Anuraphis cardui</i>), (<i>Hyperomyzus lactucae</i>)	7,5 – 17,5	60– 140	При поява на неприятеля	4	7 дни
	Южна зелена смрадлика (миризливка) - щитоносец (<i>Nezara viridula</i>)	4,5 – 10,5	60 – 140	При поява на неприятеля	4	7 дни
	Оранжевийна белокрилка (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	10,5 – 17,5	60 – 100	При поява на неприятеля	4	7 дни
Домати, патладжан (оранжерий- ни)	Памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), Ношенки (<i>Spodoptera spp.</i>), Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), Памукова листна въшка	7,5 – 12,5	60 – 100	При поява на неприятеля	4	7 дни

	<i>(Aphis gossypii)</i> , Голяма сливова листна въшка <i>(Anuraphis cardui)</i> , <i>(Hyperomyzus lactucae)</i>					
	Южна зелена смрадливка (миризливка) - щитоносец <i>(Nezara viridula)</i>	4,5 – 10,5	60 – 140	При поява на неприятеля	4	7 дни
Краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини (на открито и в оранжерии)	Памукова ношенка <i>(Helicoverpa armigera)</i> , Ношенки <i>(Spodoptera spp.)</i> , Листни въшки <i>(Aphis spp.)</i> , <i>Hyperomyzus lactucae)</i>	7,5 – 12,5 (на открито) 7,5 – 17,5 (в оранжерия)	60 – 100 60 – 140	При поява на неприятеля	3	7 дни
	Подгризваща ношенка <i>(Agrotis spp.)</i>	7,5 – 12,5	60 – 100	При поява на неприятеля	3	7 дни
Карфиол, броколи	Зелева пеперуда <i>(Pieris spp.)</i> , Зелева ношенка <i>(Mamestra brassicae)</i> , Гамозначна ношенка <i>(Plusia gamma)</i> , Памукова ношенка <i>(Helicoverpa armigera)</i> , Египетска памукова ношенка <i>(Spodoptera littoralis)</i> , Зелена прасковена листна въшка <i>(Myzus persicae)</i> , Зелева листна въшка <i>(Brevicorne brassicae)</i> , Подгризваща ношенка <i>(Agrotis spp.)</i>	7,5 – 12,5	50	При поява на неприятеля	2	14 дни
	Диамантен молец <i>(Plutella xylostella)</i>	12,5		При поява на неприятеля	2	14 дни
Марули	Памукова ношенка <i>(Helicoverpa armigera)</i> , Малка полска ношенка <i>(Spodoptera exiqua)</i> , Сребристоточкова ношенка <i>(Chrysodeixis chalcites)</i> , Листни въшки по салатата <i>(Nasonovia ribis-nigri)</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i> , <i>Aphis spp.)</i>	6,25 – 12,5	50 – 100	При поява на неприятеля	3	7 дни
	Подгризваща ношенка <i>(Agrotis spp.)</i>	7,5 – 12,5	50 – 100	При поява на неприятеля	3	7 дни
Магданоз, целина,	Листни въшки <i>(Aphis spp.)</i> , Малка полска ношенка	8,75	70	При поява на неприятеля	2	14 дни

рукола, цикория	<i>(Spodoptera exiqua),</i> Зелева нощенка <i>(Mamestra spp.),</i> Сребристоточкова нощенка <i>(Chrysodeixis chalcites)</i>					
	Подгризваща нощенка <i>(Agrotis spp.)</i>	7,5 – 12,5		При поява на неприятеля	2	14 дни
Фасул, леща, нахут	Памукова нощенка <i>(Helicoverpa armigera),</i> Зелена прасковена листна въшка <i>(Myzus persicae,</i> <i>Aphis spp.),</i> Подгризваща нощенка <i>(Agrotis spp.)</i>	7,5 – 12,5	50 – 100	При поява на неприятеля	2	14 дни
Грах	Зелена грахова листна въшка <i>(Acyrtosiphon pisum),</i> Грудков хоботник <i>(Sitona spp.)</i>	6,25	100	При поява на неприятеля	2	14 дни
	Черна бобова листна въшка <i>(Aphis fabae),</i> Тъмна грахова листолавачка <i>(Laspeyresia nigricana),</i> Трипс <i>(Thrips angusticeps),</i> Подгризваща нощенка <i>(Agrotis spp.)</i>	7,5 – 12,5		При поява на неприятеля	2	14 дни
Картофи	Колорадски бръмбар <i>(Leptinotarsa</i> <i>deceimlineata)</i>	12,5	60	При поява на неприятеля	3	14 дни
	Египетска нощенка по памука <i>(Spodoptera littoralis)</i>	7,5 – 12,5		При поява на неприятеля	3	14 дни
Памук	Розов червей по памука <i>(Pectinophora</i> <i>gossypiella),</i> Памукова нощенка <i>(Helicoverpa armigera)</i>	12,5 – 17,5	30 – 50	При поява на неприятеля	2	14 дни
	Тютюнева белокрылка <i>(Bemisia tabaci),</i> Южна цикадка <i>(Empoasca spp.)</i>	12,5		При поява на неприятеля	2	14 дни
	Ношенки <i>(Spodoptera spp.),</i> Памукова листна въшка <i>(Aphis gossypii),</i> Подгризваща нощенка <i>(Agrotis spp.)</i>	7,5 – 12,5		При поява на неприятеля	2	14 дни
Тютюн	Тютюнев трипс <i>(Thrips tabaci),</i> Подгризваща нощенка <i>(Agrotis spp.)</i>	7,5 – 12,5	50 – 100	При поява на неприятеля	3	7 дни
Захарно цвекло, кръмно цвекло,	Черна бобова листна въшка <i>(Aphis fabae),</i> Зелена прасковена листна въшка	7,5 – 12,5	50	При поява на неприятеля	1	-

салатно цвекло	(<i>Myzus persicae</i>), Цвеклова муха (<i>Pegomya spp.</i>), Западна цвеклова бълха (<i>Chaetocnema tibialis</i>), Подгризваща нощенка (<i>Agrotis spp.</i>), Полска нощенка (<i>Spodoptera spp.</i>)					
	Цвеклова щитовка (<i>Cassida nebulosa</i>)	12,5		При поява на неприятеля	1	-
Царевича	Царевичен стъблен пробивач (<i>Ostrinia nubilalis</i> , <i>Sesamia nonagrioides</i>), Подгризваща нощенка (<i>Agrotis spp.</i>), Полска нощенка (<i>Spodoptera spp.</i>), Памукова нощенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), Брястова листна въшка (<i>Rhopalosiphum padi</i>), Овесена листна въшка (<i>Sitobion avenae</i>)	7,5 – 12,5	60	При поява на неприятеля	3	14 – 21 дни
	Западен царевичен коренов червей (<i>Diabrotica virgifera</i>)	12,5		При поява на неприятеля	3	7 – 14 дни
Сладка царевича	Светлокрака зелева бълха* (<i>Phyllotreta nemorum</i>)	5	60	При поява на неприятеля	3	14 дни
	Гамозначна нощенка* (<i>Autographa gamma</i>)	7,5	60	При поява на неприятеля	3	14 дни
	Средиземноморски царевичен стъблопробивач* (<i>Sesamia nonagrioides</i>), Цикади* (сем. <i>Cicadellidae</i>), Огневки* (сем. <i>Pyralidae</i>)	12,5	60	При поява на неприятеля	3	14 дни
Пшеница, ечемик, ръж, овес	Брястова листна въшка (<i>Rhopalosiphum padi</i>), Овесена листна въшка (<i>Sitobion avenae</i>), Подгризваща нощенка (<i>Agrotis spp.</i>)	7,5 – 12,5	40 – 60	При поява на неприятеля	1	-
Пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале	Листоминиращи мухи* (сем. <i>Agromyzidae</i>), Галици* (сем. <i>Cecidomyiidae</i>), Цикади* (сем. <i>Cicadellidae</i>)	6,3	10 – 20	При поява на неприятеля	2	14-21 дни
	Голяма жълто-зелена въшка* (<i>Metopolophium dirhodum</i>), Житна листолавачка* (<i>Cnephasia pascuana</i>),	7,5				

	Обикновен житен бегач (<i>Zabrus tenebrioides</i>)					
Маслодай на рапица	Черен рапичен стъблен хоботник* (<i>Ceutorhynchus picipitarsis</i>), Светлокрака зелена бълха* (<i>Phyllotreta nemorum</i>), Рапичен стъблен скритохоботник (<i>Ceutorhynchus napi</i>), Рапична стъблена бълха (<i>Psylliodes chrysocephalus</i>), Рапична листна оса (<i>Athalia rosae</i>), Рапичен цветояд (<i>Meligethes aeneus</i>)	5	10 – 15	При поява на неприятеля	4	14-21 дни
	Зелев молец (<i>Plutella xylostella</i>)*, Листни въшки (сем. <i>Aphididae</i>)	6,3	10– 15	При поява на неприятеля	4	14-21 дни
Люцерна	Грахова листна въшка (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), Детелинов хоботник (<i>Apion pisi</i>), Малък люцернов листов хоботник (<i>Hypera postica</i>)	6,25	40	При поява на неприятеля	2	14 дни
Декоративни растения (на открито и в оранжерии)	Листни въшки (<i>Myzus spp.</i>), Тютюнев трипс (<i>Thrips tabaci</i>)	6,25 – 12,5	50 – 100	При поява на неприятеля	3	7 дни
	Оранжевоядна белокрылка (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	12,3	50 – 100	При поява на неприятеля	3	7 дни
	Листозавивачки (<i>Archips spp.</i> , <i>Adoxophyes spp.</i> , <i>Pandemis spp.</i>)	4,375 – 8,75	70	При поява на неприятеля	3	7 дни

*Минимална култура/ употреба – разрешена по чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Забележка: При разрешените минимални употреби, не е документирана ефикасността и няма извършени наблюдения за негативно въздействие върху културата от употребата на продукта. Отговорността по отношение за липса на ефикасност и проявена фитотоксичност на тези минимални употреби, е на лицето, което употребява продукта.

14. УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА

ДЕЦИС 100 ЕК е контактен инсектицид и хомогенното покритие на третираните части е от решаващо значение за действието на продукта.

ДЕЦИС 100 ЕК е инсектицид от групата на пиретроидите и се разгражда бързо от ултравиолетова светлина и високи температури. Ето защо се препоръчва третирането да се извършва при температури до 25°C. При температури над 25°C, се препоръчва да се третира сутрин или вечер с цел да се избегне прякото слънчево греене.

Неприятелите трябва да са активни, ето защо оптималната температура за третиране е между 20° и 25°C. Да не се надвишава максималния брой от 1 приложение на сезон при костилкови овощни видове.

15. ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОСЛЕДНОТО ТРЕТИРАНЕ И ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА

- Маслодайна рапица – 45 дни;
- Пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, бадеми, лешници, орехи, кестени, захарно цвекло, кръмно цвекло и салатно цвекло, царевича, памук – 30 дни;

- Фасул, леща, нахут – 28 дни;
- Люцерна – 14 дни;
- Ябълки, круши, дюли, мушмули, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, вишни, лозя, кромид, праз, чесън, марули, карфиол, броколи, грах, картофи, тютюн – 7 дни;
- Сладка царевица, ягоди, домати, пипер, патладжан, краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини, магданоз, целина, рукола, цикория – 3 дни.

16. ДАННИ ЗА ВЪЗМОЖНА ФИТОТОКСИЧНОСТ, СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ/СЪСЕДНИ КУЛТУРИ И ДРУГИ ДИРЕКТНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ, ЗАСЯГАЩИ РАСТЕНИЯТА И РАСТИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Не е наблюдаван фитотоксичен ефект или въздействие върху следващи или съседни култури.

17. УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

Носете лични предпазни средства – защитни ръкавици, облекло и обувки по време на смесване и зареждане на продукта. Напълнете резервоара на пръскачката с 2/3 от водата предвидена за третирането според указаното количество в разрешени употреби, добавете продукта като включите уреда за разбъркване. Празните опаковки изплакнете трикратно и излейте разтвора от промивните води в резервоара на пръскачката. Допълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането. Употребете разтвора веднага след приготвянето му.

18. СМЕСИМОСТ

При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на ДЕЦИС 100 ЕК с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

19. МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ ИЛИ РАЗЛИВАНЕ

Предпазни мерки: Избягвайте контакт с разлят продукт или замърсени повърхности. Да се премахнат всички източници на запалване. Носете лични предпазни средства.

Предпазни мерки за опазване на околната среда: Да не се допуска замърсяване на повърхностни води, канализация и подпочвени води.

В случай на изпускане в канализацията, повърхностните и подземните води, почвата да се уведоми компетентният орган – Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Средства за почистване: Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, силикагел, киселинен втвърдител, универсален втвърдител, стърготини). Замърсените подове и обекти да се почистват внимателно, като се спазват разпоредбите за опазване на околната среда. Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

20. МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР

Подходящи пожарогасителни средства: Използвайте воден аерозол, устойчива на алкохол пяна, сух химикал или въглероден диоксид.

Неподходящи пожарогасителни средства: Водна струя под високо налягане.

Особени опасности: Образуват се опасни газове в случай на пожар.

Специални предпазни средства за пожарникарите: В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте дима. В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.

Допълнителна информация: Ограничете разпространението на противопожарните средства, използвани при гасенето на пожара.

Да не се допуска оттичането на гасителните средства, след гасенето на пожара в канали или водоизточници.

21. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЗ

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

Да се употребява само на места с подходяща за целта вентилация.

Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.

Препоръки за предпазване от пожар и експлозия

Пазете от загряване и източници на възпламеняване.

Вземете мерки срещу натрупването на статично електричество.

Парите образуват експлозивна смес с въздуха.

ХИГИЕННИ МЕРКИ СЛЕД РАБОТА С ПРЗ

Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото.

Съхранявайте работното облекло отделно.

Измивайте ръце преди почивките и веднага след работа с продукта.
Отстранете незабавно замърсеното облекло и почистете внимателно, преди да използвате отново.
Облеклата, които не могат да бъдат почистени, трябва да бъдат унищожени (изгорени).

22. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте контейнерите плътно затворени на сухо, хладно и добре проветриво място.

Да се съхранява на места с ограничен достъп.

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

Да не се съхранява на пряка слънчева светлина.

Препоръки при складиране

Да не се съхранява заедно с храни, напитки и фуражи.

Подходящ материал за съхранение

Черна ламарина от нисковъглеродна стомана с вътрешно покритие.

23. БЕЗОПАСНО УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И НА НЕГОВАТА ОПАКОВКА

Остатъци или опаковки от продукти за растителна защита (ПРЗ)

Празните опаковки и контейнери не могат да се използват повторно.

Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци.

Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, празни опаковки и отпадни промивни води заедно с битовите отпадъци. Опаковка за разделно събиране.

ПРЗ или остатъци от него трябва да се третират като опасен отпадък.

Не напълно използваните опаковки, празните опаковки и замърсени контейнери да се третират като опасен отпадък.

Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.).

Класификация на отпадъците от продукта и опаковките в съответствие с Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците, обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014г.:

Код и наименование на отпадъка от продукта – 02.01.08* – агрохимични отпадъци.

Опаковка, код и наименование на отпадъка – 15.01.10* – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

24. СРОК НА ГОДНОСТ - виж опаковката на продукта

25. СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ – Продукт с изтекъл срок на годност не може да бъде пускан на пазара, освен ако се докаже въз основа на анализ в оторизирана лаборатория, че физичните и химичните свойства съвпадат с тези от спецификацията.

26. КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА – втора професионална.

® - Регистрирана търговска марка на Байер

ГРУПА	ЗА	ИНСЕКТИЦИД
-------	----	------------