



GR80232713G



5 L e

Αρ. Άδειας Διάθεσης  
στην Αγορά Υ.Α.Α.Τ.:  
70164/27-06-2016

**Laudis OD**

**Ελαιώδες εναιώρημα (OD)**

Εγ. Σύνθεση: tembotrione 4,4% β/ο  
Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: isoxadifen-ethyl 2,2% β/ο  
Βοηθ. ουσίες: 93,21% β/β

# Εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**  
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**GROUP 27 HERBICIDE**

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση  
στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αηγιολάου 6-8, 151 23 Μαρούσι,  
Τηλ.: 210 6166000, [www.cropscience.bayer.gr](http://www.cropscience.bayer.gr)

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



UF: GVR0-V0ND-S00K-QT2A



**BAYWIN**

Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί  
επίσημη/πρωτότυπη ετικέτα και παρατίθεται  
μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα  
βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.

## ΛΑΟΥΣΤΙΣ ΟΔ

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των τριεκτονών για την μεταφυτρικτική καταπολέμηση αρωματωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο και στον γλυκό αραβόσιτο.

Το tembotriolone απορροφάται γρήγορα από τα φύλλα μετά την εφαρμογή με το Laudis OD και μεταφέρεται στα αναπτυσσόμενα μέρη των ζιζανίων. Δρα παρεμποδίζοντας τη δράση του ενζύμου 4-HPPD (αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών) προκαλώντας έντονο μεταχρωματισμό (λευκάνιση) των φύλλων των ζιζανίων. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται στα φύλλα 3 με 4 ημέρες μετά την εφαρμογή με το Laudis OD και στη συνέχεια σταδιακά εραφανίζονται. Τελικά τα ζιζάνια νεκρώνονται μέσα σε 2 εβδομάδες.

### ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Κραθολικός ψεκασμός.

### ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Φιάλες έως 3 λίτρα πρέπει να ανακινούνται καλά πριν από τη χρήση. Μεγαλύτερες φιάλες/δοχεία πρέπει να αναδένονται επαρκώς πριν από τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίξτε στο ψεκαστικό δοχείο αναδένοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδένοντας πάντα καλά.

### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:**

#### ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ, ΓΛΥΚΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ:

Αρωματωδή και πλατύφυλλα ζιζάνια. Μεταφυτρική εφαρμογή (όταν α) ο αραβόσιτος είναι στο στάδιο των 2-8 πραγματικών φύλλων και β) όταν τα αρωματωδή ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2 φύλλων έως την έναρξη του αδελφώματος και/ή τα πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4 φύλλων έως την πλήρη έκπτυξη 3 πλάγιων βλαστών. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-40 λίτρα/στρέμμα.

**1. Δόση:** 125 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 1/-.

**2. Δόση:** 115 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 2/7-14.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

**1. Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 170-225 κ.εκ./στρ. ή 2 x 115 κ.εκ./στρ:**

Αγριοβαμβάκι (*Abutilon theophrasti*), *Acalypha virginica*, βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus*), Πλαγιάσο βλήτο (*Amaranthus biitoides*), βλήτα (*Amaranthus sp.*), Αμβροσία (*Ambrosia artemisiifolia*), *Bidens tripartite*, Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Αγριδάκι (*Cynodon dactylon*), Τάσουλα (*Datura stramonium*), Αματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Πολυκόμητο (*Polygonum aviculare*), Χαπάτσα (*Polygonum lapathifolium*), Αγριοπερίνα (*Polygonum persicaria*), Αγριο ανάκι (*Snaps arvensis*), Αγριομαμά ή σπόφος (*Solanum nigrum*), Βελιούρα από σπόρο (*Sorghum halepense*), Αγριομελίτζινα (*Xanthium strumarium*)

**2. Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 225 κ.εκ./στρ. ή 2 x 115 κ.εκ./στρ:**

Κατινόχορτο (*Fumaria officinalis*), Πάνικο (*Panicum capillare*, *P. dichotomiflorum*)

**3. Μετρώς ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 225 κ.εκ./στρ. ή 2 x 115 κ.εκ./στρ:**

Αναρχώμενο πολύγωνο (*Bilderdjyia convolvulus*), Σποδυλωτή σετέρια (*Setaria verticillata*)

Η δόση του Laudis OD εξαρτάται από την πυκνότητα καθώς και το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.

### ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αραβόσιτος, Γλυκός Αραβόσιτος: Μη εφαρμοσμένο.

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΩΣΕΩΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

**Να μην εφαρμόζεται σε καλαμπόκι που προορίζεται για την παραγωγή σπόρου.**

**Το Laudis OD μπορεί να εφαρμόζεται σε ποικιλίες ποπκρον**

-Συστήνεται η εφαρμογή να πραγματοποιείται με τραπεζί με κλειστή καμπίνα.  
-Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται επαλήθευση ζιζανιοκτονίας με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή αντίθετης ανθεκτικότητας.

♦ Προφυλάξτε για τις παρακείμενες καλλιέργειες:

-Ψεκάστε σε ήρεμες καιρικές συνθήκες και χωρίς άνεμο. Αποφύγετε την εφαρμογή με υψηλή πίεση του ψεκαστικού μηχανήματος.  
-Κατά τον ψεκασμό, πρέπει να αποφευχθεί οποιοδήποτε της διασπορά του προϊόντος σε διπλάνες καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε καλλιέργειες (αγρότευτο, μπιζέλιου, σόγιας, πατάτας, ηλιανθού και ελαιοκράμβης).

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες για τις συνιστώμενες δόσεις και οδόντες εφαρμογής.  
**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**

Η απόφαση για καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υφικαμίσιον που έχουν καταλήξει έσπλιμα για την ασφαλή καταστροφή του. Τα καλά υλικά σκευασίας ξεπλένονται από πλεόν ή γίνεται τριπλό έσπλιμα (τα νερά του έσπλιματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστροφούν προηγουμένως με οξικόμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

### ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

• **ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:**

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας του αραβόσιτου, στην ίδια περίοδο μπορούν να σπαρθούν οι κάτωθι καλλιέργειες:

-Βαμβάκι και σόρο χωρίς όργωμα ή φασόλια, τσιτάτες και λάχανο μετά από όργωμα και αφήνουν χρονικό διάστημα 14 ημερών μεταξύ της εφαρμογής του Laudis OD και της νέας σποράς.  
-Αραβόσιτος χωρίς όργωμα και αφήνουν χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών μεταξύ της εφαρμογής του Laudis OD και της νέας σποράς.  
-Δεν προτείνεται η σπορά ηλιανθού.

• **ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:**

Μετά την εφαρμογή του Laudis OD, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες:

-Καρότα, μαρούλι, κριθάρι και ελαιόκράμβη: 4 μήνες μετά την εφαρμογή.  
-Μηδική, κρεμμύδι, ραπανάκι και οξαύρα: 5 μήνες μετά την εφαρμογή.  
-Τομάτα και ηλιανθός: 6 μήνες μετά την εφαρμογή.  
-Μπιζέλια και (αγρότευτο): 9 μήνες μετά την εφαρμογή.

• **ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:**

Να μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή προτού στεγνώσουν εντελώς τα φύλλα. Στην περίπτωση επανόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρι παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συστήνεται η χρήση γαντιών.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Στην αρχική εφαρμογή σκευασίας, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια.

Μην αποθηκεύετε το σκεύασμα σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 40°C. Προστατέψτε από τον παγετό.

**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ:** Βλέπε συσκευασία.

## ΠΡΟΣΟΧΗ



### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει tembotrione και isoxadifen-ethyl. • Υπόπνο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Μακριά από παιδιά. • Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. • Αποφύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. • Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα, τα. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να αφήσετε μια ζώνη προστασίας 1 μέτρου με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων 50% μειωμένης διασποράς. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς από τη διασπορά και την απορροή του ψεκαστικού υγρού, αφήστε/διατηρήστε μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων στη μονή εφαρμογή ή 10 μέτρων στη διπλή εφαρμογή. • Φοράτε ανθεκτικά υποδήματα κατά την εφαρμογή.

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά:

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. Μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. **Επαφή με το δέρμα:**

UFE: GVRO-VOND-S00K-QT2A

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

**Επαφή με τα μάτια:** Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή, στην περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται.

**Κατάποση:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Υπάρχει ο κίνδυνος εισόδου του σκευάσματος στους πνεύμονες εάν προκληθεί εμετός μετά από κατάποση. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

**Θεραπεία:** Συμπτωματική. Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Παρόλα αυτά, εάν καταποθεί σημαντική ποσότητα σκευάσματος (μεγαλύτερη μιας γουλιιάς), χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θεϊκό Νάτριο. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.



# Bayer


Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ,  
Αιγυλαίου 6-8,  
151 23 Μαρούσι,  
Τηλ.: 210 6166000,  
www.cropsience.bayer.gr

GR80232713G



Γραμμή **έκτακτης ανάγκης** Bayer  
από σταθερό: **800 1135 353**  
από κινητό: **210 6166 332**

24/7



5 200309 880357 >