



Lobesia Pro Press

VYNYTY®

250g e

Αρ. Άδειας
Διάθεσης στην αγορά:
9104 /12.08.2022

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Δραστική ουσία: (E,Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate 10% β/β
Βοηθητικές Ουσίες: 88,6% β/β

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συμπυκνωμένο
αιώρημα μικροκαψουλών (CS)

ΦΕΡΟΜΟΝΗ

που εφαρμόζεται στα "σημεία διάχυσης"
για παρεμπόδιση της σύζευξης
του εντόμου Ευδεμίδας
(*Lobesia botrana*) στο αμπέλι.



UFI: 538K-17XX-8V1F-4NQP

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • «Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί». • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** • Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή του προϊόντος. • Μη χειρίζεστε άλλους τύπους φερομονών πριν και μετά την εφαρμογή, χωρίς να πλύνετε καλά τα χέρια σας πρώτα. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό. • Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. **Αντιδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: **M2i Biocontrol S.A.S.**
1 rue Royale 112, Bureaux de la Colline, 92213, Saint Cloud Cedex, Γαλλία.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: **M2i GREECE I.K.E.**
Μακρυνείας 11, Τ.Κ. 15343, Αγ. Παρασκευή, Αθήνα
Τηλ.: 210 6084895, 6945 777055, e-mail: ncarasta@hotmail.com.

GR90421004B

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Φερομόνη για παρεμπόδιση της σύζευξης του εντόμου Ευδεμίδας (*Lobesia botrana*) στο αμπέλι. Η φερομόνη προσελκύει τα αρσενικά ακμαία άτομα του εντόμου στόχου παρεμποδίζοντας έτσι τη σύζευξη. Το προϊόν επιδρά μόνο στα αρσενικά ακμαία άτομα και δεν έχει καμία επίδραση στα θηλυκά ακμαία, στα αυγά ή τις προνύμφες. **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Χειροκίνητη εφαρμογή σε «σημεία διάχυσης» όπως για παράδειγμα πασσάλους στήριξης της καλλιέργειας, πρέμνα του αμπελιού, κομμάτια χαρτόνι που είναι διαθέσιμα στο αγροτεμάχιο ή άλλα αδρανή υλικά με την ειδική αντλία που συνοδεύει το προϊόν (Phero-rump). **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Το σκεύασμα είναι ετοιμόχρηστο. **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής χρησιμοποιείτε παγίδες παρακολούθησης πληθυσμού (monitoring). Είναι πολύ σημαντικό να γίνουν οι εφαρμογές πριν αρχίσει η πτήση των ακμαίων της γενιάς που διαχεμαΐζει, δηλαδή με την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμαίων.

Φάσμα δράσης:

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόση σκευάσματος γρ./στρέμμα	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά έτος/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
Αμπέλι VITVI	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i> - POLYBO)	125 ²	Το προϊόν εφαρμόζεται με την έναρξη των πρώτων πτήσεων του εντόμου ¹ .	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) Η συσκευασία των 250 γρ. επιτρέπει την εναπόθεση σε περίπου 100 «σημεία διάχυσης» στο αγροτεμάχιο. Τα συνιστώμενα σημεία διάχυσης είναι 50/στρέμμα. Τα «σημεία διάχυσης» θα πρέπει να κατανέμονται ομοιόμορφα στον αμπελώνα. Στα σύνορα του αγροτεμαχίου συνιστάται τα «σημεία διάχυσης» να είναι διπλάσια ώστε να αυξηθεί η συγκέντρωση της φερομόνης. **2)** Τοποθετήστε στο αγροτεμάχιο φερομονικές παγίδες παρακολούθησης (monitoring) και ελέγχετε κάθε εβδομάδα τις συλλήψεις. **3)** Σε αγρούς με ιστορικό υψηλής πίεσης πληθυσμού ή σε περίπτωση εμφάνισης μη αποδεκτών προσβολών πραγματοποιείτε συμπληρωματικά εφαρμογές με κατάλληλα εντομοκτόνα ή άλλες μεθόδους καταπολέμησης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέλι: -

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Αλλάζετε γάντια όταν έχετε πιάσει προηγούμενες άλλες φερομόνες.

- Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη καλού αποτελέσματος είναι να υπάρχουν χαμηλοί πληθυσμοί εντόμων. Στις περιπτώσεις μεσαίων και μεγάλων πληθυσμών είναι απαραίτητο τα πρώτα χρόνια να γίνει εφαρμογή εγκεκριμένου εντομοκτόνου ειδικά για την καταπολέμηση της πρώτης γενεάς για να μειωθεί η πίεση των εντόμων.

- Γονιμοποιημένα θηλυκά που προέρχονται από γειτονικούς αγρούς μπορεί να προκαλούν ζημιές γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι στους καρπούς για να αποφασιστεί εάν χρειαστεί και επέμβαση με εντομοκτόνο.

- Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε μεγάλα αγροτεμάχια ή όταν χρησιμοποιείται το σκεύασμα σε μεγάλη έκταση. Μπορούν να προστατευθούν ακόμα και μικροί αμπελώνες, όταν βρίσκονται απομονωμένοι και υπάρχει χαμηλός πληθυσμός εντόμων αλλά τότε είναι απαραίτητη αύξηση του αριθμού των σημείων ψεκασμού, για να διατηρηθεί μια επαρκώς υψηλή συγκέντρωση των φερομονών στον αέρα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Οι άδειες ειδικές συσκευές (αντλίες) για την εφαρμογή του προϊόντος μαζί με τα κενά μέσα συσκευασίας δεν πρέπει να απορρίπτονται στο περιβάλλον.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Διατηρείται στην αρχική απαράβιαστη συσκευασία του, σε δροσερό και ξηρό μέρος. Προστατέψτε από τον παγετό. Φυλάξτε το μακριά από τη θερμότητα και την απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συστάσεις και οι πληροφορίες που παρέχουμε είναι αποτέλεσμα εκτεταμένων και αυστηρών μελετών και δοκιμών. Ωστόσο, μπορούν να παρεμβαίνουν παράγοντες που είναι πέρα από τον έλεγχό μας (μέθοδος και χρόνος εφαρμογής, κλιματολογικές συνθήκες κλπ.). Ο παρασκευαστής εγγυάται τη σύνθεση και το περιεχόμενο. Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για τις προκληθείσες ζημιές (έλλειψη αποτελεσματικότητας, διάθεση των κενών συσκευασιών, κ.λπ.) εξαιτίας της πλήρους ή μερικής μη τήρησης των οδηγιών της ετικέτας.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε συσκευασία.

GR90423074A



Bayer



Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί επίσημη/πρωτότυπη ετικέτα και παρατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.