

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití

Luna[®] Sensation

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, jahodníku, peckovin, chmele, zeleniny, drobného bobulovitého ovoce, okrasných rostlin a bylinek proti houbovým chorobám.

PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

Název a množství účinné látky:	fluopyram 250 g/l (cca 22 % hmot.) trifloxystrobin 250 g/l (cca 22 % hmot.)
---------------------------------------	--

Název nebezpečné látky:	trifloxystrobin; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)
--------------------------------	--



Varování

H302	Zdraví škodlivý při požití.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H362	Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P201	Před použitím si obzvláště pozorně přečtěte speciální instrukce.
P263	Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
P264	Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P301+P312	PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P302+P352	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P391	Uniklý produkt seberte.
P501	Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním provozovateli zařízení oprávněného nakládat s nebezpečným odpadem.
EUH401	Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1	Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
OP II. st.	Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody (kromě révy vinné a aplikací ve skleníku).
SPo5	Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.

Držitel povolení/výrobce:	Bayer S.A.S., 74 Rue Gorge de Loup, F-69009 Lyon, Francie
Právní zástupce/dodavatel/osoba odpovědná za konečné balení a označení:	BAYER s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3; Tel.: 266 101 111

[®] je registrovaná ochranná známka společnosti Bayer

Evidenční číslo:	5596-0
UFI:	GCC0-Y0VF-200A-4XYW
2D-kód:	uvedeno na obalu
Číslo šarže:	uvedeno na obalu
Datum výroby formulace:	uvedeno na obalu
Doba použitelnosti:	2 roky od data výroby při správném způsobu skladování v originálních neporušených obalech (teplota skladování +5 až +30 °C)
Množství přípravku v obalu:	HDPE-láhev 1 L HDPE-kanystr 5 L, 10 L

Způsob působení

Luna Sensation obsahuje dvě účinné látky fluopyram a trifloxystrobin s odlišným mechanismem účinku.

Fluopyram je nová širokospektrální systémově působící fungicidní účinná látka. Patří do chemické skupiny benzamidů a účinkuje jako SDH inhibitor. Působí proti klíčení spor, prodlužování klíčného vlákna a růstu mycelia. Inhibuje činnost enzymu sukcinátu dehydrogenasy (SDH-inhibitor) v komplexu II dýchacího řetězce hub. Působí proti širokému spektru houbových chorob. Působí převážně preventivně.

Trifloxystrobin ze skupiny strobilurinů (QoI) a způsob účinku spočívá v blokování transferu elektronů v mitochondriích buněk patogenů. Působí jako inhibitor respirace. Trifloxystrobin je mesosystemický fungicid s převažujícím preventivním působením na povrchu rostlin a částečnou translaminární penetrací do pletiv, kde není dále rozváděn. Je absorbován převážně voskovou vrstvičkou rostlin, na povrchu rostlin se druhotně redistribuuje. Primárně inhibuje klíčení spor, tvorbu a prodlužování houbových vláken a přísavek. Pozdější vývojové fáze hub jako tvorba haustorií, růst a vývoj mycelia a sporulace mohou být v závislosti na houbovém patogenu rovněž k trifloxystrobinu citlivá.

SKUPINA	7	11	FUNGICIDY
---------	---	----	-----------

Návod k použití

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus	Dávkování, mísitelnost	OL (dny)	Poznámka k 1) plodině 2) ŠO 3) OL 4) umístění
jahodník	plíseň šedá, padlí jahodníkové	0,8 l/ha	1	1) BBCH 40-89 4) venkovní prostory
cibulovité a hlíznaté okrasné rostliny	plíseň šedá	0,3 l/ha	AT	1) BBCH 12-89 4) venkovní prostory
mrkev	suchá skvrnitost listů mrkve, padlí miříkovitých, hlízenka obecná	0,5 l/ha	14	1) BBCH 41-49 4) venkovní prostory
broskvoň, meruňka, třešeň, višně, slivoň	moniliová spála, moniliová hniloba	0,5 l/ha (0,167 l/1 m výšky koruny/ha)	7	1) BBCH 55-87

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní;
AT-ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
jahodník	300-600 l/ha	postřik	2x za rok	14 dnů
cibulovité a hlíznaté okrasné rostliny	500-1000 l/ha	postřik	2x za rok	7 dnů
mrkev	200-400 l/ha	postřik	2x	14 dnů
broskvoň, meruňka, třešeň, višně, slivoň	250-1500 l/ha (max. 500 l/1m výšky koruny/ha)	postřik, rosení	2x za rok	7 dnů

Upřesnění použití

Před ošetřením cibulovitých a hlíznatých okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše.

Neaplikujte na tulipány krátce před květem nebo během kvetení.

Antirezistentní strategie

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, fluopyram) ve více než jedné polovině z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě. V peckovinách

neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny SDHI, vícekrát než 3x za vegetační sezónu.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny SDHI, vícekrát než 2x po sobě, poté přerušte sled ošetření přípravkem s odlišným mechanismem působení. Neaplikujte jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí

SPe2	Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod: < 7 m (jahodník); < 40 m (broskvoň, meruňka, třešeň, višeň a slivoň)
-------------	---

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Třída omezení úletu			
	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
jahodník	7	4	4	4
cibulovité a hlízkaté okrasné rostliny, mrkev	4	4	4	4
broskvoň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň	40	35	25	15

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na zdraví lidí

Plodina	Třída omezení úletu			
	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel [m]				
jahodník, okrasné rostliny cibulovité a hlízkaté, mrkev	5	3	3	3
broskvoň, meruňka, třešeň, višeň a slivoň	5	5	5	5

Další omezení

Přípravek lze aplikovat:

- 1) postřikovači polních plodin
- 2) ručně na venkovní plochy (např. postřikovači zádoverymi nebo na vozíku/trakaři)
- 3) postřikovači/rosiči pro keřové a stromové kultury
- 4) skleník – lze aplikovat:
 - ručně (např. postřikovači zádoverymi nebo na vozíku/trakaři)
 - přidáním roztoku do hydroponického roztoku

Při aplikaci se doporučuje použít traktor nebo samojízdný postřikovač s uzavřenou kabinou pro řidiče např. typu 3 (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu a aerosolu.

Při aplikaci na chmelnici a vinici se nedoporučuje použít traktor bez uzavřené kabiny pro řidiče.

Ruční aplikaci na venkovních plochách volte jen v těch případech, kdy aplikace postřikovači se svislým postřikovacím rámem není možná (např. s ohledem na terén).

Ruční aplikace (např. ručními/zádoverymi postřikovači) do peckovin není povolena.

Při ruční aplikaci ve skleníku je třeba použít postřikovací tyč (nástavec) o délce nejméně 0,5 m. Postřik ve skleníku provádějte bez přítomnosti dalších nechráněných osob (tj. osob bez OOPP). Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Zamezte styku přípravku a aplikační kapaliny s kůží. Nevdechujte páry/aerosol.

Po skončení práce ochranný oděv a další OOPP vyperte/očistěte. Kontaminovaný ochranný/pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

Vstup na ošetřený pozemek je možný až druhý den po aplikaci.

Vstup do ošetřených plodin za účelem zelených prací či ruční sklizně je možný až po: 34 dnech (réva vinná) a 15 dnech (aplikace ve skleníku do okrasných rostlin a pivoňek) od aplikace.

Pro vstup do keříčkového ovoce za účelem následných/zelených prací je možný pouze s OOPP (rukavice) a při dodržení ochranné lhůty pro vstup 32 dnů.

Vstup do ošetřeného skleníku je možný až druhý den po aplikaci a po důkladném vyvětrání skleníku.

Práce s přípravkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Příprava aplikační kapaliny

Při přípravě aplikační kapaliny nepoužívejte kontaktní čočky.

Viz dále Další údaje a upřesnění.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků

Viz Další údaje a upřesnění.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Při přípravě, plnění a čištění aplikačního zařízení:	
Ochrana dýchacích orgánů:	není nutná
Ochrana rukou:	vhodné ochranné rukavice s piktogramem ochrana proti pesticidům (ČSN ISO 18889) nebo ochrana proti chemikáliím (ČSN EN ISO 374-1)
Ochrana očí a obličeje:	není nutná
Ochrana těla:	ochranný oděv pro práci s pesticidy typu C3 (ČSN EN ISO 27065) nebo proti chemikáliím typu 4 (ČSN EN 14605+A1)
Dodatečná ochrana hlavy:	není nutná
Dodatečná ochrana nohou:	pracovní/ochranná obuv
Společný údaj k OOPP:	Poškozené OOPP (např. protřžené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

Při aplikaci postřikovačem polních plodin/postřikovači pro keřové a stromové kultury:
Při vlastní aplikaci, když je pracovník dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče typu 3 (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu a aerosolu, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení. Bude-li použit ve vinici při aplikaci traktor bez uzavřené kabiny pro řidiče nebo s nižším stupněm ochrany pak některé OOPP (používané pro ředění – minimálně ochranný oděv) je vhodné používat i během aplikace.

Při aplikaci ve skleníku:	
Ve skleníku je třeba přizpůsobit OOPP použité aplikační technice a výšce plodin, které se ošetřují. Základní OOPP uvedené výše - ochranný oděv, ochranné rukavice a uzavřenou pracovní obuv je třeba doplnit a přizpůsobit aplikační technice použité v daném skleníku a výšce plodin, které se ošetřují např.:	
Ochrana dýchacích orgánů:	vhodný typ filtrační polomasky např. s ventily proti plynům a částicím podle ČSN EN 405+A1
Ochrana těla:	ochranná zástěra proti chemikáliím typu PB4
Dodatečná ochrana hlavy:	kapuce od ochranného oděvu, nepromokavá čepice se štítkem v případě ručního postřiku - ve výšce hlavy nebo směrem nahoru

Informace o první pomoci

Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (např. nevolnost, bolest břicha nebo při podezření na alergickou kožní reakci) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.	
Při nadýchání:	Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
Při zasažení kůže:	Odložte kontaminovaný/nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.
Při zasažení očí:	Vyplachujte oči velkým množstvím vlažné čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
Při náhodném požití:	Vypláchněte ústa vodou. Podejte, pokud možno cca 5-10 tablet rozdrčeného aktivního uhlí a dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem - **Telefon nepřetržitě: (+420) 224 919 293 nebo (+420) 224 915 402 (www.tis-cz.cz)**.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách +5 až +30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku.

Likvidace obalů a zbytků

Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jichy se naředí cca 1:5 vodou a bezzbytku se vystříkají na ošetřeném pozemku; nesmí však zasáhnout zdroje podzemních ani recipienty povrchových vod.

Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jinému účelu!

Prázdné obaly se důkladně (3x) vypláchnou vodou a po znehodnocení se předají provozovateli zařízení oprávněného nakládat s nebezpečným odpadem k odstranění. Poté se obaly spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200-1400 °C ve druhém stupni a čištěním plyných zplodin.

Případné nepoužité zbytky přípravku se rovněž předají provozovateli zařízení oprávněného nakládat s nebezpečným odpadem k odstranění a po smísení s hořlavým materiálem (např. piliny) se spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.

Další údaje a upřesnění

Aplikujte na suchý povrch rostlin. Aplikace při vysokých teplotách nejsou vhodné.

Příprava aplikační kapaliny

Odměřená dávka přípravku se vlije do nádrže aplikačního zařízení předem naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem. Případně se použije předmíchávací zařízení, pokud je jím stroj vybaven. Připravenou aplikační kapalinu je třeba bezodkladně spotřebovat.

Čištění aplikačního zařízení

- 1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (1/4 objemu nádrže postřikovače).
- 2) Vypustěte oplachovou vodu, a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (1/4 objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3 % roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.
- 3) Opakujte postup podle bodu "2" ještě jednou.
- 4) Trysky a sítko musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení oplachování.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2009

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	OL (dny)	Poznámka k 1) plodině 2) ŠO 3) OL 4) umístění 5) dávkování
réva vinná	červená spála révy	0,2 l/ha	14	1) BBCH 15-73 4) venkovní prostory
petržel	alternářiová skvrnitost petržele, padlí miříkovitých, hlízenka obecná	0,5 l/ha	14	1) BBCH 41-49 4) pole
ředkvička, květák, brokolice, kapusta růžičková, zelí hlávkové	alternářiová skvrnitost, padlí brukvovitých, kroužkovitá skvrnitost brukvovitých, fomová hniloba brukvovitých	0,5 l/ha	14	1) BBCH 41-49 4) pole
chmel	padlí chmele	0,27-0,6 l/ha	21	1) BBCH 31-79 4) venkovní prostory
celer řapíkatý, celer listový	padlí	0,6 l/ha	7, 14	1) BBCH 41-49 3) celer řapíkatý: OL=7 dnů; celer listový: OL=14 dnů 4) pole
celer bulvový	padlí	0,5 l/ha	14	1) BBCH 41-49 4) pole
jahodník	bílá skvrnitost listů jahodníku, plíseň šedá, padlí jahodníku, antraknóza jahodníku, fialová skvrnitost listů jahodníku	0,8 l/ha	1	1) BBCH 40-89 4) skleníky
okurka, cuketa, meloun vodní, meloun cukrový, tykev	padlí dýňovitých	0,4 l/ha	3	1) BBCH 51-89 4) skleníky 5) max. 1x
okurka, cuketa, meloun vodní, meloun cukrový, tykev	plíseň šedá, černá hniloba okurek	0,6 l/ha	3	1) BBCH 51-89 4) skleníky
rajče, baklažán, paprika	padlí papriky, padlí rajčete	0,4 l/ha	3	1) BBCH 51-89 4) skleníky
rajče, baklažán, paprika	plíseň šedá	0,6 l/ha	3	1) BBCH 51-89 4) skleníky
maliník, ostružiník	plíseň šedá, didymelové odumírání maliníku, purpurová skvrnitost ostružiníku	0,8 l/ha	7	1) BBCH 40-89 4) venkovní prostory
rybíz, angrešt, josta	plíseň šedá, rez vejmutovková, americké padlí angreštové, antraknóza rybízu	0,8 l/ha	7	1) BBCH 40-89 4) venkovní prostory
brusnice brusinka, borůvka	plíseň šedá, rez vejmutovková, americké padlí angreštové	0,8 l/ha	7	1) BBCH 15-89 4) venkovní prostory
salát	plíseň šedá, hlízenka obecná, hlízenka menší	0,8 l/ha	7	1) BBCH 20-39 4) pole, skleníky
salát	plíseň šedá, rizoktoniová hniloba salátu, sklerotiniová hniloba	0,8 l/ha	7	1) BBCH 13-39 4) pole
chřest	plíseň šedá	0,8 l/ha	AT	1) po sklizni, BBCH 51-97 4) pole
fazol keříčkový	rzivost fazolu, hlízenka obecná	0,8 l/ha	7	1) BBCH 59-69 4) pole

špenát, štěrbák zahradní (endivie)	plíseň šedá	0,8 l/ha	7	1) BBCH 13-39 4) pole
bylinky čerstvé	plíseň šedá, sklerotiniová hniloba, padlí, skvrnitost listů	0,8 l/ha	7	1) BBCH 13-39 4) pole
okrasné rostliny	padlí	0,8 l/ha 500-2000 l vody/ha	AT	1) od BBCH 11, mimo BBCH 40-49 4) venkovní prostory, skleníky
okrasné rostliny do 50 cm	plíseň šedá	0,8 l/ha 500-1000 l vody/ha	AT	1) BBCH 11-59, mimo BBCH 40-49 4) venkovní prostory, skleníky
jiřina, kosatec, cibulovité okrasné rostliny, hlíznaté okrasné rostliny (mimo tulipán, hyacint a narcis)	hlízenka obecná, hlízenka menší	0,8 l/ha	AT	1) BBCH 12-89 4) venkovní prostory, skleníky
pivoňka	plíseň šedá, hlízenka obecná, hlízenka menší	0,8 l/ha	AT	1) BBCH 12-89 4) skleníky

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní;
AT-ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
réva vinná	400-1200 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	14 dnů
salát	200-800 l/ha	postřik	1x (pole) 2x (skleník)	7 dnů
jiřina, kosatec, cibulovité okrasné rostliny, hlíznaté okrasné rostliny	500-1000 l/ha	postřik	1x za rok (venkovní použití) 2x za rok (skleník)	7 dnů
pivoňka	200-800 l/ha	postřik, rosení	2x za rok (skleník)	7 dnů
petržel	200-400 l/ha	postřik	1x	
ředkvička	200-800 l/ha	postřik	2x	14 dnů
květák, brokolice, kapusta růžičková, zelí hlávkové, špenát, štěrbák zahradní (endivie)	200-800 l/ha	postřik	1x	
chmel	800-3300 l/ha	postřik	2x za rok	14 dnů
celer	200-600 l/ha	postřik	1x	
jahodník	300-600 l/ha	hydroponie	2x za rok	7 dnů
okurka, cuketa, meloun vodní, meloun cukrový, tykev	200-800 l/ha	postřik	2x	7 dnů
rajče, baklažán, paprika	500-750 l/ha	postřik	2x	10-14 dnů
maliník, ostružiník, rybíz, angrešt, josta, brusnice brusinka, borůvka	200-800 l/ha	postřik	2x za rok	14 dnů
chřest	300-600 l/ha	postřik	1x za rok	
fazol keříčkový	400-600 l/ha	postřik	2x za rok	7-14 dnů
byliny	400-600 l/ha	postřik	1x za rok	
okrasné rostliny	500-2000 l/ha	postřik	1x za rok	

Skleník je definován Nařízením (ES) č. 1107/2009.

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Třída omezení úletu			
	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
réva vinná	9	6	6	6
salát, jiřina, kosatec, hlíznaté a cibulovité okrasné rostliny, chřest, špenát, endivie, bylinky, okrasné rostliny do 50 cm, fazol	7	4	4	4
petržel, ředkvička, květák, brokolice, kapusta růžičková, zelí hlávkové	4	4	4	4
chmel	35	25	20	12
celer	5	4	4	4
maliník, ostružiník, josta, angrešt, rybíz, brusnice brusinka, borůvka	20	14	8	6
okrasné rostliny 50-150 cm	10	6	6	6
okrasné rostliny nad 150 cm	45	35	25	18
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců a rostlin [m]				
okrasné rostliny nad 150 cm	5	0	0	0

SPe2	Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod: < 45 m (okrasné rostliny nad 150 cm); < 35 m (chmel); < 20 m (maliník, ostružiník, rybíz, angrešt, josta, brusnice brusinka, borůvka); < 10 m (okrasné rostliny 50-150 cm); < 9 m (réva vinná); < 7 m (chřest, špenát, endivie, bylinky, okrasné rostliny do 50 cm, fazol, salát, jiřina, kosatec, hlíznaté a cibulovité okrasné rostliny); < 5 m (celer).
Další omezení	Při použití přípravku ve sklenících nelze vyloučit riziko pro biologickou ochranu na bázi makroorganismů.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí

Plodina	Třída omezení úletu			
	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel [m]				
venkovní prostory a pole	5	3	3	3
réva vinná, chmel	5	5	5	5

Doporučení držitele povolení: Neaplikujte v révě přípravky Luna Sensation nebo jiný obsahující účinnou látku fluopyram (např. Luna Experience, Luna Max) nebo účinnou látku fluopikolid (např. Profiler) vícekrát než 2x za sezónu a v minimálním intervalu mezi aplikacemi 10-14 dnů.

Následné plodiny

Pro fluopyram je stanoven interval v délce 1 roku pro kořenové, hlíznaté a listové plodiny a 120 dnů pro obilniny pěstované jako následné plodiny.

Dodatková informace společnosti Bayer:

Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití.
Přípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v textu etikety anebo nejsou součástí písemných doporučení společnosti Bayer, platných pro aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin.
Společnost Bayer nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či skladováním přípravku.