

## ΜΕΡΟ EC

Επιφανειοδραστικό. Σε συνδυασμό (μίγμα βυτίου) με φυτοπροστατευτικά προϊόντα με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς.

## ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ

Το ΜΕΡΟ EC χρησιμοποιείται ως συνεργό ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων σε στενόφυλλες και πλατύφυλλες καλλιέργειες με τη γενική δοσολογία των 100-200 ml/στρέμμα και σύμφωνα με τις οδηγίες στην αντίστοιχη άδεια διάθεσης στην αγορά του ζιζανιοκτόνου ή του εντομοκτόνου.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Φυλάξτε το μακριά από το απευθείας ηλιακό φως. Το προϊόν αποθηκεύεται στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

## ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: 24 μήνες

Η θερμοκρασία αποθήκευσής του δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 5° C. Θερμοκρασία αποθήκευσης <40° C.

## ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:

Βλέπε συσκευασία.

Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί επίσημη/πρωτότυπη ετικέτα και παρατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.

**Bayer**

Bayer Ελλάς ABEE,  
Αγηαλάου 6-8,  
151 23 Μαρούσι,  
Τηλ.: 210 6166000,  
www.cropscience.bayer.gr



**MERO EC**  
Γαλακτωματοποίηση υγρό (EC)  
Εγγ. σύνθεση: Rapeseed Oil Methyl Ester: 733 g/L

## Συνεργό Ζιζανιοκτόνων - Εντομοκτόνων

σε στενόφυλλες και  
πλατύφυλλες καλλιέργειες

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.  
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

Υπεύθυνος για την  
τελική διάθεση στην αγορά:  
Bayer Ελλάς ABEE, Αγηαλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι,  
Τηλ.: 210 6166000, www.cropscience.bayer.gr

UFI: E660-M0FM-P00N-FG11

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



## ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

**Γενικές υποδείξεις:** Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα αμέσως και πετάξτε τα ασφαλώς. Τοποθετήστε και μεταφέρετε τον ασθενή σε σταθερή θέση (ξεπλυμένο στο πλάι).

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Ειδοποιήστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Τοποθετήστε και μεταφέρετε τον ασθενή σε σταθερή θέση (ξεπλωμένο στο πλάι). Κρατήστε τον ασθενή ζεστό και σε ηρεμία.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε επιμελώς με πολύ νερό και σαπούνι, και εάν υπάρχει, με polyethylene glycol 400 και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, επισκεφθείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά από τα 5 πρώτα λεπτά και συνεχίστε με το πλύσιμο του ματιού. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, επισκεφθείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ειδοποιήστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Ξεπλύνετε το στόμα.

**Συμπτώματα:** Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα.

**Θεραπεία:** Θεραπεία συμπτωματική. Σε περίπτωση κατάποσης, η πλήση στομάχου θα πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις κατάποσης μεγάλης ποσότητας, μόνο εντός των δύο πρώτων ωρών. Παρόλα αυτά, εφαρμογή ενεργού άνθρακα και θειικού νατρίου συστήνεται πάντα. Δεν υπάρχει αντίδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

## ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

## ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer **24/7**  
από σταθερό: **800 1135 353**  
από κινητό: **210 6166 332**

