

## PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Provoca irritação cutânea.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Usar luvas de proteção e vestuário de proteção.

Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de voltar a usar.

Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes às águas de superfície.

**Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Tel.: 800 250 250**

Mantém-se em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Ed. 20520



Atenção



valorfito

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



PT87319598A



# Mero®

Contém  
**1 L**

Concentrado para Emulsão (EC) com 773 g/L ou 81,44% (p/p) de óleo de colza metilado

## Molhante

de uso agrícola para ser adicionado a herbicidas

Autorização Provisória de Venda n.º 4060 concedida pela DGAV

Lote N.º e Data de Produção: impressos na embalagem

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Titular da  
Autorização de Venda:  
Bayer CropScience (Portugal)  
Produtos para a Agricultura, Lda.  
R. Quinta do Pinheiro, 5  
2794-003 CARNAXIDE  
Telef.: 21 417 21 21  
<https://cropscience.bayer.pt>

O **Mero** é um molhante para ser adicionado às caldas dos produtos fitofarmacêuticos herbicidas nas condições de utilização indicadas nos rótulos daqueles produtos.

É recomendado para otimizar o recobrimento e a aderência dos produtos fitofarmacêuticos ao material vegetal a ser protegido. É ideal para a aplicação em culturas ou infestantes difíceis de molhar.

## UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS e CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

O **Mero** só pode ser misturado com produtos fitofarmacêuticos que refiram a sua utilização, devendo seguir-se as condições de utilização e advertências dos mesmos.

**Utilizar a dose de 2 L/ha**, seguindo sempre as indicações do herbicida utilizado.

## PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Não é recomendado o uso de **Mero** em culturas que apresentem stress ou estejam sujeitas a condições meteorológicas adversas. Evitar a aplicação do **Mero** em condições de chuva ou humidade. Respeitar sempre as recomendações indicadas no rótulo do produto herbicida.

## MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

O **Mero** deverá ser adicionado no final da preparação da calda. O equipamento de pulverização deverá ser mantido sob agitação constante e o seu enchimento deverá ser finalizado com água limpa. Se o equipamento de pulverização não estiver equipado com agitador, recomenda-se que o **Mero** seja primeiramente dissolvido em água, antes de ser adicionado.

## MODO DE APLICAÇÃO

O **Mero** é um molhante que apenas pode ser adicionado às caldas dos herbicidas que refiram a sua utilização, nas condições indicadas nos rótulos desses produtos.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar por ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.

Bayer