PANTONE PURPLE C NO IMPRIME

linea puntos indica trazado
linea entera indica troquel

PANTONE 152 | PANTONE 199 | PANTONE BLACK C | PANTONE 347

IMPORTANTE

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN:

1. **Lavar la pulverizadora** para eliminar residuos de herbicidas utilizados previamente.
2. **NUNCA prediluir** o premezclar Roundup ControlMax.
3. **Llenar el tanque** de la mitad a 3/4 partes de su capacidad con agua limpia.
4. **Agregar lentamente** Roundup ControlMax con la bomba y retorno funcionando a un régimen moderado sin tener conectada la conducción de líquidos a los picos.
5. **Completar la capacidad de la pulverizadora** con el volumen de agua restante.

HERBICIDA
Grupo: G

Roundup® CONTROL MAX

Gránulos Solubles

Para el control post-emergente de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha en post-emergencia de variedades de Soja RR, Maíz y Maíz dulce RR, Algodón RR y Alfalfa RR tolerantes al principio activo.

Composición

glifosato (sal monamónica del N-fosfonometil glicina)	79,2 g (*)
Inertes y coadyuvantes c.s.p.	100 g

* Equivalente a glifosato ácido 72% p/p.

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

Inscripto ante el SENASA con el N° 38.105

Lote: Ver envase

Fecha de Vencimiento: Ver envase

INDUSTRIA ARGENTINA

CONTENIDO NETO: 15 kg

NO INFLAMABLE

Fabricado y registrado por:
MONSANTO®

MONSANTO ARGENTINA S.R.L.
MAIPU 1210 8° PISO
C1006ACT – BUENOS AIRES, ARGENTINA
Centro de Atención al Cliente:
0-810-MONSANTO (6667268)
www.monsanto.com.ar

Monsanto, Roundup ControlMax y Roundup Ready Plus son marcas registradas de titularidad de Monsanto Technology LLC

ADVERTENCIA LEGAL
Monsanto Argentina S.R.L. garantiza que la composición de este producto está de acuerdo con lo indicado en esta etiqueta hasta la fecha de vencimiento siempre que el producto sea mantenido en las condiciones de guarda y conservación indicadas en esta etiqueta. Dado que la aplicación del mismo está fuera del control de Monsanto Argentina S.R.L., ésta no se responsabiliza expresa ni implícitamente por los resultados y/o daños y/o perjuicios, directos o indirectos que puedan derivarse del uso diferente en esta etiqueta y/o de la aplicación del producto en violación a la normativa aplicable. Bajo ciertas condiciones pueden surgir biotipos de una maleza que sean resistentes al glifosato u otros grupos de herbicidas. Los biotipos resistentes pueden tornarse dominantes en un lote cuando se refiera un uso inadecuado de dichos grupos de herbicidas. Atento a que la existencia de biotipos resistentes y la falta de efectividad del producto en estos casos resulta difícil de detectar antes de la aplicación del herbicida, Monsanto Argentina S.R.L. no se responsabiliza por ninguna pérdida y/o daño y/o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera resultar de la falla de control por este producto de aquellos biotipos de malezas que hubieran desarrollado una resistencia natural al glifosato.

PRECAUCIONES
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
PELIGRO SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES
Mezclar el producto al aire libre. No pulverizar en días ventosos. Evitar el contacto con la piel y los ojos usando protector facial, antiparras, botas, guantes y ropa apropiada para la manipulación de productos químicos. No comer, fumar o beber durante la manipulación y aplicación del producto. Lavarse las manos cuidadosamente y limpiar el equipo de protección personal luego del contacto con el producto. El equipo de pulverización debe enjuagarse con agua luego de cada aplicación evitando la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.

ALMACENAMIENTO
Mantenga el producto en su envase original, rotulado y bien cerrado, en lugar seco y fresco. No dejar a la intemperie. Las soluciones de **ROUNDUP CONTROLMAX** sólo deben mezclarse, almacenarse o aplicarse en recipientes de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio, plástico o acero recubierto de plástico. No usar recipientes de acero galvanizado dado que las soluciones del producto reaccionan con la superficie de los mismos produciendo gas hidrógeno que puede formar una mezcla de gas que puede inflamarse o explotar ocasionando serias lesiones personales en contacto con una fuente de ignición (chispa, llama abierta, etc.).

Advertencia para el médico: CLASE IV – PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO. Moderado irritante ocular. CUIDADO (Categoría III). Causa irritación moderada a los ojos. Toxicidad Inhalatoria. NOCIVO (Categoría II).

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES-Policlínico Prof. A. Posadas – HAEDO (Buenos Aires)
Tel.: **0800-333-0160 / (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777**
UNIDAD TOXICOLÓGICA DEL HTAL. GRAL DE NIÑOS Dr. Ricardo Gutiérrez (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) Tel.: **(011) 4962-6666 / (011) 4962-2247**
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA UBA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) Tel.: **(011) 5950-8804 / 8806**
CENTRO DE TOXICOLOGÍA TAS - ROSARIO (Santa Fe) - Tel.: **0800-888 TOXICO (8694)**

ATENCIÓN 24 hs. 0800-888-8694 CIMAR

ECOVALUE PLUS TRIPLE LAVADO AMBIENTE

CUIDADO

Cód.: AR 12330608 REV4 07/2020

Recomienda:

ROUNDUP READY PLUS®
SERVICIO INTEGRAL DE MANEJO DE MALEZAS

El servicio que pone a tu disposición las mejores prácticas y recomendaciones, junto a una amplia gama de productos.

Consultá en tu centro de servicios más cercano y asesorate sobre lo que tu campo necesita.

Para mayor información podés ingresar en:
www.roundupreadyplus.com.ar

HERBICIDA

Roundup® CONTROL MAX

CONTENIDO NETO 15kg

INDUSTRIA ARGENTINA

Roundup® CONTROL MAX

Roundup Ready TECNOLOGÍA

Nueva generación de surfactantes

Fórmula más potente y mejorada

Máxima velocidad de control

35 mm | 5 mm | 200 mm | 23.75 mm | 23.75 mm | 410 mm | 23.75 mm | 23.75 mm | 200 mm | 5 mm | 35 mm

10 mm

20 mm

PRECAUCIONES
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
PELIGRO SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES
Mezclar el producto al aire libre. No pulverizar en días ventosos. Evitar el contacto con la piel y los ojos usando protector facial, antiparras, botas, guantes y ropa apropiada para la manipulación de productos químicos. No comer, fumar o beber durante la manipulación y aplicación del producto. Lavarse las manos cuidadosamente y limpiar el equipo de protección personal luego del contacto con el producto. El equipo de pulverización debe enjuagarse con agua luego de cada aplicación evitando la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.

RIESGOS AMBIENTALES
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.
Toxicidad para peces y organismos acuáticos: Ligeramente tóxico.
Se inactiva en contacto con el suelo, quedando fuertemente retenido, lo que hace improbable la contaminación de napas freáticas o cursos de agua. Los microorganismos del suelo lo descomponen en elementos naturales, sin dejar residuos tóxicos. Debido a su baja Presión de vapor no produce vapores. No se acumula en los tejidos animales.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDO DE APLICACIÓN
Los remanentes del producto sin diluir pueden mezclarse con agua al 5 - 10%, y aplicarse sobre alambrados y zonas no cultivadas para eliminar malezas. El remanente de la pulverización puede eliminarse del mismo modo, sin necesidad de dilución.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS
Vaciar completamente la bolsa de polietileno que contiene el producto y enjuagarla por lo menos tres veces. El agua de enjuague debe verterse en la pulverizadora, antes de su aplicación; evitar el contacto del producto con la caja de cartón y finalmente disponerlos de acuerdo a lo especificado en la normativa aplicable.

ALMACENAMIENTO
Mantenga el producto en su envase original, rotulado y bien cerrado, en lugar seco y fresco. No dejar a la intemperie. Las soluciones de **Roundup®ControlMax** sólo deben mezclarse, almacenarse o aplicarse en recipientes de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio, plástico o acero recubierto de plástico. No usar recipientes de acero galvanizado dado que las soluciones del producto reaccionan con la superficie de los mismos produciendo gas hidrógeno que puede formar una mezcla de gas que puede inflamarse o explotar ocasionando serias lesiones personales en contacto con una fuente de ignición (chispa, llama abierta, etc.).

DERRAMES
En caso de derrame del producto sin diluir, barrer y juntar el producto y disponer según el tratamiento de remanentes. En caso de derrame absorber con tierra desmenuzada u otro material absorbente inerte adecuado, recolectar cuidadosamente y disponer el total del material según regulaciones locales. Usar elementos de protección personal. Limpiar el área de derrame evitando la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de salpicaduras en los ojos, enjuagarlos durante 15 minutos con agua limpia. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de ingestión no inducir al vómito, dar de beber grandes cantidades de agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Avise al médico inmediatamente. Aplicar tratamiento sintomático.

Advertencia para el médico: CLASE IV – PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO.
Moderado irritante ocular. CUIDADO (Categoría III). Causa irritación moderada a los ojos.
Toxicidad Inhalatoria. NOCIVO (Categoría II).

Síntomas de Intoxicación Aguda:
Ingestión leve o moderada: Irritación faríngea, vómitos, dolor abdominal y diarrea.
Contacto dermal: Dermatitis. Erupción en la piel.
Contacto ocular: Irritación. Conjuntivitis y queratitis.
Inhalación: Respiración dificultosa, tos y congestión nasal y ocular.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES Policlínico Prof. A. Posadas – HAEDO (Buenos Aires)
Tel.: 0800-333-0160 / (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777
UNIDAD TOXICOLOGICA DEL HTAL. GRAL DE NIÑOS Dr. Ricardo Gutiérrez (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Tel.: (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247
HOSPITAL DE CLINICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA UBA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Tel.: (011) 5950-8804 / 8806
CENTRO DE TOXICOLOGIA TAS - ROSARIO (Santa Fe)
Tel.: 0800-888 TOXICO (8694)

ATENCIÓN 24 HS. LUN A VIE 0800-888-8694 Cacafe

SIGA LAVADO DE ENVASES AMBIENTE AAPROCAMPO CASAFE Cómo

HERBICIDA
Grupo: G

Roundup® CONTROL MAX

Gránulos Solubles (SG)

Para el control post-emergente de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha en post-emergencia de variedades de Soja RR, Maíz y Maíz dulce RR, Algodón RR y Alfalfa RR tolerantes al principio activo

Composición

glifosato (sal monamónica del N-fosfonometil glicina)	79,2 g (*)
Inertes y coadyuvantes c.s.p.	100 g

* Equivalente a glifosato ácido 72% p/p.

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

Inscripto ante el SENASA con el N° 38.105

Lote: Ver envase

Fecha de Vencimiento: Ver envase

INDUSTRIA ARGENTINA

CONTENIDO NETO: 15 kg

NO INFLAMABLE

Fabricado y registrado por:

MONSANTO

MONSANTO ARGENTINA S.R.L.
MAIPU 1210 8° PISO
C1006ACT - BUENOS AIRES, ARGENTINA
Centro de Atención al Cliente:
0-810-MONSANTO (6667268)
www.monsanto.com.ar

Monsanto y Roundup ControlMax son marcas registradas de titularidad de Monsanto Technology LLC .

APLICACIONES DE PRESIEMBRA EN SOJA, MAIZ, GIRASOL
-SIEMBRA CONVENCIONAL: Este tipo de aplicación es recomendable para lotes con altas infestaciones de Sorgo de Alepo, antes de destinarlos a soja de primera, girasol, maíz y otros cultivos; logrando que crezcan libres de malezas. Es conveniente laborear durante el invierno y trabajar con rastra de doble acción al comienzo de la primavera con el objeto de trozar rizomas y uniformar su brotación. Deberá dejarse crecer el Sorgo de Alepo hasta 30-50 cm de altura y luego aplicar 1,25 a 1,5 kg/ha de **Roundup ControlMax.**
-SIEMBRA DIRECTA: El uso de **Roundup ControlMax** es especialmente indicado para el control de las malezas presentes en el rastrojo del cultivo anterior, antes o inmediatamente después de la implantación usando esta técnica. Se recomienda esperar 2 a 3 días después de la cosecha para que las malezas recuperen la capacidad de absorber el herbicida y luego aplicar 1,25 a 1.5 kg/ha de **Roundup ControlMax.**

MALEZAS QUE CONTROLA
Roundup ControlMax controla un gran número de especies, se citan las principales.
Anuales: las malezas anuales son más susceptibles a **Roundup ControlMax** cuando tienen menos de 15 cm de altura, usando una dosis entre 1 y 1.5 kg por hectárea para gramíneas y de 1.25 a 2 kg por hectárea para latifoliadas.

ESPECIES GRAMINEAS		ESPECIES LATIFOLIADAS	
N. Común	**N.Cientifico**	**N. Común**	**N.Cientifico**
Capín/Pasto cañada	*Echinochloa colonum*	Yuyo colorado/Ataco	*Amaranthus spp*
Capín	*Echinochloa crus-galli*	Quinoa	*Chenopodium spp*
Cebadilla criolla	*Bromus unioloides*	Enredadera anual	*Polygonum convolvulus*
Cola de zorro	*Setaria spp*	Ciennudos/Sanguinaria	*Polygonum aviculare*
Pasto cuaresma	*Digitaria spp*	Chamico	*Datura ferox*
		Amor seco/Saetilla	*Bidens pilosa*

Perennes: deben tratarse con una dosis de entre 1.25 a 3 kg/ha, según la especie a controlar.

N. COMUN	N. CIENTIFICO	DOSIS
Sorgo de alepo/Cañota	*Sorghum halepense*	1,25-2 kg/ha
Gramón/Gramilla/Chepica	*Cynodon dactylon*	3 kg/ha
Cebollín/Cipero/Juncea	*Cyperus rotundus*	3 kg/ha
Cipero/Junquillo	*Cyperus sculentus*	3 kg/ha
Camalote/Pasto guinea	*Panicum maximun*	3 kg/ha
Yuyo sapo/Sunchillo	*Wedelia glauca*	3 kg/ha

RESTRICCIONES DE USO
No es establece período de carencia. Uso posicionado.
En el caso del cultivo de alfalfa RR deben transcurrir al menos 5 días entre la última aplicación y el corte del cultivo o el ingreso de los animales.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar un mínimo de 12 hs antes de reingresar al área tratada.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD
Roundup ControlMax es compatible con herbicidas residuales y/o sistémicos formulados como concentrados solubles y/o concentrados emulsionables. Se ha observado un retraso en la actividad en mezclas con productos formulados como suspensiones acuosas, concentrados floables, gránulos dispersables y polvos mojables. En caso de utilizar estas mezclas consultar previamente con un Representante Técnico de Monsanto.
Roundup ControlMax se inactiva rápidamente en contacto con el suelo. Por lo tanto, al no dejar residuos, se puede sembrar cualquier cultivo después de su aplicación. Su baja volatilidad reduce el peligro de dañar plantaciones y sembrados vecinos.
Puede aplicarse también en cultivos implantados, siempre que sean protegidos, evitando el contacto del pulverizado con las partes verdes de las plantas útiles. **Roundup ControlMax** no tiene efecto residual. Para controlar las malezas provenientes de semilla se recomienda complementar el control con una aplicación de herbicidas residuales o selectivos.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s norma/s provinciales y municipales correspondientes

FITOTOXICIDAD
No se han observado casos siguiendo las recomendaciones de este marbete, bajo las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO."
El manejo sustentable de malezas extenderá en el tiempo la eficacia de la plataforma RR2. Diversifique las opciones de control. Combine **Roundup ControlMax** con herbicidas residuales y hormonales en barbecho y/o previo a la siembra, rote herbicidas con diferente mecanismo de acción, aplique la dosis completa recomendada para cada maleza y monitoree los resultados de las aplicaciones. Para más información visite www.roundupreadyplus.com.ar

ADVERTENCIA LEGAL
Monsanto Argentina S.R.L. garantiza que la composición de este producto está de acuerdo con lo indicado en esta etiqueta hasta la fecha de vencimiento siempre que el producto sea mantenido en las condiciones de guarda y conservación indicadas en esta etiqueta. Dado que la aplicación del mismo está fuera del control de Monsanto Argentina S.R.L. ésta no se responsabiliza expresa ni implícitamente por los resultados y/o daños y/o perjuicios, directos o indirectos que puedan derivarse del uso diferente en esta etiqueta y/o de la aplicación del producto en violación a la normativa aplicable. Bajo ciertas condiciones pueden surgir biotipos de una maleza que sean resistentes al glifosato u otros grupos de herbicidas. Los biotipos resistentes pueden tornarse dominantes en un lote cuando se reitera un uso inadecuado de dichos grupos de herbicidas. Atento a que la existencia de biotipos resistentes y la falta de efectividad del producto en estos casos resulta difícil de detectar antes de la aplicación del herbicida, Monsanto Argentina S.R.L. no se responsabiliza por ninguna pérdida y/o daño y/o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera resultar de la falta de control por este producto de aquellos biotipos de malezas que hubieran desarrollado una resistencia natural al glifosato.

COD.: AR 12330607 REV.5 06/2020

RECOMENDACIONES DE USO
GENERALIDADES DEL PRODUCTO:
Roundup®ControlMax es un herbicida selectivo para el control post-emergente de las malezas anuales y perennes en Soja RR, Maíz RR y Algodón RR, cultivos genéticamente modificados, tolerantes al principio glifosato. De acción sistémica, es absorbido por hojas y tallos verdes y traslocado hacia las raíces y órganos vegetativos subterráneos, ocasionando la muerte total de las malezas emergidas. También se puede usar como no selectivo para el control de malezas en áreas agrícolas, industriales, caminos y vías férreas, como lo indica esta etiqueta y debe efectuarse lejos de viviendas, centros poblados y tránsito frecuente.
Los efectos son graduales, sobre todo en las especies perennes, donde después de transcurridos 4-5 días desde la aplicación comienza el amarillamiento y marchitamiento de hojas y tallos que culminan con la muerte total de las malezas.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
PREPARACIÓN
Roundup®ControlMax se presenta formulado como gránulos solubles, debiendo mezclarse con agua limpia para su aplicación como pulverizado. En su formulación se incluye un surfactante, de modo que no es recomendable agregar tensioactivos. Únicamente se recomienda el uso de sulfato de amonio al 2% en el caldo cuando el producto se aplique con aguas duras o salobres. Las aplicaciones pueden realizarse con equipos pulverizadores de mochila y terrestres de arrastre o automotrices, en cobertura total.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACION
APLICACIONES EN COBERTURA TOTAL
-Para aplicaciones con equipos de mochila debe prepararse una solución de 0,500 a 1,0 kg de **Roundup®ControlMax** cada 100 litros de agua limpia, mojando uniformemente el follaje, sin que el producto llegue a gotear.
-Con equipos pulverizadores terrestres debe utilizarse la dosis recomendada, diluida en agua limpia, que podrá ser pulverizada manteniendo una cobertura de 20 a 30 gotas por cm2 de superficie foliar de las malezas. Se recomienda que el diámetro volumétrico medio de las gotas aplicadas esté dentro del rango de 300 a 500 micrones. El tipo de pastilla elegida, la presión de trabajo recomendada, la distancia entre picos del botalón y la velocidad de desplazamiento de la pulverizadora, deberán adecuarse para lograr la aplicación de un volumen total (agua + producto) de 60-100 l/ha. Para preparar la solución de aspersión debe llenarse el depósito con agua hasta la mitad, agregarse la dosis recomendada de Roundup®ControlMax y completarse el llenado. Debido o la alta solubilidad de **Roundup®ControlMax** es suficiente la agitación provista por el sistema de agitación de la pulverizadora.
-Cuando se usan equipos de gota controlada (CDA) se debe preparar una solución con 0,500 kg de **Roundup®ControlMax** + 9.5 litros de agua limpia.

IMPORTANTE:
Después de una aplicación con **Roundup®ControlMax** y en caso de tener que dañar mecánicamente las malezas tratadas (por ejemplo con un corte o picado), es necesario esperar 3 días en el caso de especies anuales y 4 a 5 en el de perennes para asegurar la completa traslocación del herbicida a todos los órganos vegetativos de las plantas.
Los mejores resultados se obtienen cuando la aplicación se realiza sobre malezas en activo crecimiento que no sufran efectos de sequía, enfermedades o cualquier otro factor adverso a su normal desarrollo.
Evitar las aplicaciones sobre malezas cubiertas por tierra.
No pulverizar si se prevén lluvias durante las seis horas posteriores a la aplicación o cuando el follaje de las malezas esté mojado.

APLICACIONES SELECTIVAS DE ROUNDUP CONTROLMAX EN COBERTURA TOTAL:
EN POST-EMERGENCIA DE VARIEDADES DE SOJA ROUNDUP READY (RR), variedades de soja tolerante a glifosato:
Partiendo de una soja RR libre de la competencia de malezas vivas en el momento de la siembra (ya sea convencional o directa), la primera aplicación de **Roundup®ControlMax** en post-emergencia (de cultivo y malezas) se recomienda cuando las malezas alcanzan un máximo de 15 cm de altura o diámetro. En post-emergencia de variedades de soja (RR), y para la generalidad de los casos donde también hubiera malezas perennes emergidas, se recomienda la aplicación de una dosis de 1,1 a 1,3 kg/ha. En caso de especies de malezas más exigentes (ej. gramón, cebollín) la dosis requerida puede ser de 1,6 a 1,8 k/ha. El referido desarrollo de las malezas anuales suele alcanzarse entre los 30 y 40 días después de la siembra del cultivo, cuando la soja RR presenta 3-4 hojas verdaderas.
Debido a que **Roundup®ControlMax** no es un herbicida residual, puede ser necesaria una segunda aplicación para controlar las malezas que emergieran con posterioridad al primer tratamiento.
En este caso se recomienda aplicar entre 0,8 y 1,0 kg/ha de **Roundup®ControlMax** adicional, para completar el control.
Con estas dosis se controlan las malezas anuales, tanto latifolias como gramíneas y también malezas perennes

EN POST-EMERGENCIA DE HIBRIDOS DE MAÍZ Y MAIZ DULCE ROUNDUP READY (RR), híbridos con tolerancia a glifosato:
Partiendo de un maíz o maíz dulce RR libre de la competencia de malezas vivas en el momento de la siembra (ya sea convencional o directa), la primera aplicación de **Roundup®ControlMax** en post- emergencia de cultivo y malezas se recomienda cuando las malezas anuales (gramíneas o latifoliadas) alcanzan un máximo de 15 cm de altura o diámetro, antes de que comience la competencia que puede afectar el rendimiento y estado del maíz 4 hojas (V4). En ese momento, se recomienda la aplicación de una dosis de 1,3 kg/ha. Si las malezas son de mayor tamaño pueden aplicarse hasta 2,6 kg/ha.
En caso de ser necesaria una segunda aplicación para controlar las malezas que emergieran con posterioridad al primer tratamiento, se recomienda aplicar entre 0,8 y 1 kg/ha de **Roundup®ControlMax** adicional, para completar el control Las aplicaciones no deben realizarse después de que el cultivo alcanzó el estado de 8 hojas, ya que podrían producirse daños en el cultivo.

Con estas dosis se controlan las malezas anuales, tanto latifoliadas como gramíneas y también malezas perennes.
Algunos ejemplos:

N. Común	N.Cientifico	N. Común	N.Cientifico
Pasto Cuaresma	*Digitaria sanguinalis*	Capín	*Echinochloa crus galli*
Elusine	*Eleusine indica*		*Echinochloa colonum*
Sorgo de alepo	*Sorghum halepense*	Quinoa	*Chenopodium sp*
Chamico	*Datura ferox*	Abrojo	*Xanthium cavanillesii*
Yuyo colorado	*Amaranthus sp*	Verdolaga	*Portulaca oleácea*
Chinchilla	*Tagetes minuta*	Malva	*Anoda cristata*

EN POST-EMERGENCIA DE VARIEDADES DE ALGODON ROUNDUP READY (RR), variedades de algodón tolerantes a glifosato:
Partiendo de un algodón RR libre de la competencia de malezas vivas en el momento de la siembra (ya sea convencional o directa), se recomienda la aplicación de **Roundup®ControlMax** en post-emergencia (de cultivo y malezas) cuando las malezas alcancen un máximo de **7 cm de altura o diámetro y el algodón tenga hasta 4 hojas totalmente expandidas.**
Entre el período de emergencia y 4 hojas expandidas del algodón podrán realizarse hasta dos aplicaciones de un máximo de 1,4 kg/ha de **Roundup®ControlMax** cada una, con un intervalo entre ambas aplicaciones suficiente para que las plántas de algodón crezcan, como mínimo dos nudos adicionales.
Las aplicaciones no deben realizarse entre el estado de 5 hojas y el estado de 20% de apertura de frutos ya que podrían producirse mermas en el rendimiento.
Podrán realizarse aplicaciones en cobertura total en pre-cosecha en el estado de 20% de apertura de frutos (bochas).
En post-emergencia de variedades de algodón (RR) podrán aplicarse hasta 2,5 kg/ha de **Roundup®ControlMax.**

Dosis sugeridas de control :		Dosis estado vegetativo del algodón	Dosis Precosecha(*) del algodón
N. Común	**N.Cientifico**	**Hasta 4 hojas expandidas**	**20% de apertura de frutos**
Bejuco/Enredadera	*Ipomoea nil*	1,4 kg/ha	2,5 kg/ha
Chamico	*Datura ferox*	1,1 - 1,4 kg/ha	1,4 - 2,5 kg/ha
Chinchilla	*Tagetes minuta*	1,1 - 1,4 kg/ha	1,4 - 2,5 kg/ha
Quinoa	*Chenopodium sp*	1,1 - 1,4 kg/ha	1,4 - 2,5 kg/ha
Verdolaga	*Portulaca oleracea*	1,1 - 1,4 kg/ha	1,4 - 2,5 kg/ha
Yuyo colorado	*Amaranthus sp*	1,1 - 1,4 kg/ha	1,4 - 2,5 kg/ha
Pasto Cuaresma	*Digitaria sanguinalis*	1,1 - 1,4 kg/ha	1,4 - 2,0 kg/ha
Capín	*Echinochloa crus-galli*	1,1 - 1,4 kg/ha	1,4 - 2,0 kg/ha
	Echinochloa colonum	1,1 - 1,4 kg/ha	1,4 - 2,0 kg/ha
Cebollín	*Cyperus rotundus*	1,4 kg/ha	2,5 kg/ha
Gramón	*Cynodon dactylon*	1,4 kg/ha	2,5 kg/ha
Sorgo de Alepo	*Sorghum halepense*	1,1 - 1,4 kg/ha	2,5 kg/ha

(*) Las dosis en pre-cosecha se refieren a malezas adultas de mayor desarrollo.

EN POST-EMERGENCIA DE VARIEDADES ALFALFA ROUNDUP READY (RR), variedades con tolerancia a glifosato:
Partiendo de un cultivo de alfalfa RR libre de la competencia de malezas vivas en el momento de la siembra, la primera aplicación de **Roundup®ControlMax** en post- emergencia de cultivo y malezas se recomienda cuando las malezas anuales (gramíneas o latifoliadas) alcanzan un máximo de 15 cm de altura o diámetro, antes de que comience la competencia que puede afectar el rendimiento y estado de la alfalfa en 4ta hoja trifoliada. En ese momento, se recomienda la aplicación de una dosis de hasta 2,35 kg/ha. En caso de ser necesaria una segunda aplicación para controlar las malezas que emergieran con posterioridad al primer tratamiento, se recomienda aplicar nuevamente hasta 2,35 kg/ha de **Roundup®ControlMax**, para completar el control. Las aplicaciones deben realizarse hasta 5 días antes del corte o ingreso de los animales para pastoreo. Luego del corte podrá realizarse una nueva aplicación de hasta 2,35 kg/ha de **Roundup®ControlMax**, siempre respetando la restricción de al menos 5 días entre la aplicación y el corte del cultivo o ingreso de los animales.

APLICACIONES EN CULTIVOS PERENNES:
-Las aplicaciones en viñedos, yerba mate, té, cítricos, forestales deben realizarse a las dosis requeridas para controlar las malezas presente. En todos los casos debe evitarse que la pulverización alcance hojas, frutos o tallos verdes de las plantas cultivadas, dirigiendo la aplicación a la base del tronco de las plantas de más de tres años o bien protegiendo a las de menos de tres años.
-En caña de azúcar se puede usar guante químico embebido en una solución de **Roundup®ControlMax** al 10%, controlando las malezas sin afectar el cultivo, sea cual fuere su estado de desarrollo.

APLICACIONES EN PRECOSECHA DE TRIGO:
Roundup®ControlMax puede ser aplicado antes de la cosecha de trigo para controlar altas infestaciones de Sorgo de Alepo en lotes destinados al doble cultivo trigo-soja, en siembra convencional o directa. Pueden usarse equipos terrestres o avión, siguiendo las instrucciones detalladas en "Instrucciones para el uso".
-Se recomienda la aplicación de 1.25 a 2 kg/ha de **Roundup®ControlMax** cuando el contenido de humedad del grano de trigo sea igual o menor al 30% y el Sorgo de Alepo esté creciendo activamente y tenga una altura igual o superior a la del trigo. En estas condiciones **Roundup®ControlMax** no alterará el peso de mil granos, ni el poder germinativo de la semilla de trigo, tampoco será afectada la calidad panadera ni habrá residuos que impidan su posterior uso para consumo humano y/o animal.

Taco 50 x 10 mm

CUIDADO

20 mm

10 mm

620 mm | 680 mm

40 mm | 200 mm | 47.5 mm | 410 mm | 47.5 mm | 200 mm | 40 mm

985 mm