

# Twoja moc zwalczania chwastów

## Nowe możliwości zwalczania chwastów

- // Skuteczne rozwiązanie na miotłę i chwasty dwuliścienne
- // Ogranicza zachwaszczenie wtórne, utrzymując aktywność przez 2-3 miesiące po zabiegu
- // Gotowy zestaw z długą listą zwalczanych chwastów



**Mateno®**  
PROSET



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

## HERBICYD

### ROŚLINA CHRONIONA

pszenica ozima, pszenżyto ozime,  
żyto ozime, jęczmień ozimy

### SUBSTANCJA AKTYWNA

aklonifen (związek z grupy  
difeniloeterów) – 500 g/l (40,98%)  
– HRAC 32

diflufenikan (związek z grupy  
fenoksynikotynoanilidów)  
– 100 g/l (8,0%) – HRAC  
12 (dawniej F1)

### ZWALCZANE CHWASTY

#### Dawka 0,7 l/ha:

##### chwasty wrażliwe:

fiotek polny, gwiazdnica pospolita,  
jasnota purpurowa, mak polny,  
maruna bezwonna, miotła  
zbożowa, niezapominajka polna,  
przetacznik perski, przetacznik  
polny, przytulia czepna, samosiewy  
rzepaku, tasznik pospolity,  
tobołki polne, chaber bławatek

##### chwasty średniowrażliwe:

wiechlina roczna

### TERMIN STOSOWANIA

od fazy gdy z pochwłki  
liściowej wydostaje się pierwszy  
liść do fazy trzeciego liścia  
(BBCH 10-13). **Najlepsze  
rezultaty osiąga się wykonując  
zabieg w fazie 1 liścia zbóż.**

### DAWKA

0,35-0,7 l/ha

### ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

150-200 l/ha

# Twoja moc zwalczania chwastów

Stosując jesienią herbicydy w zbożach oczekujemy pewności i długo-  
trwałości działania, aby zminimalizować ryzyko wykonywania wiosną  
poprawki. Bazą Mateno PRO SET jest aklonifen, substancja nie  
stosowana dotąd w zbożach. Aklonifen blokuje enzym SPS biorący  
udział w procesie fotosyntezy. **Jest to jedyny znany herbicyd blokujący  
powstawanie chlorofilu o takim mechanizmie działania.**

Dodatkowo aklonifen hamuje biosyntezę karotenoidów. Po zabiegu  
tworzy na powierzchni gleby jednolitą powłokę tzw. film herbicydowy.  
Dlatego Mateno PRO SET to rozwiązanie, chroniące przez długi czas  
zboża przed uciążliwymi chwastami. Najlepszy efekt chwastobójczy  
uzyskujemy po zaaplikowaniu Mateno PRO SET na wilgotną glebę, we  
wczesnych fazach rozwojowych chwastów, w czasie ich kietkowania lub  
krótko po wschodach.

## Mateno PRO SET


### Pak sprzedażowy

#### Gotowy zestaw na 7 hektarów:

Mateno Duo 0,7 l/ha + Cofeno 0,7 l/ha

### Mateno PRO SET – gotowy zestaw z długą listą zwalczanych chwastów

Zwalczanie chwastów dwuliściennych, średnia z dwóch terminów stosowania,  
n=8, BCS Polska, 2024-2025



\*liczba chwastów na kontroli w szt/m<sup>2</sup>

## Mateno PRO SET - zalecany wczesny stosowania

Najlepszy efekt działania - gdy chwasty są w fazie siewek tzn. najczęściej w fazie szpilkowania zbóż




Mateno PRO SET to gotowy zestaw, który doskonale sprawdzi się w walce z chwastami uodpornionymi na herbicydy z grupy sulfonilomoczników. Zwalczy miotłę zbożową, chwasty dwuliścienne oraz ograniczy pozostałe chwasty jednoliścienne.

Oba herbicydy wchodzące w skład zestawu uzupełniają się wzajemnie poszerzając spektrum chwastobójcze i stabilizują działanie na niektóre mniej wrażliwe chwasty. Bazując na trzech różnych substancjach o trzech różnych mechanizmach działania zestaw Mateno PRO SET stanowi bardzo mocny element strategii antyodpornościowej. Wszystko po to, by wiosną pola były wolne od chwastów. Głównym zadaniem dla Mateno PRO SET jest zwalczenie miotły zbożowej, w tym tej uodpornionej.

**Dzięki Mateno PRO SET, rolnicy uzyskują nowe możliwości zwalczania trudnych do opanowania chwastów jednoliściennych.**

Skuteczność na miotłę zbożową, dwa terminy aplikacji, n=3, BCS Polska, 2025



**Mateno PRO SET ogranicza zachwaszczenie wtórne, utrzymując aktywność przez 2-3 miesiące po zabiegu.**

**cofeno<sup>®</sup>**

### HERBICYD

#### ROŚLINA CHRONIONA

pszenica ozima

#### SUBSTANCJA AKTYWNA

prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (78,43%)  
- HRAC 15 (dawniej N)

#### ZWALCZANE CHWASTY

**chwasty wrażliwe:** ambrozja bylicolistna, gwiazdnica pospolita, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, szarłat szorstki

**chwasty średniowrażliwe:** przytulia czepna, komosa biała, przetacznik perski, psianka czarna

#### TERMIN STOSOWANIA

Stosować po zasiewie od fazy przed wschodami do fazy 3 liści zboża (BBCH 01-13). Nasiona zbóż muszą być przykryte warstwą gleby o grubości 3 cm.

#### DAWKA

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.

#### ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

200-400 l/ha



Dołącz do Programu  
**Bayer Kometa**

**KUPUJESZ**

**Zyskujesz**



Dołącz do  
**Bayer  
Kometa**

**Łatwa**  
rejestracja  
w mniej  
niż

**2**  
minuty



Bayer  
Kometa

**1 pkt = 1 zł**

**Punkty wymieniaj**  
na **karty przedpłacone**  
lub **produkty Bayer**

Bayer  
Kometa

Punkty zebrane w ramach Programu mogą Państwo wymieniać na produkty Bayer lub wykorzystać w ramach kart przedpłaconych w największych sieciach handlowych. Oferujemy również bony turystyczne do wykorzystania w wybranych biurach podróży.