



## Aktívna zložka

metylester repkového oleja 81,4% hm (733 g/l)

**Pomocný prípravok vo forme emulzného koncentráту (EC) pre použitie pri ochrane kukurice, obilnín, kapustovitých zelenín a na nepoľnohospodárskych plochách.**

## Balenie

HDPE/PA kanister 10 l

## Pôsobenie prípravku

Pomocný prípravok Mero® Stefes je adjuvant pre použitie s prípravkami na ochranu rastlín, vrátane herbicídnych prípravkov na báze sulfonylmočovín, ktorých účinok zlepšuje a stabilizuje. Samostatne nemá žiadny herbicídny účinok. Mero® Stefes znižuje povrchové napätie aplikačných

tekutín pesticídov, čím zlepšuje kontakt aplikačnej tekutiny s povrchom rastlín. Podporuje sekundárnu distribúciu účinných látok na povrchu rastlín a urýchľuje ich vstup do rastlinných pletív.

## Odporúčania pre aplikáciu

Podmienky použitia, maximálny počet aplikácií a ochranné doby sa riadia etiketou prípravku na ochranu rastlín, s ktorým je pomocný prípravok Mero® Stefes kombinovaný.

Pomocný prípravok Mero® Stefes aplikujte maximálne do uvedených rastových fáz:  
kukurica (na siláž, na zrno) - do rastovej fázy keď sú klásky v metline viditeľné (BBCH 53)  
obilniny - do rastovej fázy keď je 1/4 klasu vyrastená (BBCH 52)

## Návod na použitie

Plodina	Účel použitia	Dávka na ha	Poznámky
kukurica (na siláž, na zrno)	zlepšenie účinnosti, zlepšenie zmäčkanlivosti aplikačných kvapalín, zlepšenie príľnavosti	1,0 %	™ všetky autorizované herbicídy, maximálne do BBCH 53
obilniny	zlepšenie účinnosti, zlepšenie zmäčkanlivosti aplikačných kvapalín, zlepšenie príľnavosti	1,0 %	™ všetky autorizované herbicídy, maximálne do BBCH 52
kapusta hlávková, kel ružičkový, karfiol, brokolica	zlepšenie účinnosti, zlepšenie zmäčkanlivosti aplikačných kvapalín, zlepšenie príľnavosti	1,0 %	™ všetky autorizované insekticídy, maximálne do BBCH 41
nepoľnohospodárska pôda, železnice, cestné komunikácie, okrasné škôlky	zlepšenie účinnosti, zlepšenie zmäčkanlivosti aplikačných kvapalín, zlepšenie príľnavosti	1,0 %	™ všetky autorizované herbicídy
všetky plodiny	zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny	max. 2 l	™ s povolenými prípravkami na ochranu rastlín



kapusta hlávková - keď začína tvorba hlávky: dva najmladšie listy sú uzatvorené (BBCH 41)  
kel ružičkový - keď sa bočné pupene začínajú vyvíjať (BBCH 41)  
karfiol, brokolica - keď sa kvetná ružica začína vyvíjať, šírka rastového vrcholu > 1 cm (BBCH 41)

Pri použití na nespevnené cesty, manipulačné plochy, nádvoria, chodníky, parkoviská, parkové cesty, železnice neošetrujte nepriepustné plochy (napríklad betónové, asfaltové alebo dláždené povrchy), na ktorých by mohlo dôjsť k splachovaniu aplikačného roztoku!

Dávku vody použite podľa etikety prípravku na ochranu rastlín, s ktorým je pomocný prípravok Mero® Stefes kombinovaný. Nižšia dávka vody pri dodržaní hektárovej dávky prípravku môže zvýšiť riziko fytotoxicity prípravku, zvlášť pri nedodržaní aplikačných podmienok pesticídov (teplota, vlhkosť, rastová fáza, atď.)!

Pomocný prípravok Mero® Stefes je možné aplikovať schválenými postrekovačmi a rosičmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie. Aplikačná kvapalina nesmie zasiahnuť necieľové porasty v okolí ošetrovanej plochy! Neaplikujte letecky, len pozemne!