



GR84128783B



PACIFICA[®]

PLUS»

3 kg e

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας
Υ.Α.Α.Τ.: 70137 / 27.10.2015

Εναιωρηματοποιημένοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστικές ουσίες: amidosulfuron 5% β/β, iodosulfuron-methyl-sodium 1%

β/β, mesosulfuron-methyl 3% β/β

Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: mefenpyr-diethyl 9% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 90,07% β/β

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

GROUP 2 HERBICIDE

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000, www.cropscience.bayer.gr

BAYWIN

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



UFF: PQU0-K0EG-V00X-J29F

**BONUS
STICKER**

Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί επίσημη/πρωτότυπη ετικέτα και παρατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.

ΠΑΣΙΦΙΚΑ ΠΛΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιανονκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλων ζιανών σε χερμαρινό σιτάρι (σκληρό και μαλακό), σίκαλη και τριτικάλε. Το Pacific Plus είναι διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιανονκτόνο της ομάδας των σουλφονυλουριών. Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνυπόστηρο του οξειγλαυκτικού, οπότε σταματά στα ζιάνια η βιόσυνθεση αμινοξέων απαραίτητων για την ανάπτυξη τους. Ορισμένες ισοεκλεκτικές βολήνης) με αποτέλεσμα να γίνονται χλωρωτικά και τελικά να νεκρώνονται. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανώτατο όσο και με τον κατώτατο χυμό. Κύριο σημείο δράσης είναι οι μερισματικοί ιστοί των ζιανών. Μερικές μέρες μετά τον ψεκασμό η ανάπτυξη των καταπολεμώμενων ζιανών έχει ήδη σταματήσει και τα πρώτα συμπτώματα αρχίζουν να εμφανίζονται. Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός της επιφάνειας της καλλιέργειας και των ζιανών με μικτό τύπου σκόπας και πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 ατμ. (45 PSI).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μίση με νερό. Διαλύετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και την ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικμάτους που έχουν κατόληνη εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα υλικά συσκευασίας έφελπτονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχάσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναιωτισμένα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΔΙΑΣΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνιστάται η εφαρμογή του Pacific Plus σε συνδυασμό με υγρά λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους. Μεταξύ της εφαρμογής υγρών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους και Pacific Plus συνιστάται να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 7 ημερών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

Σιτάρι Χεμαρινό (σκληρό και μαλακό), Σίκαλη, Τριτικάλε: Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιάνια. Μεταφυτρωτική εφαρμογή όταν α) η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 3 παραμιακών φύλλων έως το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου και β) όταν τα αγρωστώδη ζιάνια είναι στο στάδιο των 3 φύλλων έως το τέλος του αδαφώματος και/ή τα πλατύφυλλα ζιάνια είναι στο στάδιο των 4 έως 6 φύλλων. Δόση: max. 50 γρ./στρέμμα + προσθήκη 100 ml/στ. Biopower. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα. Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

• **Ευαίσθητα ζιάνια (στη δόση 30 γρ./στρ.):**

Ανεμόχορτο (*Apera spica-ventis*), Κοινή πιά (Poa annua), Τραχεία λιβαδόπια (*Poa trivialis*)

• **Ευαίσθητο ζιάνια (στη δόση 50 γρ./στρ.):**

• Ηρα πολυάνθη (*Lolium multiflorum*), *Arrhenatherum elatius* (εναέρια μέρη), Βρόμος (*Bromus* sp., *Bromus hordeaceus*), Αγριοβρώμη (*Avena* sp., *Avena fatua*), Φάλαρη (*Phalaris* spp.), Στελλάρινα (*Stellaria media*, *Stellaria* spp.), Κέρσαιο (*Cerastium arvense*), Μεγάλη κόλλητροίδα (*Gallium aparine*), Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*), Αγριοσίτα

(*Sinapis arvensis*), Παναβία (*Raphanus raphanistrum*), Παπαρούνη (*Papaver rhoeas*), *Arenaria serpyllifolia*

• **Ευαίσθητα ζιάνια (στη δόση 30 γρ./στρ.):** Αλεπουσούρα (*Alopecurus myosuroides*)

• **Μετρίως ευαίσθητα ζιάνια:**

Μυοσώτις (*Myosotis arvensis*), Κοινός αγριοπανός (*Viola* spp.), Βερωνίκη (*Veronica arvensis*)

ΤΕΛΕΥΑΙΑ ΕΠΙΜΟΝΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΚΟΜΙΔΗ:

Σιτάρι Χεμαρινό (σκληρό και μαλακό), Σίκαλη, Τριτικάλε: -

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Κατά την εφαρμογή αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες και ιδιαιτέρως σε τεύτλα, ελαϊοκράμβη και πιπέζια.

• Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως χλώρωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή. Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων εννοείται όταν επικρατούν έντονες βροχοπτώσεις πριν την εφαρμογή, μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας ή παγετός πριν ή μετά την εφαρμογή.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:

Σε περίπτωση ατυχητής της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το Pacific Plus, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί μετά από 6 εβδομάδες:

- Με ή χωρίς όργωμα: Ανοιξιάτικο σιτάρι.

- Εφόσον εφαρμόστηκαν 30 γρ. σκευάσματος/στρέμμα και μετά από όργωμα: Ανοιξιάτικο κριθάρι ή αρβαντιάτος.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Μετά την εφαρμογή του Pacific Plus, στο πλαίσιο της αμεψιστορίας μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες με την προϋπόθεση να προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών: βρώμη, ζαχαρότευτλα, μαλακό και σκληρό σιτάρι, κοκκό, λινάρι, αραβόσιτος, κριθάρι, μήπι, πατάτα, σίκαλη, σόγια, σόργο, ηλιανθος και τριτικάλε. Επίσης, μπορεί να σπαρθεί ελαϊοκράμβη (σπορά κατά την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου) εφόσον προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών. Σε περίπτωση ξηρού έτους συνιστάται να προηγηθεί βαθύ όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 20 εκατοστών.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΉΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΖΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Να μην εισέρχονται οι εργάτες στην ψεκασμένη περιοχή για 48 ώρες μετά την εφαρμογή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: Βλέπε συσκευασία

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



UFI: PQU0-K0EG-V00X-J29F

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. • Μη ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη που αποστραγγίζονται τεχνητά, για τις χρήσεις σε χειμερινά σιτηρά. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά νερά. • Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά, να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη ως ακολούθως: Σιτάρι Χειμερινό (σκληρό και μαλακό), Σίκαλη και Τριττικάλε: 10 μ. + ακροφύσια 75% μειωμένης διασποράς ή 5 μ. + ακροφύσια 90% μειωμένης διασποράς. • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά τις διάφορες φάσεις χειρισμού του σκευάσματος. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:

Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. Μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση.

Σε περίπτωση εμπονής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία.

Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΞΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400). • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΞΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Ξεπλύνετε το στόμα με νερό.

Πληροφορίες για το γιατρό:

Θεραπεία: Συμπτωματική. Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Παρόλ'αυτά, εάν έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα (περισσότερη από μία γουλιά) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θεϊκό Νάτριο.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer

από σταθερό: **800 1135 353**

από κινητό: **210 6166 332**

24/7

GR84128783B



5 200309 822869 >



Bayer

Bayer Ελλάς ABEE,
Αγνάλιου 6-8,
151 23 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6166000,
www.cropscience.bayer.gr