

Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί επίσημη/πρωτότυπη ετικέτα και παρατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.



GR88736648B

PREVICUR[®] ENERGY SL

500 ml e

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: propamocarb 53% β/ο, fosetyl 31% β/ο
Βοηθ. ουσίες: 25,2% β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση

GROUP 28 | P₀₇ FUNGICIDE

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000, www.cropscience.bayer.gr

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. ΥΑ.Α.Τ.:
60257 / 1-7-2009

ΠΡΟΣΟΧΗ



UFI: KE50-2081-X006-HDSF

ΠΡΕΒΙΚΟΥΡ Π ΕΝΕΡΤΙΣ SL

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση. Το propramocarb hydrochloride παρουσιάζει μικρή διασυστηματική κίνηση και η δράση του φαίνεται να επηρεάζει το σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών με συνέπεια την παρεμπόδιση της μυκηλιακής ανάπτυξης καθώς και της παραγωγής και βλάστησης των спорιών των περονόσπορων. Το fosetyl-Al παρουσιάζει συμπλαστική και αποπ्लाστική κίνηση και δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των спорιών αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμοί στα σπορεία, εφαρμογές με πότισμα, ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού διαλύματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Μ.Α.Ε./Μ.Ε.):

ΣΠΟΡΕΙΑ: ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΕΠΟΝΙ, ΜΑΡΟΥΛΙ: Πύθιο (*Pythium* sp.). Εφαρμογές στο σπορείο (BBCH 00-13). **Δόση:** 3 κ.εκ. σκευάσματος / τετραγωνικό μέτρο (3 λίτρα/στρ.). **Όγκος νερού:** 2 λίτρα νερό / τετραγωνικό μέτρο (2.000 λίτρα/στρ.). **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-2 εφαρμογές. Μία εφαρμογή μετά τη σπορά και μία εφαρμογή μετά τη βλάστηση των σπόρων (μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες).

ΣΠΟΡΕΙΑ: ΠΙΠΕΡΙΑ: Πύθιο (*Pythium* sp.). Εφαρμογές στο σπορείο (BBCH 00-13). **Δόση:** 6 κ.εκ. σκευάσματος / τετραγωνικό μέτρο (6 λίτρα/στρ.). **Όγκος νερού:** 2 λίτρα νερό / τετραγωνικό μέτρο (2.000 λίτρα/στρ.). **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1 εφαρμογή.

ΤΟΜΑΤΑ (Θ), ΠΙΠΕΡΙΑ (Θ), ΑΓΓΟΥΡΙ (Θ), ΠΕΠΟΝΙ (Θ): Πύθιο (*Pythium* sp.). Ριζοπότσημα. Προληπτικές ή θεραπευτικές εφαρμογές (BBCH 13-89). **Δόση:** 300 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος νερού:** 300 λίτρα νερό / στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** α) Καλλιέργεια στο έδαφος: 2 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες, β) Καλλιέργεια σε τεχνητά υποστρώματα: 4 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες.

ΤΟΜΑΤΑ (Θ): Φυτοφθορα (*Phytophthora infestans*). Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την εμφάνιση του 6^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι το 50% των καρπών εμφανίζει το τυπικό πλήρως ώριμο χρώμα (BBCH 16-85). **Δόση:** 130-170 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (250 (max) κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** Καλλιέργεια στο έδαφος/σε τεχνητά υποστρώματα: 1-2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

ΑΓΓΟΥΡΙ (Θ): Περονόσπορος (*Peronospora cubensis*). Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την εμφάνιση του 4^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 14-89). **Δόση:** 130-170 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (250 (max) κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** Καλλιέργεια στο έδαφος/σε τεχνητά υποστρώματα: 1-2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

ΜΑΡΟΥΛΙ (Υ): Περονόσπορος (*Bremia lactucae*). Προληπτικοί ψεκασμοί εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. **Δόση:** 250 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 40 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος / στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΜΙΔΗ:

Εφαρμογές στα σπορεία: Όλες οι καλλιέργειες -

Εφαρμογές με ριζοπότσημα: Τομάτα (Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγούρι (Θ): 3 ημέρες, Πεπόνι (Θ): 14 ημέρες.

Εφαρμογή στο φύλλωμα: Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Θ): 3 ημέρες, Μαρούλι (Υ): 21 ημέρες. **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. propramocarb hydrochloride, που ανήκει στην ομάδα 28 κατά FRAC και τη δ.ο. fosetyl-al, που ανήκει στην ομάδα P07 κατά FRAC.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται ο συνδυασμός ή εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΥΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

- ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Λαχανικά με βρώσιμη ρίζα και λαχανικά του γένους *Allium* που προορίζονται για την διατροφή ανθρώπων και ζώων μπορούν να φυτευτούν ή να σπαρουν στο ίδιο υπόστρωμα μετά την πάροδο 120 ημερών από την τελευταία εφαρμογή. Κηπευτικά φυλλώδη, κηπευτικά με στέλεχος, καρποφόρα κηπευτικά και σταυρανή μπορούν να φυτευτούν ή να σπαρθούν μετά την πάροδο 60 ημερών από την τελευταία εφαρμογή.

- ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχετε στον αγρό πριν να έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό εάν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες), ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνονται τριπλό ξεπλυσμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγουμένως, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία απολλογής να ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Δύο χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία, σε μέρος δροσερό, μακριά από το ηλιακό φως και σε θερμοκρασία δωματίου.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε συσκευασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ



UFI: KE50-2081-X006-HDSF

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μακριά από παιδιά. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη, αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. • Φοράτε γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την επανείσοδο, στην καλλιέργεια πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Πρώτες Βοήθειες:

Γενικές υποδείξεις:

Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή.

• Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ξαπλωμένο. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.

• Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά από τα 5 πρώτα λεπτά και συνεχίστε με το πλύσιμο του ματιού. Εάν ο ερεθισμός ματιών ή το κοκκίνισμα εμμένει, επισκεφθείτε έναν οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Ειδοποιήστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Πληροφορίες για το γιατρό:

Συμπτώματα: Τα ακόλουθα συμπτώματα μπορεί να συμβούν: Λήθαργος, Σύγχυση, Σπασμοί, Τοπικά: ευαισθητοποιητική δράση.

Κίνδυνοι: Το προϊόν, παρόλο που είναι καρβαμιδικό, δεν είναι αναστολέας της χοληνεστεράσης. Μεταχείριση: Συστήνεται κατάλληλη υποστηρικτική και συμπτωματική θεραπεία όπως αυτή ενδείκνυται από την κατάσταση του ασθενή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Αντένδειξη: ατροπίνη. Δεν απαιτείται φυσιολογικά πλήση στομάχου. Όταν έχει απορροφηθεί σημαντική ποσότητα (περισσότερο από μία μπουκιά), χορηγήστε ενεργό άνθρακα καιθεικό νάτριο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777



Bayer

Bayer Ελλάς ABEE,
Αγισιλάου 6-8,
151 23 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6166000,
www.cropsscience.bayer.gr

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer
από σταθερό: **800 1135 353**
από κινητό: **210 6166 332**

24/7



5200309849248

GR88736648B