



PROSAR[®]

Contém

5 L

Concentrado para emulsão (EC) com 125 g/L de protioconazol e 125 g/L de tebuconazol
Contém: N,N-dimetil decanamida

Fungicida

Indicado para combater: ferrugem amarela, ferrugem castanha, fusarioses, oídio e septorioses dos trigos e ferrugem castanha, helmintosporioses, oídio e rincosporiose da cevada

GRUPO 3 FUNGICIDA

Autorização de Venda N.º 0427 concedida pela DGAV

Lote N.º e Data de produção: impressos na embalagem

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Titular da

Autorização de Venda:

Bayer CropScience (Portugal)

Produtos para a Agricultura, Lda.

Av. Vitor Figueiredo, N.º 4 - 4.º Piso

2790-255 CARNAXIDE

Telef.: 21 417 21 21

<https://cropscience.bayer.pt>



PT85338978C

PROSARO é um fungicida do grupo dos triazóis que atua na desmetilação da síntese de esteróis (DMI). É um fungicida sistêmico com atividade preventiva e curativa no combate a várias doenças que atacam as espigas e as folhas da cevada e do trigo (trigo duro e trigo mole).

UTILIZAÇÃO, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Este fungicida permite combater as seguintes doenças dos cereais:

CEVADA:

Ferrugem castanha (*Puccinia hordei*), **helmintosporioses** (*Pyrenophora* spp.), **oídio** (*Blumeria graminis*) e **rincosporiose** (*Rhynchosporium secalis*): **0,8-1 L/ha.**

TRIGO (Trigo duro e Trigo mole):

Ferrugem amarela (*Puccinia striiformis*), **ferrugem castanha** (*Puccinia recondita*), **oídio** (*Blumeria graminis*) e **septoriose** (*Zymoseptoria tritici*): **0,8-1 L/ha.**

Fusarioses (*Fusarium* spp.): **1 L/ha.**

Aplicar quando surgirem os 1.os sintomas, entre o final do encanamento e a fase do emborrachamento, de forma a manter as duas folhas “bandeira” sãs.

No caso das **fusarioses do trigo**, tratar preventivamente no início da floração (ântese), sob condições favoráveis à doença.

Em anos favoráveis à doença e/ou em variedades sensíveis, podem ser efetuados tratamentos posteriores com fungicidas de outro modo de ação, após 2-3 semanas (até ao espigamento).

Intervalo de Segurança: 35 dias.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 1 tratamento por cultura e no conjunto das doenças, com **PROSARO** ou outros produtos que contenham DMI. Alternar o uso do produto com outros de diferente modo de ação.

Em algumas condições, este produto pode provocar necroses difusas nas folhas dos cereais tratados, sem efeitos negativos na produtividade.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda, deitar metade do volume de água necessário para a pulverização prevista. Juntar a quantidade necessária de produto e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

O produto deve ser aplicado dirigido ao solo e com tractor com cabina, os trabalhadores devem usar vestuário de mangas compridas.

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto/ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade de distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

Débito aconselhado: 300-400 L/ha.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Provoca irritação cutânea. • Provoca irritação ocular grave. • Pode provocar irritação das vias respiratórias. • Suspeito de afetar o nascituro. • Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. • Pedir instruções específicas antes da utilização. • Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. • Evitar respirar a nuvem de pulverização. • Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. • Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. • Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. • Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. • **SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:** Lavar abundantemente com água. • **SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:** Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. • **EM CASO DE** exposição ou suspeita de exposição: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. • Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. • Recolher o produto derramado. • Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. • Armazenar em local fechado à chave. • Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. • Ficha de segurança fornecida a pedido. • Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. • Para proteção de plantas e artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas circunvizinhas. • Para proteção de organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às águas de superfície. • Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar camisa de mangas compridas, calças, meias e botas. • O aplicador deverá usar luvas, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda e aplicação do produto. • Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado. • Após o tratamento, lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

**Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV).
Telef.: 800 250 250.**

Ed. 20821



ATENÇÃO

[UFI: VN70-706C-W002-Q8X4]



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar por ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.



Bayer