



PROSPER

500 EC

500 ml e

Αρ. Άδειας Διανομής
στην Αγορά Υ.Α.Α.Τ.:
6771 / 14-01-2003

Υγρό γαλακτωματοποίηση (EC)
Εγγ. Σύνθεση: Spirothiamine 50% β/β
Βοηθ. ουσίες: 47% β/β

Προστατευτικό δισυστηματικό Μυκητοκτόνο

για την αντιμετώπιση του αιδίου της
αμπέλου (*Uncinula necator*).

GROUP 5 FUNGICIDE

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο
για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της άδειας, Υπευθύνος για την
τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ,
Αιγυλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6166000, www.cropscience.bayer.gr

UF: 0190-A07Q-S00Y-9R8S

BAYWIN

GR80020293H

PROSPER 500 EC ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Προστατευτικό δισυστηματικό μυκητοκτόνο, για την αντιμετώπιση του αιδίου της αμπέλου (*Uncinula necator*). Περιμποδίζει τη ριζοσύνθεση εργοστερόλης με τρόπο διαφορετικό από εκείνη των DMIs. Παρουσιάζει βραδεία αποπλαστική κίνηση στα φυτά, στα οποία διασίδει ταχέως και για αυτό δεν επηρεάζεται η δράση του από βροχόπτωση, δύο ώρες μετά την εφαρμογή του.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασιμός καλύψεως φυλλώματος. Ο όγκος του ψεκασιτού υγρού και η πίεση ψεκασιμού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται καλή διαβροχή του φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Αραιώνουμε το προϊόν σε λίγο νερό. Στη συνέχεια αδειάζουμε το μίγμα στο μισογεμάτο με νερό βυτίο με συνεχή ανάδραση και απογειάζουμε το βυτίο με νερό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΛΑΘ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Αμπέλι (επιτραπέζια και ονοποθήρια σταφύλια και σταφίδες).

ΣΤΟΧΟΣ: Αίδιο της αμπέλου (*Uncinula necator*).

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Προληπτικοί ψεκασιμοί φυλλώματος στο στάδιο των 2-3 φύλλων λίγο πριν την άνθηση και μετά το δόσιμο και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης, με μεσοδιάστημα επεμβάσεων 7-16 ημερών*.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής. • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Υποπίο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (οφθαλμούς) ύστερα από παρατεταμένη ή επαναληπτική έκθεση. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- Μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Φυλάσσετε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Αποφεύγετε να αναπνεύσετε σκόνη / αναθυμώσεις / αέρια / ατμοκέντρώσεις σταγονιδίων / σταγόνες / εκνεφώματα. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα. • Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • Φυλάσσετε κλειδωμένο. • Διάθεση του περιεχομένου/περιεχόμενου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Φοράτε κατάλληλα γάντια και ολόσωμο φόρμα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Πρώτες βοήθειες – Αντιδοτό: Γενικές πληροφορίες: Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη ζώνη. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκασιτικό υγρό.

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Η ΠΝΘΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
- Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΗΝΗΤΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. • Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΗΝΗΤΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. • Χρειάζεται ειδική αγωγή/Παρατεταμένη επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Στη συνέχεια ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Πληροφορίες για τον βερπάντονα: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΗΝΗΤΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Δόση: 60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (60 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκασιτικού υγρού: 100 λίτρα στρέμμα.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 3 εφαρμογές.
* 7-12 ημέρες όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου και 13-16 ημέρες όταν ο κίνδυνος πρόβλησης είναι μικρός.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΗ:

• Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια): 14 ημέρες. • Αμπέλι (ονοποθήρια σταφύλια): 35 ημέρες
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΝΕΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΨΕΚΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας του μύκητα *Uncinula necator* (αίδιο της αμπέλου) στο **PROSPER 500 EC** (spirothiamine 50%) κάτω από ορισμένες συνθήκες, είναι υπαρκτός. Για την πρόληψη εμφάνισης φαινομένων ανθεκτικότητας στην πράξη, πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
• Χρήση του spirothiamine μόνο προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων χημικών ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης. • Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: τρεις(3).
ΠΑΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ: Πρέπει να γίνεται σε αφέακτη περιοχή του αμπέλωνα όπου χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα ή σε ειδικό χώρο για πλύσιμο με τομεταμένο δάπεδο και συλλογή των εκπιμμάτων σε ειδική δεξαμενή. Το πλύσιμο γίνεται με 3 ξεπλύματα του βυτίου και των μερών του ψεκασιτήρα με νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Η απόσυρση ή καταστροφή του PROSPER, πρέπει να γίνεται σε ψυκαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, σε συνθήκες συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε συσκευασία.

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer
από σάββατο: **800 1135 333**
από κινητό: **210 6166 332**



5 200309 894217



Bayer

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ,
Αιγυλάου 6-8,
151 23 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6166000,
www.cropscience.bayer.gr

Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο
δεν αποτελεί επίσημη/πρωτότυπη
ετικέτα και παρατίθεται
μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.
Η ενημερωμένη ετικέτα
του προϊόντος είναι εκείνη που
θα βρείτε πάνω στη συσκευασία
κατά την αγορά του.