

Fungicide

Recital®

Fungicide

voor de behandeling
van aardappelen.

Fongicide

pour le traitement
des pommes de terre.

5 L



Werkingswijze/Mode d'action

GROUP	7	3	FUNGICIDES
-------	---	---	------------

BE87344533C

Hier openen - ouvrir ici

Recital®

Gevarenaanduidingen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende informatie

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en een mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Mentions de danger

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.

P391 Recueillir le produit répandu.

Informations supplémentaires

EUH208 Contient du 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one et un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazool-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazool-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Gefahrenhinweise

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

Ergänzende Informationen

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazool-3-on + Mischung von 5-Chloro-2-Methyl-2H-Isouthiazool-3-on und 2-Methyl-2H-Isouthiazool-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GHS09



WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG

Toelatingsnummer: 11112P/B

Suspo-emulsie (SE) op basis van:

125 g/l (11,8 % w/w) prothioconazole

125 g/l (11,8 % w/w) fluopyram

Numéro d'autorisation : 11112P/B

Suspoémulsion (SE) à base de:

125 g/l (11,8 % w/w) de prothioconazole et

125 g/l (11,8 % w/w) de fluopyram

Tel. Antigifcentrum/Centre Antipoisons: 070/245.245

UFI: 6E80-S0DX-N00H-NC5Q



www.agrirecover.eu

Recital® - Trademark of Bayer Group

Lotnummer/Numéro de lot :

zie op de verpakking/voir sur l'emballage

Label version: 09/2025

© Copyright Bayer CropScience

BE87346234G

Toelatingshouder/Détenteur de l'autorisation:

Bayer CropScience SA-NV
Kouterveldstraat 7A Bus 301
1831 Diegem (Machelen)
tel. 02/535 63 11
www.cropscience.bayer.be

Bayer

GEBRUIK EN GEBRUIKSDOSISSEN

Lees aandachtig het etiket voor gebruik.

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip van de teelt
Aardappelen, inbegrepen aardappelpootgoedteelt (in open lucht)	Alternariarot	0,5 L/ha	Preventief. Tussen het begin van de knolvorming: eerste stolonen zwellen op aan uiteinde tot twee maal stolondiameter (BBCH 40) en het stadium waar de bessen van de eerste vruchtzetting verschrompeld, zaden donker (BBCH 89)
	Toepassingsvoorwaarden: – Max. 3 toepassingen/teelt. De laatste toepassing moet ten laatste in september gebeuren. – Respecteer een interval van minimum 10 dagen tussen 2 toepassingen. – Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 50% driftreducerende techniek. – Veiligheidstermijn vóór de oogst: 21 dagen.		

Toepassingstechniek: bespuiting

Algemene opmerkingen/aanbevelingen:

- Max 500 g fluopyram/ha/jaar
- Recital® dient toegepast te worden met een watervolume van 100-400 l/ha in aardappelen. Tijdens de bespuiting de spuitboomhoogte in functie van het dooptype aanpassen aan de hoogte van het gewas.
- Verpakking goed schudden voor gebruik. Spuitapparatuur voor gebruik goed controleren op aanwezigheid van ongewenste productresten, mogelijke verstoppingen, ...
- Liefst toepassen op een droog gewas. Recital® niet toepassen tijdens een vorstperiode of als er binnen de 1 à 2 uur na de toepassing regen wordt verwacht.

Algemene opmerking betreffende de dosis:

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn(en) te verkorten.

BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor beroepsgebruik.
- **Maatregelen ter voorkoming van resistentievorming:**
 - o Het mogelijk optreden van resistente of minder gevoelige ziektestammen kan niet worden uitgesloten of voorspeld. Indien resistente of minder gevoelige ziektestammen zouden optreden, kan Recital® minder werkzaam zijn. Het respecteren van de erkende dosis blijft hierbij het meest aangewezen hulpmiddel.
 - o SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 3 en 7.
- **Aanbeveling voor gewasbehandeling met fluopyram bevattende middelen om overmatige belasting van het milieu te voorkomen:**

Recital bevat 125 g/L fluopyram. Er kunnen meerdere producten op basis van fluopyram in een grondgebonden teelt toegelaten zijn.

Om overschrijding van de MRL in volggewassen te voorkomen en/of om de mogelijke overdracht van relevante metaboliëten in volggewassen te beperken, mag de totale hoeveelheid fluopyram/ha aangebracht door dit product of andere producten die fluopyram bevatten niet hoger zijn dan 500 g/12 maanden. Deze beperking geldt niet voor gebruik in gesloten waterrecirculatiesystemen, substraatteelt, witloofwortels (bewaring, na-oogst) en forcerie (witloof en roodloof).

• **Residuen volgteelten:**

- Om overschrijding van de MRL te voorkomen, moet een wachtermijn van minstens 365 dagen gerespecteerd worden tussen de laatste toepassing en het zaaien of planten van kardoelen, selderij (bleek, groene en witte), knolvenkel, rabarber en de oliehoudende zaden waarvoor de MRL op de kwantificatielimit (LOQ) staat.
- Afhankelijk van de afbraaksnelheid van fluopyram in de bodem zou deze actieve stof kunnen worden teruggevonden in een volgende teelt. Om deze reden zijn voor sommige teelten, waarin het product niet toegelaten is, MRL's voor volgteelten vastgesteld. Deze MRL's dekken niet een gebruik af in de betreffende teelt, want die zijn meestal te laag daarvoor, maar zorgen er voor dat het geogoste product in het handelsverkeer mag worden gebracht. Voor de actuele stand ten aan zien van de beschikbare MRL's voor fluopyram, zie de [EU Pesticide database op Internet](#).
- SPe8 : Gevaarlijk voor bijen en andere bestuivende insecten indien dit product wordt toegepast in menging met een insecticide behorende tot de familie van de pyrethroiden. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit mengsel niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Gebruik dit mengsel niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit mengsel niet in de buurt van in bloei staand onkruid.

BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING, BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING EN BEHANDELINGS-OVERSCHOTTEN

De verpakking goed schudden voor gebruik. Het product in de voor 1/2 gevulde spuit tank gieten. Mengen en verder met water aanvullen.

De zorgvuldig geleedigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden.

De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

De spuitoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspreiden op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvorschriften.

Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking.

De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden.

Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN HET GROND- EN OPPERVLAKTEWATER

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erfen of wegen kan worden verontreinigt.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen. Voor instructies bij een specifieke teelt: zie rubriek 'Gebruik en gebruiksdosissen'.
- Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.
- Driftreductie: Vermijd spuitdrijf naar naburige vegetatie, gronden en waterlopen door een aangepaste spuitapparatuur, waterhoeveelheid en rijsnelheid. Spuit bij windstil weer met aangepaste druk naargelang de specifieke aanbevelingen voor driftreducerende doppen.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldig zijn.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.
- Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

- SPO: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- Om omstanders en omwonenden te beschermen dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen).

AANWIJZINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Eerste hulp maatregelen	
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.	
NA INSLIKKEN:	De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
NA INADEMING:	De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:	Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245.	

DO NOT COPY

WAARBORG

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkende aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

USAGE ET DOSE D'EMPLOI

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation du produit.

Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application de la culture
Pommes de terre, y compris culture de plants de pommes de terre (en plein air)	Alternariose des solanacées	0,5 L/ha	Préventif. Entre le stade initiation de la formation du tubercule : les premiers stolons grossissent à leur extrémité et atteignent le double de leur diamètre (BBCH 40) et le stade où les baies de la première infrutescence sont desséchées, les graines sont forcées (BBCH 89)
	Conditions d'application: – Max. 3 applications par culture. La dernière application doit être effectuée au plus tard en septembre. – Respecter un intervalle de minimum 10 jours entre 2 applications. – Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de minimum 50%. – Délai avant récolte: 21 jours		

Méthode d'application : pulvérisation

Remarques/Recommandations générales :

- Recital® sera appliqué avec un volume d'eau de 100 à 400 l/ha en pommes de terre. Pendant la pulvérisation adapter la hauteur de la rampe en fonction du type de jet et de la hauteur de la végétation.
- Bien agiter l'emballage avant l'emploi. Contrôler le pulvérisateur avant utilisation et vérifier l'absence de restes de produits dans la cuve, bouchage éventuel, ...
- Traiter de préférence sur une végétation sèche. Ne pas appliquer le Recital® pendant une période de gel ou en cas de risque de pluie endéans 1 à 2 heures.

Remarque générale concernant la dose :

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente .

CONDITIONS PARTICULIERES D'APPLICATION

- Produit destiné à un usage professionnel.
- **Mesures pour la prévention du développement de la résistance :**
 - On ne peut pas exclure ni prévoir la possibilité de l'apparition de souches résistantes ou moins sensibles. Dans de telles circonstances, Recital® peut s'avérer moins efficace. Le respect de la dose agréée reste le meilleur moyen pour garantir un résultat optimal.
 - SPA1 : Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes FRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 3 et 7.
- **Recommandation pour éviter un impact environnemental excessif suite à un traitement des cultures avec des produits contenant du fluopyram :**
Recital contient 125 g/L de fluopyram. Plusieurs produits à base de fluopyram peuvent être autorisés dans une culture en pleine terre.
Afin d'éviter un dépassement de la LMR dans les cultures suivantes et/ou afin de limiter le transfert possible des métabolites pertinents dans les cultures suivantes, la quantité totale de fluopyrame/ha apportée par ce produit ou tout autre produit contenant du fluopyrame ne peut pas dépasser 500 g/12 mois. Cette restriction ne s'applique pas à l'usage dans les systèmes avec recirculation de l'eau, culture sur substrat, racines de witloof (conservation, post-récolte) et forcerie (witloof et chicon rouge).

• **Résidus dans les cultures de la rotation :**

- Afin d'éviter un dépassement de la LMR, un délai de minimum 365 jours doit être respecté entre le dernier traitement et le semis ou la plantation de cardon, céleri, fenouil, rhubarbe et de cultures d'oléagineux dont la LMR est la limite de quantification (LOQ).
- En fonction de la vitesse de dégradation du fluopyram dans le sol, il se pourrait que cette substance active se retrouve dans une culture ultérieure de la rotation. Pour cette raison, des LMR ont été fixées pour certaines des cultures suivantes, dans lesquelles le produit n'est pas autorisé. Ces LMR ne couvrent pas une utilisation dans la culture concernée, car elles sont généralement trop basses pour cela, mais garantissent que la culture récoltée puisse être commercialisée. Pour le statut des MRLs du fluopyram, consultez la banque de données 'EU Pesticide database' sur Internet.
- SPe8 : Dangereux pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs lorsqu'utilisé en mélange avec un insecticide du groupe des pyrèthrinoides. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer ce mélange durant la floraison de la culture. Ne pas utiliser ce mélange en zone de butinage. Ne pas appliquer ce mélange lorsque des adventices en fleur sont présentes.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE, TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT.

Agiter le bidon avant l'emploi. Remplir la cuve à 1/2 d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter le volume de la cuve. L'emballage vide doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins.

De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

MESURES POUR EVITER LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE

- SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface.
- Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme et des routes.
- SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface. Voir les instructions spécifiques à la culture sous la rubrique 'Usage et doses d'emploi'.
- En plus des zones tampons mentionnées sur l'étiquette, des zones tampons régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.
- Réduction de la dérive : Eviter la dérive sur la végétation, les plans et les cours d'eau par l'utilisation d'un équipement de pulvérisation approprié et en ajustant la quantité d'eau et la vitesse. Pulvériser en l'absence de vent et avec une pression adaptée conformément aux recommandations spécifiques pour les buses antidérive.

MESURES DE PRECAUTION

- Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
- Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques
- Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

- SPO: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.
- Afin de protéger les personnes présentes sur les lieux lors du traitement et les résidents, respecter un pourcentage minimum de réduction de dérive (voir mesures de réduction du risque).

INDICATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS

Premiers soins	
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.	
EN CAS D'INGESTION:	Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
EN CAS D'INHALATION:	Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:	Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:	Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Pour des informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245	

GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur: nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

Recital®

Gevenaanduidingen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende informatie

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on + mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on

en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Mentions de danger

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.

P391 Recueillir le produit répandu.

Informations supplémentaires

EUH208 Contient du 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one + mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one

et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Gefahrenhinweise

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

Ergänzende Informationen

EUH208 Enthält 1,2-benzisothiazolin-3-on + Mischung von 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazool-3-on

und 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GHS09



WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG

Toelatingsnummer: 11112P/B

Suspo-emulsie (SE) op basis van:

125 g/l (11,8 % w/w) prothioconazole

125 g/l (11,8 % w/w) fluopyram

Numéro d'autorisation : 11112P/B

Suspoémulsion (SE) à base de:

125 g/l (11,8 % w/w) de prothioconazole et

125 g/l (11,8 % w/w) de fluopyram

Tel. Antigifcentrum/Centre Antipoisons: 070/245.245

UFI: 6E80-S0DX-N00H-NC5Q



www.agrirecover.eu

Recital® - Trademark of Bayer Group

Lotnummer/Numéro de lot :

zie op de verpakking/voir sur l'emballage

Label version: 09/2025

© Copyright Bayer CropScience

BE87346234G

Toelatingshouder/Détenteur de l'autorisation:

Bayer CropScience SA-NV

Kouterveldstraat 7A Bus 301

1831 Diegem (Machelen)

tel. 02/535 63 11

www.cropscience.bayer.be

Bayer