

REDIGO® M



Účinná látka

metaxyl 20 g/l (FRAC 4)
 prothioconazole 100 g/l (FRAC 3)

Fungicidní mořidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu pro moření osiva kukuřice proti houbovým chorobám.

Balení a hmotnost

HDPE kanystr 5 l

Působení přípravku

Redigo® M je fungicidní mořidlo, které je způsobu účinku řazeno mezi inhibitory demethylace ergosterolů (FRAC kód 3, kód místa působení G1, SBI třída I, skupina triazolinthiony) a mezi inhibitory RNA polymerázy I (FRAC kód 4, kód místa působení A1, skupina fenylamidy).

Redigo® M působí proti spektru významných patogenů vzházejících rostlin přenosných osivem a půdou, které se spolupodílejí na hnilobách vzházejících rostlin kukuřice. Jejich příčinami jsou zejména *Fusarium verticillioides* (*Gibberella moniliformis*) a *Fusarium graminearum* (*Gibberella zeae*). Ve vlh-

cích pěstebních podmínkách přípravek působí proti významným druhům půdních hub ze třídy *Oomycetes* (jako jsou *Pythium* spp, *Perenospora* spp, apod.) případně celému komplexu chorob vzházejících rostlin.

Dávkování a doporučení pro aplikaci

Redigo® M je mísitelné s B-360® a ověřenými insekticidními mořidly. Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Přípravek Redigo® M je možné v případě potřeby ředit vodou. Dávka vody závisí na technických parametrech mořičky a konkrétním technologickém postupu moření. Mořicí kapalina je připravena k moření v okamžiku vytvoření homogenní suspenze. Mořicí suspenzi je třeba bezodkladně spotřebovat. Doporučená dávka vody je 0,1–1,9 l/100 kg osiva, podle typu mořičky.

Pro snížení prašnosti a otěru při manipulaci, zvýšení přilnavosti mořidla na osivu a dosažení optimální pokrývnosti doporučujeme aplikovat s Peridiam® Quality 316 v dávce 1,5–3 l/t.

Návod k použití

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	OL (dny)	Poznámka
Kukuřice	fuzariózy (<i>Fusarium</i> spp.), pytiová hniloba kořenů kukuřice (<i>Pythium</i> spp.)	15 ml/VJ (1 VJ=50 000 zrn)	AT	Výsevek max. 2–3,2 VJ/ha