



# SIVANTO<sup>®</sup>

## energy

# 1Le

### Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: deltamethrin 1% β/ο, flupyradifurone: 7,5% β/ο

Βοηθ. Ουσίες: 92,67% β/β

## ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Bayer Ελλάς ABEE, Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι,

Τηλ.: 210 6166000, [www.cropscience.bayer.gr](http://www.cropscience.bayer.gr)

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

**GROUP 4D | 3A INSECTICIDES**



**UFI: VWK0-H0MD-000W-C08K**

## ΣΒΑΝΤΟ ΕΝΕΡΤΖΙ

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Το σκεύασμα είναι εντομοκτόνο μίγμα δύο δραστικών ουσιών, deltamethrin και flupyradifurone. Το deltamethrin είναι πυρεθροειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου το οποίο δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στα sites διαλυσης των ιόντων Na στα προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων. Το flupyradifurone είναι ένα νέο εντομοκτόνο που ανήκει στη νέα χημική ομάδα butenolides (IRAC Group 4D) το οποίο δρα στο νευρικό σύστημα του εντόμου, έχει διασυσταμτική ακροτέταλη κίνηση μέσω των αγγείων του ζύλου και ταυτόχρονα κινείται γρήγορα διελασματικά στο φύλλωμα.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός φυλλώματος.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:** Αμέσως μετά τον ψεκασμό καθαρίστε ενδελεχώς τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκασμού, την αντλία και τα ακροφύσια 3 φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν ο αφρός και τα ίχνη του προϊόντος.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:**

**ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιες και Ουνοποιησιμες ποικιλίες):** Τζίτζικακία (*Scaphoideus titanus*, *Empoasca viridula*). Ψεκασιός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μετά το τέλος της άνθησης έως την έναρξη της ωρίμανσης. (BBCH 69-81) **Δόση:** 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού [40 κ.εκ./στρ. (max)] **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-60 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/14.

**ΠΑΤΑΤΑ:**

**Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata).** Ψεκασιός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο έναρξης του κλεισίματος των γραμμών (10% των φυτών) έως 10 μέρες πριν την άνθηση. (BBCH 31- 49) **Δόση:** 75 κ.εκ./στρ. (max)] **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-60 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 1.

**ΓΥΛΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ:**

**Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis).** Ψεκασιός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το τέλος της άνθησης έως το στάδιο γεμίματος των κόκκων. (BBCH 70-75) **Δόση:** 125 κ.εκ./στρ. (max). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 40-80 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 1. **Διαβρωτικά (Diabrotica virgifera).** Ψεκασιός φυλλώματος με την εμφάνι-

ση της προσβολής από την έναρξη της έκπτυξης της φάσης έως 10 ημέρες πριν την άνθηση (BBCH 51-58) και από το τέλος της άνθησης έως το στάδιο γεμίματος των κόκκων. (BBCH 71-75) **Δόση:** 75 κ.εκ./στρ. (max). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 40-80 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 1. **Zygninidia sp.** Ψεκασιός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του 4<sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως 10 ημέρες πριν την άνθηση (BBCH 14-58) και από το τέλος της άνθησης έως το στάδιο γεμίματος των κόκκων. (BBCH 71-75) **Δόση:** 75 κ.εκ./στρ. (max). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-80 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 1.

**ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ, ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ: Brassigogethes (Meligethes) aeneus.** Ψεκασιός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μετά το τέλος της άνθησης έως την πλήρη ανάπτυξη των λουβών. (BBCH 69-79) **Δόση:** 75 κ.εκ./στρ. (max). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-60 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/14.

**ΣΤΑΡΙ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ, ΣΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ: Αφίδες (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae), Βρωμούσες (Eurygaster spp), Κνεφάσια (Cnephasia pumicana), Calamobius filum.** Ψεκασιός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μετά το τέλος της άνθησης έως την έναρξη της ωρίμανσης. (BBCH 69-83) **Δόση:** 75 κ.εκ./στρ. (max). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-60 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/14.

**ΚΡΙΘΑΡΙ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ, ΚΡΙΘΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ: Αφίδες (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae), Βρωμούσες (Eurygaster spp), Κνεφάσια (Cnephasia pumicana), Calamobius filum.** Ψεκασιός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από μετά το τέλος της άνθησης έως την έναρξη της ωρίμανσης. (BBCH 69-83) **Δόση:** 75 κ.εκ./στρ. (max). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-60 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/14.

**ΣΙΚΑΛΗ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ, ΣΙΚΑΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ: Αφίδες (Sitobion avenae), Βρωμούσες (Eurygaster spp), Κνεφάσια (Cnephasia pumicana).** Ψεκασιός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το τέλος της άνθησης έως την έναρξη της ωρίμανσης. (BBCH 69-83) **Δόση:** 75 κ.εκ./στρ. (max). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-60 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/14.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**  
-Να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπέλου στον **Κορινθιακό σταφίδα** και **Σουλτανία**. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.  
**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**  
**Αμπέλι (Ουνοποιησιμες και Επιτραπέζιες ποικιλίες), Πατάτες:** 14 ημέρες.  
**Γλυκό καλαμπόκι:** Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής.

**Ελαιόκρμβη χειμερινή/ανοιξιάτικη: 45 ημέρες.**  
**Κριθάρι χειμερινό/ανοιξιάτικο, Σίκαλη χειμερινή/ανοιξιάτικη, Στάρι χειμερινό/ανοιξιάτικο: 30 ημέρες.**  
**ΕΙΔΙΚΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

- Οι καλλιεργείες ή τα προϊόντα τους που έχουν ψεκαστεί με το σκεύασμα να μην χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή.  
**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές deltamethrin, flupyradifurone οι οποίες ανήκουν στις ομάδες 3 και 4, αντίστοιχα κατά IRAC.

Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ: -ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:**

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκατεμένες καλλιεργείες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:**  
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια όταν αποθηκευθεί στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.  
**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:** Βλέπε συσκευασία.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

**Γενικά:** Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετείτε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.  
• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Η ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
• **Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.**  
• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.  
• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύντε με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του

δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι, με polyethyleneglycol 400 εφόσον είναι διαθέσιμο, στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Το ζεστό νερό μπορεί να αυξήσει την αίσθηση του ερεθισμού. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη συστημικής δηλητηρίασης. Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος, μπορεί να γίνει χρήση ελαίων ή λωσιών που περιέχουν βιταμίνη E. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Το ζεστό νερό μπορεί να αυξήσει την αίσθηση του ερεθισμού. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη συστημικής δηλητηρίασης. Εφαρμόστε καταπραυντικές οφθαλμικές σταγόνες, αν χρειάζεται ανααισθητικές οφθαλμικές σταγόνες. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα και δώστε νερό σε μικρές γουλιές.

**Πληροφορίες για το γιατρό:**

Το προϊόν περιέχει ένα πυρεθροειδές. Η δηλητηρίαση από πυρεθροειδή δεν πρέπει να συγχέεται με τη δηλητηρίαση από καρβαμικά ή οργανοφωσφωρικά. **Θεραπεία:** Συστημική. **Αρχική θεραπεία:** Συμπτωματική. Παρακολούθηση των αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών. Εάν καταποθεί σημαντική ποσότητα σκευάσματος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη γαστρική απόπλυση εντός των πρώτων 2 ωρών. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού Νατρίου. Κρατήστε την αναπνευστική οδό καθαρή. Οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή εάν χρειαστεί. Σε περίπτωση σπασμών, μια βενζοδιαζεπίνη (π.χ. διαζεπάμη) πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με τα πρότυπα σχήματα. Εάν δεν είναι αποτελεσματική, μπορεί να χρησιμοποιηθεί φαινοβαρβιτάλη. **Αντενδείξεις:** ατροπική, παράγωγα αδρεναλίνης. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Η αποκατάσταση είναι αυθόρμητη και χωρίς επακόλουθα.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

## ΚΙΝΔΥΝΟΣ



### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Αποφύγετε να αναπνέετε το ψεκαστικό διάλυμα. • Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για μάτια και πρόσωπο κατά την ανάμιξη/φόρτωση. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα. Συστήνεται η χρήση γαντιών. • ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

• Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε τεχνητά στραγγιζόμενα εδάφη. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε τα παρακάτω:  
- Αμπέλι: Μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων εκ των οποίων τα 10 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

- Πατάτα για πρώιμες και όψιμες εφαρμογές: μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

- Ελαιοκράμβη Ανοιξιότικη: μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων εκ των οποίων τα 10 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

- Ελαιοκράμβη Χειμερινή: μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

- Γλυκό Καλαμπόκι (1 εφαρμογή με 125 κ.εκ/στρ.): μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.

- Γλυκό Καλαμπόκι, (1 εφαρμογή με 75 κ.εκ/στρ.): μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

- Στάρι Ανοιξιότικο, Κριθάρι Ανοιξιότικο, Σίκαλη Ανοιξιότικη: μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων εκ των οποίων τα 10 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

- Στάρι Χειμερινό, Κριθάρι Χειμερινό, Σίκαλη Χειμερινή: μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

• Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους αφήστε τα παρακάτω:

- Αμπέλι: μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90%.

- Για τις λοιπές καλλιέργειες: μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% ή μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%.

• Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιάσης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων./Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

• Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΗΣΗΣ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΗΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα και δώστε νερό σε μικρές γουλιές.

UFI: VWKO-HOMD-000W-C08K



# Bayer

Bayer Ελλάς ABEE  
Αγησιλάου 6-8,  
151 23 Μαρούσι,  
Τηλ.: 210 6166000,  
www.cropscience.bayer.gr

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer  
από σταθερό: **800 1135 353**  
από κινητό: **210 6166 332**

24/7



GR89776325B