

Účinné látky

fluopikolid 200 g/l (FRAC 43)

fluoxastrobin 150 g/l (FRAC 11)

Kombinované fungicidní mořidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu pro moření osiva řepky olejky, cukrovky, hořčice, ředkve olejné, řepice olejné a hořčice sarepské proti houbovým chorobám.

Balení a hmotnost

HDPE kanystr 5 l

Působení přípravku

Scenic[®] Gold je základním prvkem fungicidní ochrany v počátečních fázích vývoje rostlin, podporuje kvalitu a rychlost vzcházení. Zaručuje vyváženou konkurenceschopnost jednotlivých rostlin, což je základem zdravého a vyrovnaného porostu. Zabírá šíření houbových patogenů do pozdějších růstových fází rostlin. Scenic[®] Gold byl vyvinut k ochraně řepky olejky, cukrovky a hořčice proti chorobám pocházejícím z osiva či z půdy. Jeho předností je účinnost i na rozšiřující se patogena plíseň zelnu již od počátku vegetace. Dále působí v období

klíčení a vzcházení proti komplexu chorob způsobujících padání klíčnicích rostlin, proti fomové hnilobě, alternáriové skvrnitosti brukvovitých a u cukrovky proti spále řepy.

Fluopicolide představuje novou chemickou skupinu (benzamidů) s novým způsobem účinku u něhož nebyla zaznamenána cross rezistence na houby ze skupiny *Oomycetes*. Vyznačuje se konzistentní vysokou preventivní účinností, ale také antisporelačním efektem s kurativním účinkem.

Fluoxastrobin je širokospektrální fungicidní účinná látka ze skupiny strobilurinů. Působí kontaktně a částečně penetruje do ošetřeného osiva.

Nebyl zaznamenán negativní vliv při přeskladnění osiva.

Dávkování a doporučení pro aplikaci

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem platným pro daný typ aplikačního zařízení. Pro snížení prašnosti a dosažení optimální pokrývnosti doporučujeme aplikovat s Peridiam[®] Quality 208 nebo 009, zároveň se zaprašovadlem Fluency Powder proti spékání namořeného osiva, pro rovnoměrné pokrytí a barevnost. Vhodným partnerem na rozšíření insekticidního spektra účinnosti je Buteo[®] start.

Návod k použití

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	OL (dny)	Poznámka
Řepka olejka, hořčice	fomová hniloba brukvovitých, alternáriová skvrnitost brukvovitých, plíseň zelná, rhizoktoniová hniloba brukvovitých	1 l/100 kg	AT	Výsevek 3–6 kg/ha
Cukrovka	spála řepy (<i>Aphanomyces cochlioides</i> , <i>Pythium</i> spp. a <i>Fusarium</i> spp.)	20 ml/VJ (1 VJ = 100 000 semen) dávka vody 0,15–0,3 l/VJ	AT	Výsevek 1–1,3 VJ/ha

Návod k použití - Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	OL (dny)	Poznámka
Ředkev olejná, řepice olejná, hořčice sarepská	fomová hniloba brukvovitých, alternáriová skvrnitost brukvovitých, plíseň zelná, rhizoktoniová hniloba brukvovitých	1 l/100 kg	AT	Výsevek 2,5–6 kg/ha