

## Účinné látky

fluopicolide 200 g/l (FRAC 43)  
fluoxastrobin 150 g/l (FRAC 11)

**Kombinované fungicídne moridlo vo forme kvapalného suspenzného koncentráту určené na morenie repy cukrovej, repky ozimnej, repky jarnej, horčice a príbuzných druhov plodín proti hubovým chorobám.**

## Balenie

HDPE kanister 5 l

## Pôsobenie prípravku

Scenic<sup>®</sup> Gold obsahuje dve účinné látky z odlišných chemických skupín. **Fluopicolide** (benzamidy) je vysoko účinný proti širokému spektru húb z triedy *Oomycetes* (*Phytophthora*), vrátane

rodov *Plasmopara*, *Pseudoperonospora*, *Bremia*, *Phytophthora* a niektorých druhov *Pythium*. Pôsobí aj proti pôvodcom hubových ochorení z triedy *Oomycetes* ktoré sú rezistentné voči starším fungicídmi. Hubové patogény sú atakované vo viacerých fázach ich vývojového cyklu. Fluopicolide negatívne ovplyvňuje uvoľňovanie zoospór, pričom zároveň silne inhibuje ich mobilitu. Okrem toho pôsobí aj na klíčenie zoospór. Účinkuje tiež na sporuláciu a inhibuje mycélium rastúce vo vnútri rastlinných pletív. Má preventívny, kuratívny aj antisporelačný efekt.

**Fluoxastrobin** je účinná látka zo skupiny dihydrodioxazinov (analógy strobilurinov). Pôsobí predovšetkým preventívne, iba čiastočne aj kuratívne. Mechanizmom jeho účinku je inhibícia mitochondriálneho dýchania.


## Návod na použitie

Plodina	Účel použitia	Dávka
repka ozimná, repka jarná, horčica	fómová hniloba, plesen kapustová, čerň repková	10 l/t
repa cukrová	pôvodcovia koreňovej spály a koreňovej hniloby repy	0,02 l/VJ (100 000 semien)

## Menej významné použitie

### Návod na použitie

Plodina	Účel použitia	Dávka
kapusta poľná, repica olejnatá, reďkev olejnatá, kapusta sitinová, horčica čierna	padanie klíčnych rastlín, fómová hniloba, plesen kapustová, čerň repková	10 l/t



Fluoxastrobin účinkuje v počiatkových fázach infekcie (klíčenie spór, rast klíčku spóry a penetrácia do listu), ale účinne inhibuje aj rast mycélia. Má rýchly iniciálny účinok a dlhodobé reziduálne pôsobenie. Plne systémovo pôsobí proti širokému spektru hubových patogénov.

#### **Odporúčania pre aplikáciu**

Scenic® Gold aplikujte len technologickými postupmi, platnými pre daný typ moriaceho zariadenia.

Morenie osiva vykonávajte iba na profesionálnych zariadeniach určených na morenie osív uvedených plodín. Prípravok je v prípade potreby možné riediť vodou. Dávka vody závisí od technologických parametrov daného moriaceho zariadenia a konkrétneho technologického postupu morenia. Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte tak, aby ste dosiahli homogénnu suspenziu. Používajte len osivo s vyhovujúcimi semenárskymi parametrami a mechanicky nepoškodené!