

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN
Před použitím si přečtete příložený návod k použití

PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

Sivanto® Energy

Insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně řepky ozimé a jarní, kukuřice (vč. kukuřice cukrové), pšenice, ječmene, prosa, brambor, hořčice, cukrovky, řepy krmné, zelí hlávkového a čínského, brokolice, květáku, hrachu zahradního, révy vinné, ředkve olejné, sóji, a semenných porostů jetele, vojtěšky, slézu krmného a kadeřavého, lničky seté a lesknice kanárské proti škůdcům.

Název a množství účinné látky:	deltamethrin 10 g/l (0,8-0,9 %) flupyradifuron 75 g/l (6,6-6,7 %)
---------------------------------------	--

Název nebezpečné látky:	deltamethrin; flupyradifuron; polymer s oxiranem, mono(2-ethylhexyl)éter
--------------------------------	---



Nebezpečí

H302+H332	Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261	Zamezte vdechování par/aerosolů.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304+P340	PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351 +P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P311	PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P391	Uniklý produkt seberte.
P501	Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním provozovateli zařízení oprávněného nakládat s nebezpečným odpadem.
EUH401	Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1	Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
OP II.st.	Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody (mimo aplikaci do cukrovky, krmné řepy, révy vinné, jetele lučního a prostředního, slézu, ředkve olejné, vojtěšky, lničky seté a lesknice kanárské).
SPe8	Zvlášť nebezpečný pro včely. Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy. Přípravek aplikujte nejpozději 10 dnů před začátkem kvetení plodiny.

Držitel povolení:	Bayer S.A.S., 74 Rue Gorge de Loup, F-69009 Lyon, Francie
Právní zástupce/dodavatel/osoba odpovědná za konečné balení a označení:	BAYER s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3; tel.: 266 101 111

® je registrovaná ochranná známka společnosti Bayer

Evidenční číslo:	5821-0
UFI:	VWK0-H0MD-000W-C08K
2-D kód:	uvedeno na obalu
Číslo šarže:	uvedeno na obalu
Datum výroby formulace:	uvedeno na obalu
Doba použitelnosti:	2 roky od data výroby při správném způsobu skladování v originálních neporušených obalech (teplota skladování +5 až +30 °C)
Množství přípravku v obalu:	HDPE, HDPE/EVOH, HDPE/PA-láhev 1 L HDPE, HDPE/PA-kanystr 3 L, 5 L, 10 L, 15 L

Způsob působení

Sivanto Energy je systémově, kontaktně a požerově působící insekticid (zástupce skupiny butenolidů v kombinaci s účinnou látkou ze skupiny pyrethroidů) s flexibilní možností aplikace, účinkující proti hmyzu škodlivému na kulturních plodinách. Sivanto Energy narušuje přenos impulsů uvnitř nervového systému hmyzu. Při působení se váže na protein acetylcholinových receptorů, kde pomocí depolarizace způsobuje narušení nervových buněk. Tento proces nemůže být deaktivován působením acetylcholinesterázy, tudíž je nevratný a způsobuje poruchy nervového systému škůdců a jejich následné odumření.

SKUPINA	3	4	INSEKTICIDY
----------------	----------	----------	--------------------

Návod k použití

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL (dny)	Poznámka k 1) plodině 2) ŠO 3) OL
řepka olejka (ozimá a jarní)	krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý	0,75 l/ha	AT	1) BBCH 30-49
řepka olejka (ozimá a jarní)	krytonosec šešulový, bejlmorka kapustová	0,5 l/ha	45	1) BBCH 71-79
kukuřice, kukuřice cukrová	mšice stěmchová, mšice kukuřičná, kyjatka osenní, kyjatka travní, černopáska bavlníková, bázlivec kukuřičný, zavíječ kukuřičný	0,75 l/ha	7	1) BBCH 51-59, BBCH 71-75
pšenice (ozimá a jarní), ječmen (ozimý a jarní)	mšice stěmchová, kyjatka osenní, kohoutci	0,5 l/ha	30	1) BBCH 41-59, BBCH 71-83

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní;
AT-ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Plodina	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
řepka olejka	200-600 l /ha	postřik	2x	14 dnů
kukuřice	200-600 l /ha	postřik	1x	
pšenice, ječmen	200-400 l /ha	postřik	2x	14 dnů

Upřesnění použití

Kukuřici ošetřenou přípravkem nelze zpracovávat na olej pro účely lidské výživy.
Přípravek Sivanto Energy nepoužívejte ve směsi s kapalným hnojivem DAM 390, se stabilizátory pH a s hnojivy, jejichž kompatibilita není ověřená.

Antirezistentní strategie

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje kombinaci účinných látek ze stejných skupin po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí

SPe2	Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně: 20 m (pšenice ozimá, ječmen ozimý), 15 m (řepka olejka ozimá, kukuřice, pšenice jarní, ječmen jarní); 10 m (řepka olejka jarní).
-------------	---

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Třída omezení úletu			
	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
řepka olejka ozimá, kukuřice, pšenice ozimá, ječmen ozimý	25	12	5	4
řepka olejka jarní	25	12	6	4
pšenice jarní, ječmen jarní	25	10	5	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]				
řepka olejka ozimá a jarní, pšenice (ozimá a jarní), ječmen (ozimý a jarní)	10	5	5	0
kukuřice	5	5	0	0

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí

Plodina	Třída omezení úletu			
	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel [m]				
řepka olejka, kukuřice, pšenice, ječmen	5	5	5	5

Další omezení

Při aplikaci použijte traktor nebo samojízdný postřikovač s uzavřenou kabinou pro řidiče alespoň typu 3 (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu a aerosolu.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Zamezte styku přípravku a aplikační kapaliny s kůží a očima.

Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků. Po odložení osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) se důkladně umyjte. Po skončení práce ochranný oděv a další OOPP vyperte/očistěte. Filtrační polomasku bezpečně zlikvidujte. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

Práce s přípravkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Vstup na ošetřený pozemek je možný až následující den po aplikaci.

Příprava aplikační kapaliny

Při přípravě aplikační kapaliny nepoužívejte kontaktní čočky.

Otvírání obalů a přípravu aplikační kapaliny (postřikové jichy) provádějte ve venkovních prostorech.

Viz Další údaje a upřesnění.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků

Viz Další údaje a upřesnění.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Při přípravě, plnění a čištění aplikačního zařízení:	
Ochrana dýchacích orgánů - vždy při otvírání obalů, ředění přípravku a plnění aplikačního zařízení:	vhodný typ filtrační polomasky proti částicím podle ČSN EN 149+A1 (typ FFP2)
Ochrana dýchacích orgánů - v ostatních případech	není nutná, je-li práce prováděna ve venkovních prostorách
Ochrana rukou:	vhodné ochranné rukavice s piktogramem ochrana proti pesticidům (ČSN ISO 18889) nebo ochrana proti chemikáliím (ČSN EN ISO 374-1)
Ochrana očí a obličeje:	ochranné brýle nebo ochranný štít (ČSN EN ISO 16321-1)
Ochrana těla:	ochranný oděv pro práci s pesticidy typu C3 (ČSN EN ISO 27065) nebo proti chemikáliím typu 4 (ČSN EN 14605+A1) nebo typu 6 (ČSN EN 13034+A1)
Dodatečná ochrana hlavy:	není nutná
Dodatečná ochrana nohou:	pracovní/ochranná obuv (uzavřená, odolná proti průniku a absorpci vody - s ohledem na vykonávanou práci)
Společný údaj k OOPP:	Poškozené OOPP (např. protřžené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

Při aplikaci polním postřikovačem:	
Při vlastní aplikaci, když je pracovník dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče alespoň typu 3 (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu a aerosolu, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení.	

Informace o první pomoci

Všeobecné pokyny: VŽDY při zasažení očí neředěným přípravkem nebo projeví-li se zdravotní potíže (dýchací potíže, kašel, nebo přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí; nebo podráždění kůže – zarudnutí, svědění, pálení kůže, vyrážka, při podezření na alergickou kožní reakci, která se může projevit se zpožděním i 2 dnů apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.	
Při nadýchání:	Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Nebo dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast. Odložte kontaminovaný oděv. Zajistěte tělesný i duševní klid.
Při zasažení kůže:	Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou/vlažnou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.
Při zasažení očí:	Vyplachujte oči alespoň 15 minut při násilím široce rozevřených víčkách vlažnou čistou vodou. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Po dostatečném vymývání vyhledejte (odbornou) lékařskou pomoc.
Při náhodném požití:	Vypláchněte ústa vodou. Podejte, pokud možno cca 5-10 tablet rozdrčeného aktivního uhlí a dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku (s informací, že se jedná o přípravek na bázi syntetického pyrethroidu) a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem - **Telefon nepřetržitě: (+420) 224 919 293 nebo (+420) 224 915 402 (www.tis-cz.cz)**.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách +5 až +30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku.

Likvidace obalů a zbytků

Případné zbytky aplikační kapaliny nebo postřikové jichy se naředí cca. 1:5 vodou a bezezbytku se vystříkají na ošetřovaném pozemku; nesmí však zasáhnout zdroje podzemních ani recipienty povrchových vod.

Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jinému účelu!

Prázdné obaly se důkladně (3x) vypláchnou vodou a po znehodnocení se předají provozovateli zařízení oprávněného nakládat s nebezpečným odpadem k odstranění. Poté se obaly spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200-1400 °C ve druhém stupni a čištěním plyných zplodin.

Případné nepoužité zbytky přípravku se rovněž předají provozovateli zařízení oprávněného nakládat s nebezpečným odpadem k odstranění a po smísení s hořlavým materiálem (např. piliny) se spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.

Další údaje a upřesnění

Příprava aplikační kapaliny

Před použitím přípravku v uzavřeném originálním obalu důkladně protřepejte. Odměřenou dávku přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení předem naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na stanovený objem. Případně se použije předmíchávací zařízení, pokud je jím stroj vybaven. Připravenou aplikační kapalinu je třeba bezodkladně spotřebovat.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků

1. Po ukončení postřiku vypustte všechnu aplikační kapalinu.
2. Rozeberte sací a výtlačné vedení a tryskové filtry, a důkladně je propláchněte ve vodě.
3. Naplňte aplikační zařízení vodou na 10 % obsahu nádrže a spusťte míchání. Doporučuje se rotační čistící tryska.
4. Vypustte.
5. Opakujte krok 3 a 4.
6. Trysky a sítko musejí být čišťeny odděleně.

Menšinové použití přípravku povolené dle č. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL (dny)	Poznámka k 1) plodině 2) ŠO 3) OL 4) dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
brambor (konzumní, sadbové)	mšice jako přenašeči viróz	0,5 l/ha	7	1) do BBCH 89 mimo BBCH 60-69 2) podle signalizace 4) max. 2x 5) pole
brambor (konzumní, sadbové)	žilnatka virozná, křísek obecný, žilnatka travní, tečkovka žilkovaná (přenašeči fytoplazmy stolburu)	1 l/ha	7	1) do BBCH 89 mimo BBCH 60-69 2) podle signalizace 4) max. 1x 5) pole
proso seté	mšice střemchová, mšice kukuřičná, kyjatka osenní, kyjatka travní, zavíječ kukuřičný, černopáska bavlíňová	0,75 l/ha	AT	1) BBCH 51-75 mimo BBCH 60-69 2) při výskytu 5) pole
hořčice	krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý	0,75 l/ha	AT	1) BBCH 30-49 2) podle signalizace 4) max. 2x 5) pole
hořčice	krytonosec šešulový, bejlmorka kapustová	0,5 l/ha	45	1) BBCH 71-79 2) podle signalizace 4) max. 1x 5) pole

cukrovka	žilnatka virosová, křísek obecný, žilnatka travní, tečkovka žilkovaná, prstenovka olšová - přenašeči fytoplazmy stolburu	0,75 l/ha	AT	1) BBCH 14-19 2) podle signalizace 5) pole
cukrovka	rýhonosec řepný	0,75 l/ha	AT	1) BBCH 12-19 2) podle signalizace 5) pole
řepa krmná	mšice	0,5 l/ha	AT	1) BBCH 14-19 2) podle signalizace 5) pole
zelí čínské	bělásek zelný, bělásek řepový, dřepčící rodu <i>Phyllotreta</i> , mûra gamma, osenice polní, mšice zelná	0,75 l/ha	3	1) do BBCH 49 2) podle signalizace 5) pole
zelí hlávkové, brokolice, květák	bělásek zelný, bělásek řepový, dřepčící rodu <i>Phyllotreta</i> , mûra gamma, osenice polní, mšice zelná	0,75 l/ha	7	1) do BBCH 49 2) podle signalizace 5) pole
hrách zahradní	kyjatka hrachová, obaleč hrachový, zmokaz hrachový, listopas čárkovaný, plodomorka hrachová	0,75 l/ha	7	1) do BBCH 85 (mimo BBCH 60-69) 2) podle signalizace 5) pole
réva vinná	křísek révový	0,4 l/ha	14	1) BBCH 57-59, BBCH 70-81 2) podle signalizace 5) venkovní prostory
jetel luční, hybrid jetele lučního a prostředního (odrûda Pramedi), vojtěška	saví škûdci, žraví škûdci	0,5-0,75 l/ha	AT	1) BBCH 30-59, BBCH 71-83 2) podle signalizace 5) pole 6) semenné porosty
sléz krmný, sléz kadeřavý	saví škûdci, žraví škûdci	0,5-0,75 l/ha	7	1) BBCH 09-59, BBCH 71-83 2) podle signalizace 5) pole 6) semenné porosty, zkrmování
ředkev olejná	žraví škûdci	0,75 l/ha	AT	1) BBCH 09-29 2) podle signalizace 5) pole
lnička setá	žraví škûdci	0,75 l/ha	AT	1) BBCH 09-29 2) podle signalizace 5) pole 6) semenné porosty
lesknice kanárská	saví škûdci, žraví škûdci	0,5 l/ha	30	1) BBCH 19-59, BBCH 71-83 2) podle signalizace 5) pole 6) semenné porosty
sója	kněžice mramorovaná, listopas čárkovaný, babočka bodláková-housenky, kněžice zeleninová	0,75 l/ha	AT	1) BBCH 12-59 2) podle signalizace 5) pole
sója	kyjatka hrachová	0,5 l/ha	AT	1) BBCH 12-59 2) podle signalizace 5) pole

OL (ochranná lhûta) je dána počtem dnû, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní; AT-OL je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
brambor	200-400 l/ha	postřik	2x do celkové dávky 1 l/ha	14-21 dnů
proso seté	200-1000 l/ha	postřik	1x	
hořčice	200-600 l/ha	postřik	2x	14 dnů
brokolice, zelí čínské, zelí hlávkové, květák	600-1000 l/ha	postřik	1x	
cukrovka, řepa krmná, hrách zahradní, jetel luční, hybrid jetele lučního a prostředního, vojtěška setá, lesknice kanárská, lnička setá, ředkev olejná, sléz kadeřavý, sléz krmný, sója	200-400 l/ha	postřik	1x	
réva vinná	100-1200 l/ha	postřik	2x za rok	14 dnů

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

SPe2	Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně: 15 m (brambor, proso seté); 10 m (hořčice, brokolice, zelí hlávkové, zelí čínské, květák, hrách zahradní, sója).
SPe2	Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod: < 30 m (réva vinná); < 25 m (cukrovka, řepa krmná, jetel luční, hybrid jetele lučního a prostředního, vojtěška setá, sléz krmný, sléz kadeřavý, ředkev olejná, lnička setá, lesknice kanárská).

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Třída omezení úletu			
	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
réva vinná	30	20	14	7
brambor	30	16	7	4
hořčice, cukrovka, řepa krmná, brokolice, zelí hlávkové, zelí čínské, květák, hrách zahradní, jetel luční, hybrid jetele lučního a prostředního, vojtěška setá, lesknice kanárská, lnička setá, ředkev olejná, sléz kadeřavý, sléz krmný, sója	25	12	6	4
proso seté	25	12	5	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]				
réva vinná	15	10	10	0
brambor, proso seté, hořčice	10	5	5	0
cukrovka, řepa krmná, brokolice, zelí hlávkové, zelí čínské, květák, hrách zahradní, jetel luční, hybrid jetele lučního a prostředního, vojtěška setá, lesknice kanárská, lnička setá, ředkev olejná, sléz kadeřavý, sléz krmný, sója	5	5	0	0

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí

Plodina	Třída omezení úletu			
	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel [m]				
všechny plodiny	5	5	5	5

Dodatková informace společnosti Bayer:

**Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití.
Přípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v textu etikety anebo nejsou součástí písemných doporučení společnosti Bayer, platných pro aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin.
Společnost Bayer nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či skladováním přípravku.**