

GR85396471 E



VELUM[®]
PRIME

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην
Αγορά Υ.Α.Α.Τ.: 3057 / 29-01-2016



125ml e

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: fluopyram 40% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 64,27% β/β

Νηματοδοκτόνο - Μυκητοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Bayer Ελλάς ABEE, Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6166000, www.cropscience.bayer.gr



UFI: JPW1-X0FX-G00Y-J527

GROUP 7 FUNGICIDE

Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί επίσημη/
πρωτότυπη ετικέτα και παρατίθεται μόνο για
ενημερωτικούς σκοπούς. Η ενημερωμένη ετικέτα
του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη
συσκευασία κατά την αγορά του.

ΒΕΛΟΥΜ ΠΡΑΪΜ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Το Velum Prime περιέχει τη νέα δραστική ουσία fluorygam και καταπολεμά τους νηματώδεις και το ωίδιο σε ευρύ φάσμα υπαιθρίων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

Το fluorygam παρουσιάζει έντονη δράση εναντίον των ενηλίκων των νηματωδών. Επιπλέον προκαλεί καθυστέρηση στην ανάπτυξη των αβγών τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και περιορίζει την εκκόλαψή τους. Σε βιοχημικό επίπεδο παρουσιάζει ένα νέο τρόπο δράσης καθώς παρεμποδίζει τη μιτοχονδριακή αναπνοή μπλοκάροντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα του Succinate Quinone Reductase (σύμπλοκο II- παρεμποδιστής SQR). Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται περίπου 30 λεπτά μετά την εφαρμογή καθώς οι νηματώδεις αρχίζουν να κινούνται πιο αργά ενώ μετά από 1-2 ώρες τελικά παραλύουν εντελώς.

Επιπλέον, το fluorygam έχει μυκητοκτόνο δράση και παρουσιάζει διεισδυτική δράση, διελασματική κίνηση καθώς και ακροπέταλη κίνηση μέσω των αγγείων του ξύλου. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη μιτοχονδριακή αναπνοή μπλοκάροντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα του Succinate DeHydrogenase (σύμπλοκο II – παρεμποδιστής SDH). Το fluorygam δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση και την ανάπτυξη των σπορίων καθώς και την ανάπτυξη του μυκηλίου. Η δράση του fluorygam εναντίον των μυκήτων έχει διάρκεια από 30 έως 60 ημέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή στο έδαφος μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης ή με ψεκάσμο του εδάφους και ενσωμάτωση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Όταν το προϊόν εφαρμόζεται μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης, να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Το άρδευτικό σύστημα θα πρέπει να είναι σωστά βαθμονομημένο πριν από την εφαρμογή για την ομοιόμορφη διαβροχή του εδάφους. Η εδαφική υγρασία είναι σημαντικός παράγοντας για την καλή διασπορά του Velum Prime στο έδαφος. Για το λόγο αυτό συνιστάται να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: α) άρδευση με το 50% περίπου του συνολικού όγκου νερού, β) εφαρμογή του Velum Prime με το υπόλοιπο 40% του συνολικού όγκου νερού και γ) ολοκλήρωση της άρδευσης και ταυτόχρονα ξέπλυμα του

συστήματος της στάγδην άρδευσης με το υπόλοιπο 10% του συνολικού όγκου νερού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μηχανήματος με καθαρό νερό. Επαναλάβετε τρεις φορές.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:

Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ): Νηματώδεις (*Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne javanica*, *Meloidogyne halpa*), Ωίδιο (*Leveillula taurica*).

Δύο εφαρμογές με το σύστημα της στάγδην άρδευσης:

1. πρώτη εφαρμογή 1-3 ημέρες πριν ή μετά το φύτεμα ή τη μεταφύτευση
2. δεύτερη εφαρμογή 15-30 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή

Δόση: 37,5-62,5 κ.εκ. / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 200-600' λίτρα / στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 2/15-30.

Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Κολοκύθες (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ): Νηματώδεις (*Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne javanica*, *Meloidogyne halpa*), Ωίδιο (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*). Δύο εφαρμογές με το σύστημα της στάγδην άρδευσης:

1. πρώτη εφαρμογή 1-3 ημέρες πριν ή μετά το φύτεμα ή τη μεταφύτευση
2. δεύτερη εφαρμογή 15-30 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή

Δόση: 37,5-62,5 κ.εκ. / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 200-600' λίτρα / στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 2/15-30.

Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ), Πιπεριά (Υ): Νηματώδεις (*Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne javanica*, *Meloidogyne halpa*), Ωίδιο (*Leveillula taurica*). Εφαρμογή με το σύστημα της στάγδην άρδευσης 1-3 ημέρες πριν ή μετά το φύτεμα ή τη μεταφύτευση. **Δόση:** 62,5 κ.εκ. / στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-600^l λίτρα / στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 1.

Αγγούρι (Υ), Αγγουράκι (Υ), Κολοκύθι (Υ), Κολοκύθες (Υ), Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ): Νηματώδεις (*Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne javanica*, *Meloidogyne halpa*), Ωίδιο (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*). Εφαρμογή με το σύστημα της στάγδην άρδευσης 1-3 ημέρες πριν ή μετά το φύτεμα ή τη μεταφύτευση. **Δόση:** 62,5 κ.εκ. / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 200-600^l λίτρα / στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 1.

Καρότο (Υ): Νηματώδεις (*Meloidogyne halpa*, *Heterodera* spp., *Meloidogyne incognita*). Εφαρμογή 0-7 ημέρες πριν τη σπορά με ψεκασμό του εδάφους και ενσωμάτωση σε βάθος 10-20 εκ. **Δόση:** 62,5 κ.εκ. / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-80 λίτρα / στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 1 εφαρμογή / 2 έτη.

Μπανάνα (Υ): Νηματώδεις (*Meloidogyne* spp., *Meloidogyne incognita*, *Helicotylenchus* spp., *Pratylenchus* spp.). Εφαρμογή με το σύστημα της στάγδην άρδευσης από το στάδιο των τριών εντελώς ανοικτών φύλλων έως όλα τα τσαμπιά να φτάσουν το μέγιστο πάχος των φρούτων. BBCH 13-79. **Δόση:** 62,5 κ.εκ. / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 1000-2000^l λίτρα / στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 1.

Καπνός: Νηματώδεις (*Meloidogyne* spp., *Heterodera* spp.).
• Εφαρμογή 0-3 ημέρες πριν τη μεταφύτευση με ψεκασμό του εδάφους και ενσωμάτωση σε βάθος 5-10 εκ. **Δόση:** 62,5 κ.εκ. / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-100 λίτρα / στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 1 εφαρμογή / 2 έτη. • Εφαρμογή με το σύστημα της στάγδην άρδευσης 1-3 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. **Δόση:** 62,5 κ.εκ. / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 200-600^l λίτρα / στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 1.

Πατάτα: Νηματώδεις (*Meloidogyne* spp., *Heterodera pallida*, *Heterodera rostochiensis*)

• Εφαρμογή 0-3 ημέρες πριν τη φύτευση με ψεκασμό του εδάφους και ενσωμάτωση σε βάθος μέχρι 10 εκ. **Δόση:** 62,5 κ.εκ. / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-60 λίτρα / στρέμμα.

• Τοπική εφαρμογή κατά τη φύτευση με ψεκασμό επί των γραμμών φύτευσης και ενσωμάτωση σε βάθος μέχρι 5 εκ. **Δόση:** 62,5 κ.εκ. / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 15-25 λίτρα / στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 1 εφαρμογή / 2 έτη.

Φράουλα (Θ): Νηματώδεις (*Meloidogyne* sp., *Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne arenaria*, *Meloidogyne halpa*), Ωίδιο (*Leveillula Taurica*, *Sphaerotheca* sp., *Podosphaera aphanis*). Μέχρι δύο εφαρμογές με το σύστημα της στάγδην άρδευσης:

1. Πρώτη εφαρμογή 0-3 ημέρες πριν ή μετά τη μεταφύτευση ή κατά τη μεταφύτευση (BBCH 00-56: από το στάδιο του ληθάργου έως το στάδιο της επιμήκυνσης των ταξιανθιών).

2. Δεύτερη εφαρμογή 15-60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.

Δόση: 62,5 κ.εκ. / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 400-1000^l λίτρα / στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 1-2/15-60.

Μπρόκολο (Υ) (καλλιέργεια ήσσονος σημασίας): Νηματώδεις (*Heterodera cruciferae*, *Heterodera schachtii*).

Εφαρμογή 0-7 ημέρες πριν τη μεταφύτευση με ψεκασμό του εδάφους και ενσωμάτωση σε βάθος 5-10 εκ. (BBCH 00)

Δόση: 62,5 κ.εκ. / στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-80 λίτρα / στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:** 1 εφαρμογή / 2 έτη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Ο ανωτέρω αναφερόμενος όγκος νερού αφορά μόνο στην εφαρμογή του Velum Prime και όχι στο όγκο νερού πριν ή μετά την εφαρμογή του.

2. Η χαμηλή δόση στο θερμοκήπιο να χρησιμοποιείται μόνο σε συνθήκες χαμηλής ή μέτριας

προσβολής από τους νηματώδεις.

3. Μην εφαρμόζετε το Velum Prime σε σπορεία.

4. Όταν εφαρμόζετε το Velum Prime στη μέγιστη δόση 2 φορές το έτος στο θερμοκήπιο ή 1 φορά το έτος στην ύπαιθρο στο ίδιο χωράφι, μην χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα που περιέχουν fluopyram, έτσι ώστε η συνολική ποσότητα fluopyram ανά έτος στο ίδιο χωράφι να μην υπερβαίνει τα 50 γρ. /στρέμμα.

5. Δεν συστήνεται η εφαρμογή του Velum Prime μόνο για το வீδιο όταν δεν υπάρχει προσβολή της καλλιέργειας από νηματώδεις.

6. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του μπρόκολου από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ :

Μπανάνα (Υ): 14 ημέρες.

Καρπούζι (Θ), Κολοκύθες (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πεπόνι (Θ), Πιπεριά (Θ), Τομάτα (Θ): 3 ημέρες.

Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ): 1 ημέρα.

Αγγούρι (Υ), Αγγουράκι (Υ), Καπνός, Καρότο (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκύθες (Υ), Κολοκύθι (Υ), Μελιτζάνα (Υ), Πατάτα, Πεπόνι (Υ), Πιπεριά (Υ), Τομάτα (Υ), Φράουλα (Θ), Μπρόκολο (Υ): Μη εφαρμόσιμο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο σύστημα της στάγδην άρδευσης) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΎΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

- Για την καλλιέργεια της φράουλας, να εφαρμόζεται μόνο σε θερμοκήπια κλειστού τύπου.

- Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία fluopyram, η οποία ανήκει στην ομάδα 7 κατά FRAC.

Η δράση του fluopyram εναντίον των μυκήτων έχει διάρκεια από 30 έως 60 ημέρες. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στο πρόγραμμα ψεκασμών για το வீδιο να εφαρμόζονται προληπτικά, σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης, για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, συστήνεται ο πρώτος ψεκασμός μετά την εφαρμογή με το Velum Prime να γίνεται με σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Μην φυτεύετε σέλινο, αγκινάρα και μάραθο για τρεις μήνες μετά την εφαρμογή στο έδαφος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Πιθανώς να προκαλέσει συμπτώματα φυτοτοξικότητας στην καλλιέργεια του αγγουριού (Θ) υπό ορισμένες συνθήκες (εφαρμογή νωρίς το πρωί και αμέσως μετά τη μεταφύτευση). Σε κάθε περίπτωση, τα συμπτώματα εξαφανίζονται το αργότερο μετά από 1 μήνα. Δεν είναι φυτοτοξικό στις υπόλοιπες εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, σε συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική του κλειστή συσκευασία. Φυλάσσετε μακριά από τον παγετό.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε συσκευασία.



UFI: JPW1-X0FX-G00Y-J527

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Περιέχει 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one and 2-methyl-isothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. • Να φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια. • Συστήνεται η χρήση γαντιών κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος και κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.] • Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει τη δραστική ουσία fluorogam, με το σύστημα της στάγδην άρδευσης, σε περισσότερο από δύο εφαρμογές στα δύο χρόνια, για την καλλιέργεια της φράουλας. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε από τα επιφανειακά νερά για τις υπαίθριες καλλιέργειες όταν γίνεται ψεκασμός εδάφους και ενσωμάτωση, μian αψέκαστη ζώνη φυτικής ανάπτυξης 10 μέτρων. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε επισκεφθείτε γιατρό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.**

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.

• **Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε επισκεφτείτε γιατρό.**

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή, στην περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται.

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Ξεπλύνετε το στόμα.

Πληροφορίες για το γιατρό:

Θεραπεία: Θεραπεία συμπτωματική.

Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Εάν καταποθεί αρκετή ποσότητα σκευάσματος (περισσότερη από μία γουλιά) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θειικό Νάτριο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer

24/7

από σταθερό: **800 1135 353**

από κινητό: **210 6166 332**



Bayer

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος
για την τελική διάθεση στην
αγορά:
Bayer Ελλάς ABEE, Αγησιλάου 6-8,
151 23 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6166000,
www.cropscience.bayer.gr

Bayer



5 200309 831489 >

GR85396471E