



GR8.4398640F



# Volare®

687,5 SC

## 4,8Le

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:  
60.321/31.5.2012

### Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγ. Σύνθεση: Δραστικές ουσίες: Fluoricoide: 6,25% β/ο  
propramocarb hydrochloride: 62,5% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 34,18 % β/β

## Μυκητοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.  
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**GROUP 28 | 43 FUNGICIDES**

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος  
για την τελική διάθεση στην αγορά:  
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ,  
Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι,  
Τηλ.: 210 6166000, [www.cropscience.bayer.gr](http://www.cropscience.bayer.gr)



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

UFI: 5UQ0-T0CN-300N-SQ2J

Το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο δεν αποτελεί  
επίσημη/πρωτότυπη ετικέτα και παρατίθεται  
μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ενημερωμένη  
ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε  
πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.



**BAYWIN**

**ΚΑΘΗΓΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Μικητόκοπος για την αντιμετώπιση του περονόσπορου στην Πατάτα, στο Αγγούρι, στο Κολοκύνθη, στην Κολοκύνθα, στο Πεπόνι, στο Καρπούζι, στο Μαρουλί (στρογγύλο), στο Λάχανο, στο Μπρόκολο και στο Κουνουπίδι. Το φυτοφάρμακο είναι ένα νέο μυκητοκτόνο με διακαταμική δράση και αποσταθμιστική κίνηση, ανήκει σε μια νέα χημική ομάδα (αποκατακινολίν) και δρα σε πολλά στάδια του βιολογικού κύκλου του περονόσπορου. Το γραμοσάκο hydrochloride παρουσιάζει μικρή διασυστημική κίνηση και η δράση του φαίνεται να επηρεάζει το σχηματισμό των κυταρικών μεμβρανών με συνέπεια την παρεμπόδιση της μυκηλιακής ανάπτυξης καθώς και της παραγωγής και βλάστησης των σπορίων του περονόσπορου.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασιές φυλλώματων.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΧΕΙΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΑΣΤΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκασιού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναλόγητα την συσυστημική δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδευόμενοι συνεχώς.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΗΜΕΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ:**

- **ΠΑΤΑΤΑ:** Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*). Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Προληπτικές εφαρμογές. Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προφύλλης. ΒΒCH: 21-81. Δόση: 120-160 κ.εκ./στρέμμα (120-160 κ.εκ./100 λίτρα φεκ. υγρού). Όγκος ψεκασιού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιαστήματα επεμβάσεων: 1-4/7-12.
- **ΑΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ (υπαίθριου):** Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*). Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προφύλλης. ΒΒCH: 21-83. Δόση: 120-160 κ.εκ./στρέμμα (120-160 κ.εκ./100 λίτρα φεκ. υγρού). Όγκος ψεκασιού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιαστήματα επεμβάσεων: 1-2/7-12.
- **ΑΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ (θερμοκηπίου):** Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*). Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προφύλλης. ΒΒCH: 21-83. Δόση: 120-160 κ.εκ./στρέμμα (120-128 κ.εκ./100 λίτρα φεκ. υγρού). Όγκος ψεκασιού υγρού: 100-125 λίτρα/στρέμμα. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιαστήματα επεμβάσεων: 1-3/7-12.

- **ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (υπαίθριου):** Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*). Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: ΒΒCH: 21-86. Δόση: 140-160 κ.εκ./στρέμμα (140-160 κ.εκ./100 λίτρα φεκ. υγρού). Όγκος ψεκασιού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιαστήματα επεμβάσεων: 1-2/7-12.
- **ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (θερμοκηπίου):** Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*). Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: ΒΒCH: 21-86. Δόση: 140-160 κ.εκ./στρέμμα (140-160 κ.εκ./100 λίτρα φεκ. υγρού). Όγκος ψεκασιού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική

περίοδο/μεσοδιαστήματα επεμβάσεων: 1-3/7-12.

- **ΜΑΡΟΥΛΙ (υπαίθριου) (ποικιλίες στρογγύλου μαρουλιού):** Περονόσπορος (*Bremia lactucae*). Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογή μετά το τρίτο πραγματικό φύλλο (ΒΒCH 13). Δόση: 140-160 κ.εκ./στρέμμα (140-160 κ.εκ./100 λίτρα φεκ. υγρού). Όγκος ψεκασιού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιαστήματα επεμβάσεων: 1.

- **ΜΑΡΟΥΛΙ (θερμοκηπίου) (ποικιλίες στρογγύλου μαρουλιού):** Περονόσπορος (*Bremia lactucae*). Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: ΒΒCH: 13-49. Δόση: 140-160 κ.εκ./στρέμμα (140-160 κ.εκ./100 λίτρα φεκ. υγρού). Όγκος ψεκασιού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιαστήματα επεμβάσεων: 1-2/7-12.
- **ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ, ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΛΑΧΑΝΟ ΣΑΒΟΪ (υπαίθριου):** Περονόσπορος (*Peronospora* sp.). Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: ΒΒCH: 13-49. Δόση: 160 κ.εκ./στρέμμα (160 κ.εκ./100 λίτρα φεκ. υγρού). Όγκος ψεκασιού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιαστήματα επεμβάσεων: 1-3/7-12.

- **ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ (υπαίθριου):** Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*). Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: ΒΒCH: 13-49. Δόση: 160 κ.εκ./στρέμμα (160 κ.εκ./100 λίτρα φεκ. υγρού). Όγκος ψεκασιού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιαστήματα επεμβάσεων: 1-3/7-12.

**ΧΡΗΣΕΙΣ ΗΞΕΣΤΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ:**

- **ΑΡΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (θερμοκηπίου):** (ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ, ΦΥΛΛΑ ΣΕΛΙΝΟΥ, ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΑΘΟΥ, ΦΥΛΛΑ ΚΟΡΙΑΝΘΡΟΥ, ΑΝΗΘΟΣ, ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ, ΘΥΜΑΡΙ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, ΔΥΟΣΜΟΣ, ΜΕΝΤΑ, ΡΙΓΑΝΗ) (Χρήση ήσσονος σημασίας): Περονόσπορος (*Plasmopara petroselinii*, *Plasmopara nitida*). Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογές μετά το τρίτο πραγματικό φύλλο και μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του φυλλώματος. Δόση: 140-160 κ.εκ./στρέμμα (140-160 κ.εκ./100 λίτρα φεκ. υγρού). Όγκος ψεκασιού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιαστήματα επεμβάσεων: 1.
- **ΡΟΚΑ (θερμοκηπίου)** (Χρήση ήσσονος σημασίας): Περονόσπορος (*Peronospora parasitica* (=Hyaloperonospora parasitica), *Albugo candida*). Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογές μετά την εμφάνιση όλων των πραγματικών φύλλων και μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του φυλλώματος. Δόση: 140-160 κ.εκ./στρέμμα (140-160 κ.εκ./100 λίτρα φεκ. υγρού). Όγκος ψεκασιού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιαστήματα επεμβάσεων: 1.

- **ΣΠΑΝΑΚΙ (υπαίθριου)** (Χρήση ήσσονος σημασίας): Περονόσπορος (*Peronospora farinosa* f. sp. *spinaciae*). Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογή μετά την εμφάνιση όλων των πραγματικών φύλλων. Δόση: 140-160 κ.εκ./στρέμμα (140-160 κ.εκ./100 λίτρα φεκ. υγρού). Όγκος ψεκασιού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιαστήματα επεμβάσεων: 1.
- **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** 1. Η δόση των 120 κ.εκ./στρ. θα πρέπει να εφαρμόζεται προληπτικά ενώ η δόση των 160 κ.εκ./στρ. θα πρέπει να εφαρμόζεται προληπτικά σε περίπτωση που ο

κίνδυνος εμφάνισης της προσβολής είναι υψηλός ή θεραπευτικά στα αρχικά στάδια έναρξης της προσβολής. 2. Για όγκοι νερού μεγαλύτερους των 100 λίτρων/στρ., η μέγιστη δόση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 160 κ.εκ./στρ.

Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητάς του δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις σε καλά μελετημένες αρωματικά φυτά, ρόκα και σταπανά ενώ τη χρήση του σκευάσματος. Για τις πληροφορίες αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. **ΤΕΛΕΥΤΙΑ ΕΠΙΜΕΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΚΚΩΜΙΑ Η Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΞΕΣΗ ΣΤΗ ΑΓΡΟΤΑ ΟΛΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΝΤΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:**

**Αγγούρι (Θ), Κολοκύνθη (Θ):** 1 ημέρα. **Αγγούρι (Υ), Κολοκύνθη (Υ), Κολοκύνθα (Υ), Πεπόνι (Υ+Θ), Καρπούζι (Υ+Θ):** 3 ημέρες. **Πατάτα, Μαρουλί (Υ) (ποικιλίες στρογγύλου μαρουλιού):** 7 ημέρες. **Λάχανο Λευκό (Υ), Λάχανο κόκκινο (Υ), Λάχανο σαβοΐ (Υ), Μπρόκολο (Υ), Κουνουπίδι (Υ), Μαρουλί (Θ) (ποικιλίες στρογγύλου μαρουλιού), Σπανιά (Υ):** 14 ημέρες. **Αρωματικά φυτά (Θ):** Μαϊντανός, Φύλλα Σελίνου, Φύλλα Μαραθού, Φύλλα Κοριανθιού, Άνηθος, Δεντρολίβανο, Θυμαρί, Βασιλικός, Δυόσμος, Μέντα, Ρίγανη, Ρόκα (Θ): 21 ημέρες.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΝΕΣ Η ΠΕΡΙΒΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:** Το προϊόν να μην εφαρμόζεται σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση και αμυώδη εδάφη. Προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανεπιθύμητων των παθογόνων στο Volare 687, 5C συστάται οι εφαρμογές να γίνονται σε αναλογία με φυτοκτόνα άλλων ομάδων διαφορετικού τρόπου δράσης με τα οποία δεν εμφανίζεται διαταραχή ανεπιθύμητα.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΦΑΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ - ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΚΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Μην εισέρχεστε στη θερμοκηπική καλλιέργεια πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκασιό υγρό στη φυλλοκή επιφάνεια. **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συσυστημικές καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα καλά μέσα συσκευασίας ξεπλύνονται να είναι με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (να πιεστεί το ξεπλύματος τα ριχνόμενα στο ψεκασιό υγρό) και στη συνέχεια αργά καταστραφών προηγούμενης με τριτόμια, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αποσπώνται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Η απόσπηση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Το σκευάσμα παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:** Βλέπε συσκευασία.

## ΠΡΟΣΟΧΗ



UF: 5UQ0-T0CN-300N-SQZJ

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:** • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Υποπό για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** • Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. • Να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα. • Μην τρίψετε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να αποφεύγετε τη ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • «Συστήνεται ο χρήστης να φοράει αδιαπέραστη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή». • «Σε περίπτωση που οι εργάτες χρειαστεί να εισέλθουν στους ψεκασμένους αγρούς αμέσως μετά τον ψεκασμό αυτοί θα πρέπει να φοράνε προστατευτική ενδυμασία». • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Μην μόλυνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε υπερωριανάκτα ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. • **Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.** • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • Εάν παρατηρήσετε ερεθισμό του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Απομακρύνετε τους φακούς επαφής και πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Προστατέψτε τον υγιή οφθαλμό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή, στην περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα και χορηγήστε ενεργό άνθρακα. Καλέστε αμέσως γιατρό. **Πληροφορίες για το γιατρό:** **Συμπτώματα:** λήθαργος, αταξία, συσπάσεις. **Κίνδυνος:** Το συγκεκριμένο προϊόν, παρόλο που είναι καρβαμικό, δεν είναι παρεμποδιστής της χοληνεστεράσης. **Θεραπεία:** Αρχική θεραπεία συμπτωματική. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. **Αντιένδοξη:** Ατροπίνη. Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Εάν καταποθεί αρκετή ποσότητα σκευάσματος (περισσότερη από μία γουλιά) χορηγήστε ενεργό άνθρακα καιθεικό Νάτριο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

GR84398640F

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer  
από σταθερό: **800 1135 353**  
από κινητό: **210 6166 332**

24/7



5

1200309 865392 >



# Bayer

Bayer Ελλάς ABEE,  
Αγιοσάου 6-8,  
151 23 Μαρούσι,  
Τηλ.: 210 6166000,  
www.cropscience.bayer.gr